

ramas se sirven de piedras muy bien dispuestas en fila, que partiendo de la entrada dirigen por cada lado de modo que forman un pequeño sendero, mientras que por delante de ambas entradas se ve amontonada una colección de materiales de adorno.

En algunos de estos nidos veíanse en cada entrada mas de media fanega de huesos, de conchas y otros objetos semejantes: estas construcciones habían servido probablemente varios años. A juzgar por la distancia á que se hallaban estos nidos de recreo de las corrientes de agua, y como solo en sus orillas pueden encontrar las aves las conchas y las pie-

dras, el naturalista dedujo que los pájaros debían traer los objetos desde puntos muy lejanos. Parece que son muy exigentes en la elección de los materiales, pues solo recogen los de color blanco ó abigarrado. Gould se convenció de que estos nidos servían de punto de reunión á varios individuos, pues desde el escondite donde se puso en acecho mató uno despues de otro dos machos que salieron de la misma entrada.

En el mes de diciembre encontró Coxen un nido de clamidoderos que contenía tres hijuelos: parecíase al del tordo músico ó comun; tenía la forma de una copa bastante profunda, y constaba de ramas secas, con el interior relleno de




Fig. 19.—EL TILONORINCO SATINADO

plumas y yerbas menudas; estaba situado en una acacia cuyo ramaje sombreaba un estanque.

LOS PICA-BUEYES — BUPHAGINÆ

CARACTERES. — No trataré de averiguar si se debe comprender á los pica-bueyes entre los estúrnidos, ó si no sería mas natural considerarlos como tipo de una familia independiente. Difieren, en particular, de todos los demás estúrnidos por la estructura de su pico y de sus piés, pero también por su género de vida. Se caracterizan por sus formas prolongadas; el pico es fuerte, ancho y redondeado en la base, un poco deprimido en la arista y abovedado hácia la punta; la mandíbula inferior sobresale de la superior en ángulo obtuso; los tarsos son cortos y robustos; los dedos largos, provistos de uñas muy corvas, puntiagudas y comprimidas lateralmente; las alas son largas, formando la tercera rémige su punta; la cola, ancha y larga, remata en forma de cuña, asemejándose á un pico; el plumaje es lacio y de aspecto peloso, y la piel muy gruesa.

EL PICA-BUEYES DE AFRICA — BUPHAGA ERYTHORHYNCHA

CARACTERES. — El pica-bueyes de Africa, llamado

aretsch, *tscherna* y *hurio* por los abisinios y somalis, es la especie mas conocida de las dos que constituyen esta subfamilia. Su plumaje es de color pardo aceituna en las regiones superiores, mas claro en los lados de la cabeza, en la barba y en la garganta; las inferiores son de un amarillento azufrado claro; las rémiges y las tectrices inferiores de la cola de un pardo oscuro. El iris y un círculo desnudo alrededor de los ojos tienen un tinte amarillo dorado; el pico es de un rojo claro, y los piés pardos. La longitud de esta especie es de 0^m,21, por 0^m,33 de ancho con las alas extendidas; estas miden 0^m,11 y la cola 0^m,09 (fig. 21).

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. — El área de dispersion del pica-bueyes comprende todo el centro de Africa; en algunos puntos vive con su congénere, y á menudo le he visto en el país de los bogos, por lo cual puedo describir su género de vida segun mis propias observaciones.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. — El pica-bueyes forma reducidas bandadas de seis á ocho individuos, que solo se asocian con los grandes mamíferos; siguen á los rebaños de bueyes y camellos, y se posan en su lomo. Los viajeros que han recorrido el sur de Africa nos dicen que se les ve hasta cerca de los elefantes y rinocerontes; y Le Vaillant asegura también que siguen á los antílopes, fijándose sobre todo en los animales heridos, cuyas llagas atraen las moscas. Por esta razon los aborrecen los abisinios, pues creen

dedujo que los pájaros debían ser...
 lejanos. Parece que son...
 pues solo recién...
 convención... que...
 a varios individuos...
 en accho mató uno...
 de la misma entrada...
 de...
 por la distancia á que se...
 de las corrientes de agua...
 pueden encontrar las aves la...



Fig. 19.—EL TILONORINGO SATINADO

plumas y yerbas menudas; estaba situado en una acacia cuyo ramaje sombreaba un estanque.

LOS PICA-BUEYES — BUPHAGINÆ

CARACTERES. — No trataré de averiguar si se debe comprender á los pica-bueyes entre los estúrnidos, ó si no sería mas natural considerarlos como tipo de una familia independiente. Difieren, en particular, de todos los demás estúrnidos por la estructura de su pico y de sus piés, pero también por su género de vida. Se caracterizan por sus formas prolongadas; el pico es fuerte, ancho y redondeado en la base, un poco deprimido en la arista y abovedado hácia la punta; la mandíbula inferior sobresale de la superior en ángulo obtuso; los tarsos son cortos y robustos; los dedos largos, provistos de uñas muy curvas, puntiagudas y alargadas lateralmente; las alas son largas, formando la tercera remige su punta; la cola, ancha y larga, remata en forma de cuña, asemejándose á un pico; el plumaje es lacio y de aspecto peloso, y la piel muy gruesa.

EL PICA-BUEYES DE AFRICA — BUPHAGA ERYTHRORHYNCHÆ

CARACTERES. — El pica-bueyes de Africa, llamado

aretseh, *ischnia* y *harra* de los abisinios y somalis, es la especie mas conocida de esta familia que constituyen esta sub-familia. Su plumaje es de un pardo aceituna en las partes superiores, mas claro en los lados de la cabeza, en la barba y en la garganta; las inferiores son de un amarillento azufrado claro; las plumas y las tectrices inferiores de la cola de un pardo oscuro, azul y un círculo desnudo alrededor de los ojos de un amarillo dorado; el pico es de un rojo claro, y los pies sencillos. La longitud de esta especie es de 8 1/2 pulgadas, y el ala extendida es de 12 1/2.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. — La áerea de distribución del pica-bueyes de Africa es el centro de Africa; en algunas partes vive con las palomas, y á menudo le he visto en el caso de las palomas, por lo cual puedo describir su género de vida según mis propias observaciones.

USOS DOMESTICOS Y REGIMEN. — El pica-bueyes de Africa, llamado *aretseh* de los ocho individuos, que solo se conocen con los grandes mamíferos; siguen á los rebaños de búfalos y vacas, y se posan en su lomo. Los viajeros que han recorrido el sur de Africa nos dicen que se les ve hasta cerca de los elefantes y rinocerontes; y Le Vaillant asegura tambien que siguen á los antilopes, fijándose sobre todo en los animales heridos, cuyas llagas atraen las moscas. Por esta razon los aborrecen los abisinios, pues creen



GRUPO DE PARADISIDOS