

## EL ALCAUDON NUBIO—LANIUS NUBICUS

**CARACTERES.**—El dorso, la línea naso-ocular, las alas y la cola son de color negro azulado; las partes inferiores amarillentas con matiz de orin y los costados rojizos tirando también a orin; la frente, las cejas, las espaldillas, la garganta, la rabadilla, la raíz de las rémiges primarias, las puntas de las secundarias y de las cobijas pequeñas de las manos, son todas blancas; las seis rectrices medias son enteramente negras y las extremas blancas menos el tallo que es negro, las demás son blancas y negras. El ojo es pardo, el pico y las patas negras. Su longitud llega a 0<sup>m</sup>,16, la del ala plegada a 0<sup>m</sup>,09 y la de la cola a 0<sup>m</sup>,08.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Este alcaudon vive en Grecia, pero es una de las aves mas raras allí, mientras que sucede lo contrario en el Asia Menor, en Palestina, en el mediodía de Egipto y en la Nubia central, donde segun he podido observar, es sedentario; en los otros países citados aparece mas ó menos temprano, en Palestina en marzo, en los alrededores de Esmirna á principios de abril, en Grecia, junto con «el estornino sonrosado como la mas tardía de las aves de paso.» En su viaje de emigracion visita la Abisinia y las tierras del Nilo alto, pasando accidentalmente mas allá del ecuador.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—En Grecia habita esta ave durante el verano, terrenos incultos en que haya algunos olivos sueltos; en el Asia Menor, los olivares del llano y los pinares de la montaña; en el Egipto y la Nubia los pequeños matorrales de mimosas que alternan con los campos y los prados en el valle del Nilo, ó bien bosques de palmeras. Demuestra mas predileccion que todos sus congéneres hacia los árboles altos para servirse de ellos á guisa de atalayas desde donde observa y caza sus presas; tambien emite, posada en ellos, un pequeño gorjeo bastante agradable, pero que es, como el canto de los individuos de la familia, en gran parte un plagio de otras aves cantoras, y de consiguiente mas ó menos variado ó monótono, segun el número y calidad de otras aves que habitan la misma comarca juntamente con ella. Segun mis observaciones, que concuerdan con las de otros naturalistas, el alcaudon nubio es menos rapaz que sus afines y se contenta por lo general con insectos, aunque puede suponerse que si se ofrece la ocasion no dejará de aprovecharse de los nidos y polluelos de otras aves al igual de sus congéneres. Tristram le cree adusto y huraño, pero yo, y conmigo todos los demás observadores, le hemos encontrado, al contrario, extraordinariamente confiado.

El nido se encuentra, segun Linder Meyer, en la punta del olivo mas alto de su distrito, pero Krueper y Tristram lo encontraron, ya en la bifurcacion de una rama, ya en la mitad de una rama horizontal y medio seca, de tal modo que siempre está abrigado por otras ramas y follaje por la parte de arriba y á la distancia suficiente del tronco para que sea imposible alcanzarlo con la mano. Tambien se compone de tallitos tiernos de yerbas que forman una elegante cazuela, resistiendo un año ó dos á la intemperie merced á las hebras y trapos que el ave sabe entretrejer sólidamente en la obra principal y exterior. De seis á siete huevos forman la puesta primera, y de tres á cuatro la segunda; aquella la hacen en mayo y esta á últimos de junio. Los huevos son bastante mas pequeños que los del lanion, pero tambien de tamaño igual segun el caso, y presentan sobre fondo color de arcilla tirando á blanco, puntos y manchitas pequeñas de color pardo aceitoso que en el extremo grueso se acercan y confunden en una especie de aro. Luego que los pequeños pueden volar y bastarse á sí mismos ha llegado tambien la época

de la emigracion, y los alcaudones de esta especie abandonan la Grecia en agosto y el Asia Menor en setiembre para pasar mas allá que sus compañeros del Egipto meridional y la Nubia y buscar sus cuarteles de invierno.

**CAUTIVIDAD.**—Un alcaudon nubio cogido pequeño, que cuidó Krueper, se acostumbró á la jaula y régimen artificial con la misma facilidad que sus congéneres.

## EL ALCAUDON DE COLA ROJA—LANIUS PHŒNICURUS

**CARACTERES.**—Menciono esta especie porque se ha cogido en Heligoland y figura de consiguiente entre las aves europeas y aun entre las alemanas. El color del dorso es entre rojo, orin y canela; el sitio de la línea naso-ocular es negro; la frente y toda la parte anterior de la cabeza, como asimismo una lista ancha en las cejas son blancas, que es tambien el color del abdomen y que pasa á rojizo en los costados; las pennas de las alas y sus cobijas son pardo negruzcas, las primarias con filete exterior pardo de orin; las rectrices son de un pardo de orin opaco, orladas de pardo las dos medias, y de blanco leonado en la punta las extremas. El plumaje de la hembra es mas oscuro con líneas transversales parduscas, estrechas y mal determinadas. La longitud es aproximadamente de 0<sup>m</sup>,20; el ala plegada mide 0<sup>m</sup>,09 y la cola 0<sup>m</sup>,08.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta especie habita el Turkestan y la Siberia meridional desde el Alacul hasta las tierras del Amur como ave de cria, y se encuentra además en China, Japon, India, Ceilan y las islas de la Sonda.

## EL CHAGRA—TELEPHONUS ERYTHROPTERUS

**CARACTERES.**—El chagra, tipo del género de los teléfonos (*Telephonus*), tiene el cuerpo prolongado; el pico esbelto y ligeramente ganchudo, el tarso alto y endeble; el ala corta y muy redondeada por ser la quinta y sexta rémiges mas largas que las demás, y la cola larga y escalonada. Tiene el lomo gris pardusco; el vientre gris ceniciento claro; cubre su cabeza una especie de ancho casquete negro, y por encima del ojo se cruza una lista del mismo color; entre los dos hay una tercera que forma como una ceja, blanca por delante y de un amarillo claro por detrás; las pennas de las alas son grises sobre sus barbas externas y tienen anchos filetes pardos; las dos rectrices medias son grises, con listas oscuras; las otras negras, con la punta blanca; las mas externas presentan por fuera un ancho filete claro; el ojo es pardo rojo; el pico negro y las patas de un gris de plomo con reflejos verdosos. Esta ave mide 0<sup>m</sup>,21 de largo por 0<sup>m</sup>,26 de punta á punta de ala, la cola 0<sup>m</sup>,09 y el ala plegada 0<sup>m</sup>,08 (fig. 51).

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Se ha asegurado repetidas veces que al chagra se le ha visto en España, pero me he podido convencer de la inexactitud de este aserto por los muchos informes que he tomado. El área de dispersion de esta ave comprende toda el Africa, exceptuando únicamente el extremo noroeste donde no se encuentra, á contar desde los 18° de latitud norte, pero sí en los países del Atlas. En las sierras de Abisinia sube hasta 2,000 metros sobre el nivel del mar.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Las costumbres de los teléfonos se diferencian mucho de las de las especies que forman los géneros anteriores. Solo viven en los mas espesos matorrales, casi al nivel del suelo; no se refugian en los árboles sino cuando se les persigue; cazan en tierra y corren con gran agilidad, tanto, que al verlos se diria que son tordos. Se ocultan lo mejor que pueden entre las altas

yerbas; cuando se les ahuyenta vuelan rasando el suelo hasta llegar á otra breña; baten precipitadamente las alas y luego se ciernen algun tiempo.

Viven solitarios ó apareados; despues del período del celo forman reducidas bandadas, compuestas sin duda de los individuos de una misma cria, del padre y de la madre.

Heuglin traduce el grito de llamada por las sílabas *dui, dui, dut, dut*, y dice que es sonoro y armonioso, y respecto al plumaje cita la particularidad de que se empapa mucho de agua cuando caen fuertes chubascos por ser poco grasiento, y entonces para secarlo se remonta el ave á gran altura donde se sacude y produce con el movimiento rápido y oscilante de las alas un ruido particular muy parecido al zumbido del picamaderas cuando corta los aires. Los huevos que proporcionaron á este naturalista en setiembre tenían 0<sup>m</sup>,023 de largo por 0<sup>m</sup>,017 de diámetro; la cáscara era muy fina, teniendo sobre fondo blanco con viso pardusco de orin líneas pequeñas de color gris y de un pardo rojizo muy vivo, siendo mas numerosas hácia el extremo grueso.

## LOS MALACONOTINOS—MALACONOTINÆ

**CARACTERES.**—Se caracterizan por tener las alas mas largas; la cola mas corta y apenas escotada; los tarsos mas endebles y altos; el pico mas largo, menos encorvado, y con el diente no tan pronunciado. El plumaje es abundante, sobre todo en la rabadilla, y por lo general de vivos colores.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Los malaconotinos, sub-familia abundantísima en especies, habitan el Africa y las Indias.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Todos parecen tener las mismas costumbres: viven en los bosques, por parejas ó reducidas bandadas, y se posan en la copa de los árboles mas espesos ó en los matorrales. No se les ve con frecuencia; pero se oye resonar su voz, que presta animacion al bosque.

Se alimentan de insectos y parece que no acometen á los vertebrados: nada sabemos acerca de su manera de reproducirse.

## LOS LANIARIOS—LANIARIUS

**CARACTERES.**—Los laniarios ó alcaudones silbadores se asemejan mas á los tordos que á las pegas-rebordadas, tanto por la estructura como por la índole: tienen el cuerpo prolongado; el cuello corto; la cabeza mediana; las alas sub-obtusas, con la cuarta y quinta pennas mas dilatadas; la cola larga y redondeada; el pico prolongado, medianamente encorvado, ganchudo y algo dentado; las uñas largas y fuertes.

## EL LANIARIO ESCARLATA—LANIARIUS ERYTHROGASTER

**CARACTERES.**—Tiene el lomo de color negro brillante; el vientre rojo escarlata; la rabadilla de un tinte amarillo de ocre; el ojo amarillo; el pico negro, y las patas de color de plomo. Mide unos 0<sup>m</sup>,23 de largo por 0<sup>m</sup>,34 de punta á punta de ala; la cola y el ala plegada 0<sup>m</sup>,10.

## EL LANIARIO DE ETIOPÍA—LANIARIUS ÆTHIOPICUS

**CARACTERES.**—El laniario de Etiopía tiene el lomo negro, excepto una faja blanca que cruza el ala; el vientre es

de este último color con reflejos sonrosados; el ojo de un rojizo pardo; el pico negro, y las patas de un gris azul. Tiene 0<sup>m</sup>,35 de largo por 0<sup>m</sup>,36 de punta á punta de ala, la cola 0<sup>m</sup>,09 y el ala plegada 0<sup>m</sup>,10.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Se encuentra esta ave en toda la parte este del Africa central, si bien con mas frecuencia en las selvas vírgenes del llano que en las montañas.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Es una verdadera joya del bosque. Su pecho, de color encarnado vivo, se destaca desde lejos al través del ramaje mas espeso; y sin esto ha de llamar tambien la atencion hasta del observador mas indiferente, porque además es ave muy movediza y cantora. En las montañas la reemplaza al parecer, por lo menos en cuanto al canto, el laniario silbador, que se encuentra todavia entre 2,000 y 3,000 metros de elevacion sobre el nivel del mar. Ambas especies viven siempre apareadas; son frecuentes en las localidades á propósito y tan próximas una pareja á la otra que los sonidos claros y aflautados se repiten en términos de acabar por ser molestos. Como viven tan agrupadas, han de contentarse las parejas con una superficie tan reducida que no pasa de ciento cincuenta pasos; dominio que defienden con mucho teson y perseverancia contra todo intruso. Por lo comun se oye á estas aves antes de verlas, á causa de permanecer con preferencia en la espesura mas intrincada, de donde solo se elevan á los árboles altos si tienen copa espesa donde puedan ocultarse. A pesar de esto se las ve al través del follaje mas espeso á causa de su plumaje brillante, y aun cuando no se las viera, se las oiria desde luego.

Por sus usos y costumbres se asemejan mas á los tordos que á las pegas-rebordadas: jamás he visto á ninguna posada en el extremo de una rama y acechando á los insectos, como lo hacen los lánidos; están siempre en lo mas espeso del ramaje, y corren con agilidad para buscar su alimento. No se las encuentra casi nunca en tierra; algunas veces dan saltitos para andar, pero se remontan al menor ruido, buscando un refugio en la copa del árbol.

Al volar aletean precipitadamente, interrumpiéndose á intervalos cuando se ciernen, bien diferentes en esto de los alcaudones.

Lo mas singular de estas aves es su canto, que nada tiene de comun con el de las otras: el macho y la hembra producen algunas notas sonoras; el grito del laniario escarlata se asemeja al silbido de la oropéndola; pero el del laniario de Etiopía se compone de tres notas, rara vez de dos, muy puras y argentinas, y que comprenden casi una octava. El ave da principio con una mediana, á la que sigue otra mas baja, y luego una tercera bastante mas alta; las dos primeras forman por lo general la tercia, las dos segundas la octava. Solo el macho deja oír así su voz; inmediatamente despues le contesta la hembra, lanzando una especie de chirrido ronco y desagradable, que no es fácil describir. La hembra del laniario escarlata no produce sonido alguno hasta que termina el macho; la del laniario de Etiopía da principio en el instante en que el macho deja oír su segunda nota; pero lo mismo en una que en otra especie, demuestra siempre cierto conocimiento de la medida, que no se observa en las demás aves. Hay ocasiones en que comienza la hembra; grita tres, cuatro y seis veces seguidas antes que se deje oír el macho, y luego se repiten los sonidos con la misma regularidad. He reconocido perfectamente que son necesarias las dos aves para producir estas notas alternadas; si se mata á la hembra, el macho sigue silbando; pero no se oyen ya chirridos; y sucede lo contrario si muere el segundo.

Al principio recrean estas aves al observador; pero al



cabo de algun tiempo, y por puras y singulares que sean sus notas, y notable el canto, échase de ver una monotonía y cierta uniformidad que acaba por cansar y producir fastidio.

No puedo decir cuáles son los insectos que constituyen el alimento de los laniarios: Ruppell ha observado que en ciertas estaciones comian principalmente hormigas; tambien cazan encarnizadamente las orugas y las larvas. No me parece probable que se apoderen de los nidos de otras aves.

No sabemos nada acerca de la reproduccion del laniario cautivo.

## LOS PAQUICEFALINOS Ó FALCONELOS—PACHYCEPHALINÆ

**CARACTÉRES.**—Así llama Cabanis á unas sesenta especies de alcaudones que difieren tan notablemente de sus afines, que muchos naturalistas han formado con ellas una familia propia: los *paquicefalidos* (*pachycephalidæ*). Distinguese por su cuerpo fornido; cabeza muy grande; pico fuerte; alas y cola medianas, estando esta última truncada en ángulo recto, y tarsos cortos y robustos.




Fig. 51.—EL CHAGRA

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Los falconelos son propios de la Nueva Holanda y de la Oceanía.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Las especies de este grupo tienen algo de las costumbres de los paros: viven en los árboles mas altos, cuyo ramaje recorren con la mayor agilidad. Son insectívoras; pero parecen preferir las orugas y las crisálidas á los insectos perfectos. Se mueven con lentitud y su vuelo es pesado. Algunas tienen un canto bastante agradable, y las otras no producen sino un silbido melancólico, que repiten varias veces seguidas. Su nido, de forma redondeada, tiene formas bastante graciosas, y está situado entre las ramas ó en el hueco del tronco de un árbol. La puesta consta por lo regular de cuatro huevos.

### EL FALCONELO CABEZUDO—FALCUNCULUS FRONTATUS

**CARACTERES.**—Este falconelo es una hermosa ave de unos 0",16 de largo, muy semejante al paro, del cual difiere no obstante por su pico, parecido al de los halcones, aunque el gancho y el diente de la mandíbula superior no sean muy pronunciados. Los dos sexos vienen á tener el mismo plumaje: el lomo es aceitunado y el vientre de un amarillo vivo; cruza la frente una línea blanca; los lados de la cabeza son de este color, excepto una faja negra, que partiendo del ojo

se dirige hácia la nuca; el moño, la garganta y una parte de las espaldillas, tienen el color negro; las rémiges son de un pardo negro, con anchos filetes grises; las rectrices externas blancas, y todas las demás de un pardo negro, con la extremidad blanca; el ojo es pardo rojizo, el pico negro y las patas de un gris azulado.

La hembra, mas pequeña que el macho, tiene la garganta verdosa.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Dice Gould que esta ave no habita sino en el sur de Australia y en la Nueva Gales del sur. En la parte occidental de la Nueva Holanda existe otra especie.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—El falconelo cabezudo frecuenta los mas espesos matorrales y los árboles aislados de la llanura. Es un ave vivaz y activa; trepa como el paro á lo largo de las ramas para buscar su alimento, y toma las posturas mas singulares y diversas. Come principalmente bayas é insectos, los cuales recoge en la superficie de las hojas ó los extrae de la corteza, sirviéndose para ello de su pico con la mayor habilidad. Gould asegura que ningun ave tiene tanta fuerza en aquel órgano, el cual constituye tambien para el animal un arma defensiva.

En cuanto á la manera de reproducirse ofrece sin duda las mismas particularidades que una especie afine, el falconelo de vientre blanco. En el mes de octubre encontró Gould un nido

de este último en las ramas mas altas de un eucalipto, á unos 16 metros sobre el suelo: tenia una profunda excavacion, y componiase exteriormente de fibras de la corteza de aquel árbol, cubiertas de telas de araña, color blanco brillante, con manchitas aceitunadas muy oscuras.

## LOS DRONGOS—DICRURIDÆ

**CARACTÉRES.**—Esta familia, que comprende unas se

venta especies propias del Africa, del Asia meridional y de la Nueva Holanda, se subdivide en varios géneros tan semejantes sin embargo unos á otros, que bastará describir una sola especie.

### EL DRONGO PARADÍSEO—DICRURUS PARADISEUS

**CARACTERES.**—Este pájaro, el *bimraj* de los indios, tipo del subgénero de los disemuros (*Dissemurus*), se caracteriza como sus congéneres, por tener el pico de longitud re-




Fig. 52.—EL DICRURO DE COLA GRANDE

gular y fuerte, muy ensanchado en la base, abovedado y aquillado en la arista y con una escotadura; los tarsos son cortos; los dedos de longitud regular, provistos de uñas muy curvas y puntiagudas; las alas largas; las rémiges quinta y sexta forman la punta. El plumaje, recio y brillante, se convierte en los ángulos de la boca en una especie de cerdas rígidas, difiriendo solo del de sus congéneres por formar un copete de plumas en la parte superior de la cabeza, y por la rectriz exterior muy prolongada, provista de barbas únicamente en su extremidad; la cola es ahorquillada. El abundante plumaje es negro, con brillo azul metálico; los ojos pardos; el pico y los piés negros. La longitud de esta especie es de 0",36, y si se cuentan las rectrices exteriores de 0",60, las alas miden 0",17, la cola 0",19, y contando dichas rectrices 0",44.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Los drongos, tipos de la familia de los dicrúridos, figuran entre las aves mas notables de su país, y son bien conocidos de los indígenas. Se les encuentra desde las orillas del mar hasta una altitud de 2,500 metros: los unos frecuentan las llanuras; los otros los bosques; algunas especies son muy comunes y las hay que escasean mucho. En las Indias, dice Jerdon, es seguro encontrar alguna de estas aves donde quiera que se vaya. Se las ve posadas sobre las ramas muertas de un árbol,

en un tejado, en un poste de telégrafo, en una breña, en una cerca, en un muro ó en un hormiguero. Con frecuencia acompañan al ganado y se posan sin temor en el lomo de los animales.

Los mas de ellos están todo el día en continuo movimiento: algunos son crepusculares, y á semejanza de los vencejos, cazan largo tiempo despues de ponerse el sol, comenzando antes de salir. Cuando hay luna llena no descansan en toda la noche ni dejan de producir su gorjeo.

Segun Le Vaillant, ciertas especies se reúnen hácia la puesta del sol en árboles dados, y cazan en compañía.

Dícese tambien que los drongos de las Indias forman bandadas; mas no sucede así con todas las especies: y por lo que á mí hace, puedo decir que no he visto ninguna numerosa de dicruros lúgubres (*Dicrurus divaricatus*) en el nordeste de Africa. Creo, no obstante, que en ciertos casos puede parecer esta ave sociable, por ejemplo, cuando encuentra un botín muy abundante en reducida localidad. Durante el período del celo vive cada pareja para sí, aislada de las otras, y no tolera que ninguno de sus semejantes se fije en el dominio donde ella está.

El dicruro lúgubre que yo tuve ocasion de observar no me pareció muy agradable, y sí la mas fastidiosa de todas las aves del centro de Africa. Los individuos que yo vi solian