

## LOS PROGNEOS—PROGNE

**CARACTÉRES.**—Son pájaros de formas recogidas, con pico fuerte, ancho en la base, comprimido lateralmente, alto, abovedado, corvo hácia abajo y ganchudo en la punta; los piés son fuertes; los tarsos desnudos; los dedos gruesos; las alas largas y relativamente anchas, llegan hasta la extremidad de la cola en el estado de reposo; la cola es bastante ancha y muy ahorquillada; el plumaje recio.

## EL PROGNEO PURPÚREO—PROGNE PURPUREA

**CARACTÉRES.**—Esta especie (fig. 60), la mas cono-




Fig. 59.—EL ATICORE FAJADO

cida del grupo, ha sido observada tambien en Europa. Su longitud es de 0<sup>m</sup>,19 por 0<sup>m</sup>,40 de ancho con las alas desplegadas, estas miden 0<sup>m</sup>,14 y la cola 0<sup>m</sup>,07.

En la edad adulta tiene el macho todo el plumaje de un color azul negro con reflejos purpúreos; las pennas de las alas y de la cola de un pardo negruzco; el ojo pardo oscuro; el pico negro y los piés de un negro púrpura.

La cabeza de la hembra es de un gris pardo con manchas negras; su plumaje, de un tinte mas gris que el del macho, está cubierto en las partes inferiores de otras longitudinales, negras tambien.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta especie habita la América septentrional, y solo se deja ver muy accidentalmente en Europa. Dícese que se han cogido varios individuos en la Gran Bretaña.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Segun Audubon, el progneo purpúreo aparece en los alrededores de Nueva Orleans entre el 1.º y el 9 de febrero, y algunas veces antes: entonces se le ve pasar por el interior de la ciudad y sobre el rio. No llega hasta el 15 de marzo á las inmediaciones de las cascadas del Ohio, donde se presenta en reducidas bandadas de cinco á seis individuos, y no aparece en gran número hasta fines de dicho mes. No se le ve en el Missouri antes del 10 al 15 de abril; permanece allí hasta mediados de agosto y se dirige despues hácia el sur. Estas aves forman entonces bandadas de cincuenta á cien individuos, los cuales se posan en algun campanario ó un árbol grande, desde donde emprenden su emigracion.

El vuelo del progneo purpúreo se asemeja bastante al del

quelidon de ventana, y aunque no se le pueda comparar con el de la golondrina de chimenea por la gracia y la celeridad, es no obstante, rápido y gracioso. A semejanza de todos los hirundínidos, bebe volando y se baña, aunque tambien se posa á menudo en tierra, y á pesar de sus cortas patas, se mueve con la suficiente destreza para cazar los insectos, corriendo asimismo con cierta agilidad en medio del ramaje de los árboles donde se posa.

Esta ave es tan atrevida y valerosa como la golondrina rústica: persigue y acosa á los carnívoros, á los mamíferos y á las aves, principalmente á los gatos, perros, halcones, cornejas y buitres; precipitase furiosa contra las rapaces, las inquietas y no las deja un momento de reposo hasta que se alejan de su nido.

En casi todos los Estados del centro se preparan cajones para que se alberguen estas aves, ó bien se cuelgan de los árboles calabazas vacías con un agujero, en las que les gusta anidar. Ahuyentan de ellas á las demás aves que se introducen, y no permiten en su vecindad la presencia de ninguna de las especies que anidan del mismo modo.

En los Estados del centro hace su nido en el mes de abril, sirviéndose para ello de ramas secas, yerbas, hojas y plumas. Cada puesta es de cuatro ó seis huevos blancos de 0<sup>m</sup>,023 de largo por 0<sup>m</sup>,019 de grueso: á fines de mayo comienzan á volar los hijuelos de la primera; los de la segunda abandonan el nido en el mes de julio. En la Luisiana y en los otros Estados del sur ponen á menudo por tercera vez.

El macho cuida cariñosamente de la hembra cuando cubre; permanece cerca de ella y trata de distraerla con su canto y su gorjeo. Sucede á menudo que varias parejas anidan unas al lado de otras, sin que deje de reinar la mejor armonía entre ellas.

## LOS PAPAMOSCAS—MUSCICAPIDÆ

**CARACTERES.**—Los papamoscas tienen el tronco prolongado; cuello corto; cabeza un poco ancha; pico fuerte y corto, mas ancho en la base, comprimido de arriba abajo, anguloso en la arista, escotado junto á la extremidad de la mandíbula superior, y ganchudo; los piés son cortos y endebles; el dedo medio está reunido con el exterior; las alas son bastante largas y la tercera rémige forma la punta; la cola, de longitud regular, se corta en ángulo recto, ó tiene una ligera sesgadura; el plumaje, lacio y suave, es cerdoso en la base del pico; el color varia por lo regular segun el sexo y la edad.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Los papamoscas, de los cuales se conocen unas doscientas ochenta especies, habitan todos los continentes, excepto América, y abundan sobre todo en los países tropicales.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Estos pájaros frecuentan los bosques y plantaciones de árboles; prefieren la espesura y raras veces bajan á tierra. Posados en una rama, desde donde pueden abarcar un vasto horizonte, acechan los insectos, persiguenlos al vuelo, los cogen con el pico y vuelven al lugar donde estaban. Cuando el tiempo es malo comen bayas, sobre todo si tienen hijuelos. Están casi todo el dia en movimiento; no les inspira mucho temor el hombre; son atrevidos y hasta temerarios con las rapaces. Al contrario de las especies anteriores, rara vez dejan oír su voz; cuando está en celo el macho, entona en voz baja un canto muy sencillo.

Forman su nido en un tronco de árbol hueco ó en la bi-

## EL BUTALIS GRIS—MUSCICAPA GRISOLA

furcacion de las ramas gruesas que arrancan de él; es de tosca construccion y tiene poca coherencia, pero está muy bien relleno. Cada puesta consta de cuatro á cinco huevos, que cubren macho y hembra alternativamente. Cuando los hijuelos han comenzado á volar, acompañan algun tiempo á sus padres, emprenden luego juntos su viaje de invierno á las selvas vírgenes del Africa central y no vuelven hasta muy entrada la primavera.

## LOS BUTÁLIDOS—BUTALIS

**CARACTERES.**—Este sub-género difiere solo de los demás de la familia por tener el pico un poco prolongado y el plumaje algo manchado, siendo igual en ambos sexos.




Fig. 60.—EL PROGNEO PURPÚREO

das y de un amarillo de orin; las partes inferiores son blanquizas, con manchas transversales grises en la region superior de la garganta y en el pecho. La longitud del macho es de 0<sup>m</sup>,14, por 0<sup>m</sup>,25 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0<sup>m</sup>,08 y la cola 0<sup>m</sup>,06 (fig. 62).

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El butalis gris habita toda la Europa, excepto los países mas septentrionales; es comun en el mediodía; por el este se extiende hasta el Cáucaso y el Altai. En sus emigraciones llega al Africa central: yo le he visto en las márgenes del Nilo Azul.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Vive indistintamente en la llanura y en la montaña, en los bosques mas espesos y en los verjeles; ó en otros términos, se fija donde quiera que puede vivir. Los árboles altos, particularmente aquellos que hay cerca del agua, le ofrecen favorables condiciones para su existencia; no teme permanecer cerca de nuestras casas, y hasta se le ve á menudo en el interior de las granjas; pero habita igualmente los parajes muy poco frecuentados por el hombre.

El dominio habitado por una pareja se limita á menudo á una hectárea, y algunas veces á un espacio mucho mas reducido.

Segun la temperatura, aparece en nuestros países á fines de abril ó á principios de mayo, y nos abandona á últimos de agosto ó en los primeros dias de setiembre. Lo mismo sucede en toda Europa; á España no llega antes ni la deja mas tarde que en Alemania ó el norte de Francia.

El butalis gris es un ave vivaz y ágil, que siempre va en busca de una presa. Posado en la copa de un árbol ó de un matorral, en alguna rama seca, desde la que puede alcanzar á larga distancia con la vista, acecha al insecto que pasa, precipitase sobre él apenas le divisa, le coge hábilmente chasqueando las mandíbulas, y vuelve al sitio donde se hallaba.

**CARACTÉRES.**—El butalis gris, tipo del sub-género citado, tiene las regiones superiores de un gris oscuro; el tallo de cada pluma negro; la coronilla de un gris oscuro, con manchas algo mas claras y bordes blancos ó de un gris intenso en las plumas; toda la parte inferior es de un blanco sucio, con viso amarillo de orin en los lados del pecho; en los de la garganta y á lo largo de aquel hay algunas manchas longitudinales poco marcadas, de color gris oscuro; las puntas de las tectrices de las alas, de un gris claro, forman dos ligeras fajas. Los ojos son pardos; el pico y los piés negros. Todos los colores de la hembra son mas pálidos; en los polluelos la parte superior presenta puntos y manchitas blanquizas, grises par

Su vuelo es ligero y rápido; á menudo bate las alas y agita la cola, y no salta de rama en rama, ni baja tampoco á tierra.

Esta ave está mal dotada en cuanto á la voz: su grito de llamada se traduce por *tchitschi*; poseida de amor, emite un grito equivalente á *wisset*, y en sus momentos de angustia grita *tchreck tchreck*, batiendo con fuerza las alas. Su canto consiste en un débil gorjeo, que no es en cierto modo mas que el grito de llamada, repetido en varios tonos distintos.

Aliméntase de insectos alados de diversas especies, pero sobre todo de moscas, mosquitos, mariposas y libélulas: si la presa es pequeña se la traga inmediatamente, y si es demasiado grande, la golpea contra la rama, le rompe las alas y las patas y se la come. En el buen tiempo encuentra fácilmente de qué alimentarse; pero si llueve padece hambre, como las golondrinas; vuela entonces ansiosamente al rededor de los árboles, buscando alguna mosca, y entonces puede verse con qué destreza sabe coger la que divisa; bien es verdad que solo en estos movimientos no es torpe y que no podría cazar de otro modo. Hasta las bayas de que se alimenta algunas veces debe cogerlas al vuelo: delante de mi ventana hay varios groselleros, y cada vez que llueve llega una pareja de butalis grises para registrarlos; los pequeños, que tienen hambre, gritan sobre una rama próxima; los padres vuelan al rededor de la casa, y no encontrando nada, acércanse á los groselleros, arrancan un grano y se lo llevan á su progenie. Repiten varias veces la misma maniobra en pocos minutos; pero cada vez buscan insectos, y dan á conocer así que no se alimentan de frutos sino á falta de otra cosa.

Es muy raro ver á un butalis solo; no se le encuentra con su familia hasta que los hijuelos han comenzado á volar y necesitan aun ser alimentados por sus padres. Macho y hembra, pero sobre todo el primero, ahuyentan del dominio que

han elegido á todos sus semejantes, y persiguen con encarnizamiento á los que se aventuran en él; viven por el contrario en buena inteligencia con las aves mas pequeñas y acosan furiosamente á las que podrian serles peligrosas.

Si no se inquieta á la pareja, solo pone la hembra una vez al año: hacen su nido en diversos parajes, en árboles poco altos, en sauces descopados, en el ramaje que hay cerca del tronco, en la viga de un tejado, en un tronco hueco, ó en la grieta de un muro, etc., y segun Liebe tambien en nidos de golondrinas. Se compone de raíces finas y secas, de musgos y otras sustancias análogas; el interior está relleno de lana, plumas y crines. La hembra pone á principios de junio cuatro ó cinco huevos de un azul verdoso ó azul claro, sembrados de manchas de un rojo pálido. Por espacio de catorce dias cubren macho y hembra alternativamente; los hijuelos se desarrollan muy pronto; pero necesitan aun bastante tiempo antes de bastarse á sí mismos.

Naumann refiere un caso conmovedor del amor maternal del butalis gris: «Un muchacho cogió cierto dia en el nido una hembra con sus cuatro hijuelos, que no podían volar aun, y los llevó á una habitacion. La madre, sin mirar si su prision tenia ó no salida, se resignó con su suerte, y comenzó á cazar las moscas para dar de comer á sus hijuelos, desplegando tal actividad, que bien pronto no quedó un solo insecto. Para que no se muriesen de hambre, el muchacho llevó las aves á casa de un vecino, donde fueron devoradas tambien todas las moscas que habia, y así recorrió la hembra con su prole todo el pueblo haciendo la misma operacion en todas las casas. Al fin la trajeron á la mia, y agradecido yo puse á la hembra en libertad con toda su prole.»

Los gatos, las martas, las ratas y los ratones destruyen con frecuencia los nidos del butalis gris, arrebatan los huevos y matan la cria: los individuos adultos no tienen muchos enemigos, pues el hombre inteligente les dispensa su proteccion. Esta especie es en efecto una de las mas útiles, pues nos libra de una multitud de animales nocivos, y excepto algunas abejas que atrapa de vez en cuando, no causa daño alguno.

**CAUTIVIDAD.**—El butalis gris es muy agradable en jaula; por eso es mas buscado que los papamoscas.

### LOS PAPAMOSCAS—MUSCICAPA

**CARACTERES.**—Los papamoscas difieren de los butalis por tener el pico mas corto que la cabeza; visto por arriba, forma un triángulo equilátero; las alas son mucho menos largas y apenas alcanzan á la mitad de la cola: el plumaje difiere segun los sexos.

#### EL PAPAMOSCAS NEGRO—MUSCICAPA ATRICAPILLA

**CARACTERES.**—En la época del celo, este pájaro tiene toda la parte superior del tronco de color gris muy oscuro, algunas veces con manchas negras mas ó menos marcadas; la frente, toda la parte inferior, una placa de las alas, formada por las tres últimas rémiges primarias, las barbas exteriores de las plumas del hombro y las tectrices del brazo son blancas. La hembra tiene el plumaje de color gris pardo en el dorso y de un pardo sucio en el vientre; las rémiges primarias son de un pardo oscuro; las tres posteriores con borde blanco; las tres últimas retrices de cada lado tienen las barbas exteriores de este último color. Los polluelos se parecen mucho á la hembra; los ojos son de un pardo oscuro; el pico y los piés negros. La longitud de esta especie es de

0<sup>m</sup>,13 por 0<sup>m</sup>,23 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0<sup>m</sup>,075 y la cola 0<sup>m</sup>,055 (fig. 61).

#### EL PAPAMOSCAS DE COLLAR—MUSCICAPA COLLARIS

**CARACTERES.**—Esta especie, mucho mas grande que la anterior, se ha confundido muy á menudo con el papamoscas negro; y en efecto, es difícil distinguir las hembras de ambas especies. El macho adulto de la que nos ocupa se caracteriza por tener un collar blanco; mientras que en la hembra faltan los bordes claros de las rémiges. La longitud de este pájaro es de 0<sup>m</sup>,156 por 0<sup>m</sup>,254 de ancho con las alas desplegadas; estas miden 0<sup>m</sup>,084 y la cola 0<sup>m</sup>,054.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE AMBAS ESPECIES.**—El papamoscas negro habita todos los países de Europa situados mas al sur de la Gran Bretaña y centro de Escandinavia. En invierno emigra al Asia Menor, Palestina y norte de Africa, hasta mas allá de la zona de los desiertos. El papamoscas de collar frecuente mas el sur de nuestro continente, sobre todo Italia y Grecia, desde donde se disemina hasta el sudeste de Alemania. Escasea en el norte de este país y emigra en invierno á los mismos parajes que su congénere.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—La primera de estas especies frecuente muchas localidades de la llanura, al menos en la época de las emigraciones; llega en la primera quincena de abril y se marcha á fines de agosto ó á principios de setiembre. Los machos se presentan por lo general antes que las hembras, y son tambien los primeros en desaparecer.

Estas dos especies, tan semejantes por su estructura y aspecto, no parecen diferir una de otra por sus costumbres. Son aves vivaces y activas, que siempre están en movimiento, pues aunque se posen, menean la cola y agitan las alas; no se las ve tranquilas y silenciosas sino cuando hace muy mal tiempo; entonces parecen enfermas. En los dias buenos por el contrario están muy alegres y de buen humor; vuelan de rama en rama; remóntanse por los aires y se divierten persiguiéndose unas á otras, sin dejar de producir su grito de llamada *pittpitt* ó *weltwett* y agitar las alas y la cola. En la primavera canta el macho con ardor: su canto tiene algo de melancólico y se asemeja al del colirojo.

El papamoscas negro comienza á cantar mucho antes de salir el sol, cuando la mayor parte de las aves del bosque guardan aun profundo silencio, y por lo mismo es tanto mas agradable para quien le oye. La voz del papamoscas de collar consiste en un *zieh* muy prolongado, y su grito de llamada en un sencillo *tak*; el canto, sonoro y variado, es imitacion del de otros pájaros, por ejemplo del cuello azul y del petrocinco. Un individuo cuidado por Gourcy, solia comenzar su canto por *sih, zih, zih*; luego lanzaba un silbido melancólico, seguido de varias notas, tales como *zi zizi*, pronunciadas con tal ardimiento, que se creia oír á un ruiseñor. El canto se asemeja despues mas al del pecho azul; los *zi zi*, pronunciados con menos fuerza, parecen ser las notas fundamentales, y van acompañadas de graves sonidos, análogos los unos á los de la flauta, y roncós los otros como erupción. De vez en cuando se oye un *zi zi ta*, parecido al de los paros, ó un *cri cri* como el del grillo; algunas frases son emitidas rápidamente, y las otras con lentitud y en tono melancólico. Una persona que tuvo varias de estas aves me aseguró que su canto se asemejaba mucho al del colirojo, y que segun estaban en contacto con buenas ó malas cantoras, así producian aires agradables ó ingratos al oído; mis observaciones están de acuerdo con esta opinion.

Su vuelo es fácil, rápido y ondulado; andan por tierra pesada y torpemente.

Los papamoscas cazan los mismos insectos que los butalis: persiguenlos de igual modo; y en caso de necesidad de alimentan de bayas. Cuando el tiempo es malo vuelan por la copa de los árboles, recogiendo al paso los insectos que se posan sobre las hojas; y si es bueno, remóntanse á cierta altura por los aires para atrapar una mosca, un cinife, una mariposa ó alguna langosta; á veces rasan la tierra; y al volar atrapan un insecto. Como todas las aves muy activas, son en extremo voraces, lo cual las obliga á cazar sin descanso.

Estas aves prefieren anidar en los bosques donde hay grandes árboles viejos, de tronco hueco; buscan allí un escondrijo conveniente; cubren las paredes de musgo y raíces, y practican una cavidad central, cubriéndola cuidadosamente con plumas, lana y pelos. Algunas veces fabrican su nido en medio del mas espeso ramaje ó sobre un tronco viejo. La hembra pone de cinco á seis huevos de cáscara delgada y color azul verdoso pálido, los cuales cubre auxiliada por el macho. La incubacion dura unos quince dias; al cabo de tres semanas comienzan á volar los pequeños; pero permanecen aun largo tiempo con sus padres.

«Un papamoscas negro, cuenta Baldamus, anidaba en mi jardin, en un cajon dispuesto para él; habiase acostumbrado perfectamente á que yo le observase y hasta podia llevar su caja á mi cuarto y levantar la tapa, sin que abandonase sus huevos.»

Esta misma ave sirvió de prueba en una polémica científica; dos ornitólogos de primera clase, el príncipe Luciano Bonaparte y Schlegel, director del Museo de Leyden, fueron á visitar á Baldamus y discutieron con él acerca de los papamoscas. Los dos célebres sabios juzgaron la cuestion bajo el punto de vista del coleccionista de gabinete; pero sin lograr convencer á Baldamus, quien observaba sobre todo las costumbres de los animales. En apoyo de su argumento, este último fué á buscar la caja que contenia el papamoscas, levantó la cubierta y convenció así á sus adversarios de la exactitud de sus asertos.

**CAZA.**—Afortunadamente, nadie caza en Alemania estas útiles aves, mas no sucede lo mismo en Italia, donde se aprecia mucho su carne. Cuando pasan por allí en el otoño se les tienden lazos de toda especie, y se cogen muchísimas; véense á centenares en todos los mercados, desde donde pasan á la mesa de los gastrónomos. Dícese que en la isla de Chipre las escabechan con vinagre y especias, conservándolas en botes ó barricas para enviarlas despues á Italia. Parece que hoy dia no se toman ya tanto trabajo; sin embargo se persigue á estas avecillas con el mismo encarnizamiento que antes.

**CAUTIVIDAD.**—Los aficionados aprecian mucho los papamoscas, considerándolos como las aves mas agradables para una habitacion, pues recrean, así por sus costumbres como por su canto. Cuando se las deja volar libremente en el cuarto donde se hallan, le purgan completamente de moscas, y se familiarizan lo bastante para comer en la mano.

### LOS ERITROSTERNOS —ERYTHROSTERNA

**CARACTERES.**—Estos pájaros, llamados tambien papamoscas enanos, se caracterizan por tener el pico relativamente fuerte y los tarsos altos.

#### EL ERITROSTERNO ENANO—MUSCICAPA PARVA

**CARACTERES.**—El eritrosterno enano es uno de los

pajaritos mas graciosos de Alemania. Por la distribucion de los colores, el macho adulto se parece en la primavera á nuestro petirojo; la parte superior es de un gris pardo rojizo, un poco mas oscuro en la coronilla, en la region dorsal y en las tectrices supercaudales, con bordes mas claros en las grandes tectrices de las alas y en las rémiges posteriores; la barba, la garganta, el buche y la parte superior del pecho son de un rojizo de orin; el resto de las regiones inferiores de un blanco sucio; las rémiges primarias, de un gris pardo oscuro, tienen bordes mas claros. En los machos jóvenes el amarillo rojo de la garganta es mas pálido que en los adultos. Los ojos son de un pardo oscuro; el pico y los piés negros. La hembra difiere del macho por sus colores mas opacos. La longitud de esta especie es de 0<sup>m</sup>,12, por 0<sup>m</sup>,20 de ancho con las alas extendidas; estas miden 0<sup>m</sup>,07 y la cola 0<sup>m</sup>,05.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—A pesar de todas las averiguaciones hechas no sabemos aun hasta dónde se extiende el área de dispersion del eritrosterno enano. Raro en el oeste de Europa, se le ve mas á menudo en el este; está diseminado principalmente en todo el centro de Asia hasta el Kamtschatka; visita en invierno el mediodia de la China, así como la isla de Formosa y la India, quizás tambien el norte de Africa. En muchos países donde probablemente vive no se le ha observado aun. Es conocido en casi todas las regiones de Alemania, y aunque siempre se le ha considerado como ave rara, tal vez abunde mucho mas de lo que se supone. No parece ser muy raro en Mecklemburgo; anida con regularidad en la Marca y Pomerania y hasta abunda en ciertos distritos de Polonia, Galitzia y Hungría. Esta especie no figura, sin embargo, entre las que llaman mucho la atencion, y para descubrirla se necesita un observador muy experto.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Este pájaro vive con preferencia en los bosques de altas hayas. «Allí donde los abetos alternan con las hayas rojas, dice Homeyer, donde estos árboles entrelazan sus abundantes ramas de color verde claro y oscuro que apenas permiten penetrar algunos rayos de sol á través del follaje, reina un crepúsculo extraño y misterioso; y en estos bosques vive nuestra avecilla.» Está casi siempre en las copas de los árboles y solo alguna vez baja á tierra. Sus parajes favoritos son las arboledas que lindan con la espesura, pues se refugia en esta si el tiempo es desfavorable, y sobre todo cuando el viento sopla con fuerza. Rara vez se presenta en las inmediaciones de los edificios habitados: es en rigor hijo de la selva silenciosa.

Wodzicki asegura que por sus costumbres y género de vida representa un tránsito entre los papamoscas y las silvias; otros observadores sostienen que no se puede desconocer en el ave el tipo de los muscicápidos.

«El eritrosterno enano, dice Alejandro de Homeyer, prefiere al verde follaje las ramas secas inferiores que se hallan á la altura de trece á diez y ocho metros sobre el suelo. Su dominio es muy pequeño; pero dentro de él está en continuo movimiento, contrariamente á lo que se suele ver en general en los muscicápidos. Coge al vuelo un insecto, pódase á diez pasos de distancia en una rama, donde deja oír su canto; continúa despues volando, apodérase de otra presa en un tronco inmediato, y entonces baja un poco hácia el suelo; pero vuelve al punto á elevarse hasta la verde enramada. Aquí canta otra vez y baja unos seis metros hácia el suelo para visitar á la hembra en el nido, remontándose pronto á las copas de los árboles. Así procede todo el dia; su canto se oye en particular por la mañana; descansa en las horas del medio dia hasta las tres, pero por la tarde, hasta ponerse el sol, vuelve á ser activo como antes. Su grito de