

plumaje de un tinte aceitunado pardusco mate, excepto las plumas exteriores de la cola que tienen un filete blanco.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta es una especie de Africa, que habita principalmente en el cabo de Buena Esperanza, donde permanece todo el año.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Frecuenta sobre todo los jardines, y se familiariza pronto con el hombre si no se la molesta. Algunas veces se encuentran en un solo árbol hasta cuarenta ó cincuenta individuos. Su nido se compone de briznas muy finas, y el interior está cubierto de una capa de musgo: la hembra pone cuatro ó cinco huevos de cáscara fina y verdosa.




Fig. 86.—EL HEDIDIPNO DE CABEZA AZUL.

de este grupo. El macho tiene el lomo de color rojo de sangre; la garganta y la parte superior del pecho del mismo tinte, pero mas claro; la parte superior de la cabeza de un verde violeta con visos metálicos; la nuca de un amarillo aceituna oscuro, y el vientre verde aceituna opaco. Del ángulo del pico parte una línea de un tinte azul de acero, que baja por los lados del cuello ensanchándose. Las rémiges son pardas, con festones de color aceitunado; las mas exteriores pardas tambien, con las barbas externas de un tinte púrpura; las dos rectrices medias de un verde purpúreo oscuro y brillante. El ojo es pardo oscuro; la mandíbula superior negra, la inferior parda y las patas negruzcas. La hembra tiene el lomo de un verde aceituna; y el vientre verde amarillento. El ave mide 0",16 de largo por 0",18 de punta á punta de ala, esta tiene 0",09 y la cola 0",08 (fig. 88).

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Habita en el norte y el este de la India, principalmente en el Himalaya; en las montañas se remonta á una altitud de 800 metros.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Boys cree que esta ave come miel. Tytler asegura haber conservado largo tiempo en jaula un individuo que se alimentaba con pan, leche, agua azucarada y miel. Esto es cuanto he podido averiguar acerca del género de vida del ave.

## LOS TREPADORES— CERTHIIDÆ

**CARACTÉRES.**—Los trepadores son de pequeño tamaño; tienen el cuerpo prolongado; pico endeble, mas ó

## LOS ETOPIGOS—ÆTHOPYGA

**CARACTERES.**—Estas aves representan á los hedidipnos en las Indias: tienen el pico corto, delgado y muy corvo; la cuarta rémige mas larga que las otras; la cola cónica; las rectrices medias muy largas y estrechas. En el macho la línea ó faja naso-ocular es de un color muy vivo. El plumaje de la hembra es casi uniforme y poco vistoso.

### EL ETOPIGO MENOR—ÆTHOPYGA MILES

**CARACTERES.**—Es una de las mas hermosas especies

menos convexo y muy puntiagudo; tarsos raquiticos; dedos largos y provistos de uñas grandes, corvas y aceradas; alas obtusas y endebles, con la cuarta rémige mas larga que las otras; cola bastante prolongada, estrecha y cónica, la cual termina en dos puntas; las rectrices, en número de doce, son fuertes, erectiles y elásticas; las plumas que cubren el cuerpo, son largas y blandas; las del lomo de color de corteza y las del vientre de un color blanquizco. La lengua es córnea, con bordes cortantes, larga y estrecha, algo fibrosa por delante, dentada por detrás y no protractil; su laringe inferior está provista de músculos muy poco desarrollados.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Estas aves, que en opinion de la mayoría de los ornitólogos no constituyen mas que diez y ocho especies conocidas, habitan el hemisferio septentrional del antiguo y nuevo continente, y además las comarcas de la India y de la Australia.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Los certidos habitan los bosques donde pasan toda su vida. Trepan á los troncos de los árboles como los picos, corren por las ramas; pero nunca andan con la cabeza hácia abajo como lo hacen los sítidos. Los mas viven solitarios y silenciosos, y buscan su alimento sin hacerse notar. Se les encuentra comunmente apareados; solo cuando los hijuelos han comenzado á volar se encuentran pequeñas familias; algunos individuos se reúnen con otras aves y vagan con ellas por el bosque; los hay por el contrario que evitan la sociedad. Muchos se alimentan de insectos, de sus huevos y larvas, de arañas y de otros pequeños animales semejantes; tambien comen granos algunas veces. Su pico es tan endeble que no pueden utilizarle sino para registrar las aberturas y grietas, pero no para levantar

las cortezas. Casi todas las especies anidan en troncos huecos, y construyen un nido bastante grande.

### EL TREPADOR FAMILIAR—CERTHIA FAMILIARIS

**CARACTÉRES.**—El trepador familiar (*certhia brachydactyla, longicauda, fasciata, scandula, americana, Costæ, Nattereri y Turneri*) (fig. 89) tiene el lomo gris oscuro, manchado de blanco, y el vientre de este color; la línea que va del pico al ojo es gris parda; sobre este último se nota una raya blanca; la rabadilla es gris parda, listada de rojo amarillento; las rémiges de un pardo negro, adornadas todas, excepto la primera, con una mancha en su extremidad y una faja blanco amarillenta en su centro; las rectrices son de color gris pardo, orilladas de amarillo claro por fuera; el ojo pardo oscuro; la mandíbula superior negra, la inferior rojiza y las patas de un gris tambien rojizo. Las plumas blandas, suaves y sin barbas, lo cual las da cierta semejanza con los pelos. El ave mide 0",13 de largo por 0",18 de punta á punta de ala, la cola 0",055 y el ala 0",061.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta ave habita en toda la Europa, Siberia y América del norte, en todos los sitios donde hay árboles, y se la encuentra además en el nordeste de Africa, en el Asia Menor, Palestina y quizás tambien en el norte de Persia.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Durante la estación del celo habita un dominio muy reducido; mas tarde vaga errante en compañía de los paros, de los reyezuelos, de los sítidos y los picos, aunque no emprende jamás largos viajes.

A semejanza de todas las aves trepadoras, siempre está en movimiento: sube por los árboles, tan pronto en línea recta como trazando una espiral; registra todas las aberturas y grietas de la corteza; introduce su pico en medio del musgo y de los líquenes, y en todas partes donde puede encontrar algo que comer. Trepa fácilmente saltando, y corre por la cara inferior de las ramas. Rara vez se la ve en tierra: cuando baja da saltitos torpemente; su vuelo es rápido pero irregular, no

gustando mucho de recorrer de una sola vez largas distancias. Comunmente se lanza desde la copa de un árbol á la



Fig. 87.—EL HEDIDIPNO MALAQUITA

base del tronco de otro; salta, déjase caer, vuela algun tiempo rasando la tierra; remóntase un poco, y se coge al fin al árbol como antes. Su grito acostumbrado es *sí*, bajo y bastante parecido al de los paros y de los reyezuelos; el de lla-



Fig. 88.—EL ETOPIGO MENOR

mada, mas fuerte, se puede expresar por la sílaba *sri*; cuando está contento pronuncia los sonidos *sí*, *sri*, ó bien lanza un grito breve y penetrante equivalente á *tsi*. En la primavera, cuando el tiempo es bueno, el macho repite estos diversos sonidos con tono monótono y fastidioso.

El trepador familiar no teme al hombre; aventúrase en los jardines, trepa por los muros, y hasta anida en los agujeros

y tejados de las casas. No tarda en reconocer si está seguro ó no: donde sabe que no debe temer la persecucion del hombre, permite que se acerquen hasta él á pocos pasos; pero en otros sitios trata por el contrario de espiar las miradas, y trepa siempre á los árboles por el lado opuesto al en que se halla el observador. Durante el buen tiempo, muéstrase loquaz y alegre; pero si comienza á llover, y hace frío ó hay