

blanco; la cara y todas las regiones inferiores son de un azul ceniciento; las tectrices de los lados y las inferiores de la cola de un ceniciento oscuro, con anchas fajas trasversales blancas; las rémiges de un pardo negruzco, con bordes de un pardo aceituna; las tectrices inferiores de las alas de un negro gris y las rectrices negras, orilladas de un pardo amarillo. Los ojos son de un rojo muy subido; el pico del mismo color en la base, verde en el centro y amarillo en la punta; los piés de un verde vivo. La hembra tiene su parte superior de un gris pardo aceituna, excepto el centro del dorso que es negro con manchas blancas; la garganta de este último color y el pecho de un gris amarillento de orin. Los pollos tienen la cara superior del cuerpo de un pardo claro, con manchas longitudinales blancas; la inferior es parda, con fajas trasversales blancas; la anterior del cuello y superior del pecho de un blanco gris.

LA PULLA DE LOS PANTANOS ENANA —GALLINULA PIGMEA

CARACTÉRES.—Esta especie, muy semejante á la anterior, difiere de ella sin embargo por ser mas pequeña y tener ambos sexos en la primavera el mismo plumaje; tanto en el macho como en la hembra la garganta, la parte anterior del cuello y el pecho son de un azul gris; las plumas de la cara superior del macho negras, con un ancho borde pardo amarillo y cubiertas de manchas, puntos y líneas de color blanco; las plumas laterales de la cara inferior, las tectrices del vientre y las inferiores de la cola son de un negro mate con dos ó tres fajas trasversales blancas. El pico es verde y los piés de un rojo pálido. Esta especie mide unos 0^m,19 de largo por 0^m,30 de ancho de punta á punta de las alas; estas tienen 0^m,08 y la cola 0^m,05.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—No conocemos aun á punto fijo ni el país donde anida, ni toda el área de dispersion de estas dos pollas de los pantanos, tan afines por su índole, sus usos y costumbres. Ambas viven tan ocultas, que probablemente están mas diseminadas de lo que se cree, y abundan dentro de los límites conocidos mucho mas de lo que se supone. La polla de las turberas habita desde el sur de Escandinavia, hácia el mediodía, toda Europa, y además el Asia central desde el Ural hasta el Sind, llegando en sus viajes á otros países donde no anida. Es sin duda mas común en Alemania de lo que suponemos; se la ha visto tanto en Silesia como á orillas del Rhin, tanto en Schleswig-Holstein como en Baviera, en una palabra, en todas partes donde el ornitólogo examinó minuciosamente los sitios favorables.

La polla de los pantanos enana se encuentra desde la Gran Bretaña, en la direccion meridional, por todos los países del centro y sur de Europa y en el centro de Asia desde el Ural hasta la China. En sus viajes cruza el Asia meridional y el Africa llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza. Segun parece, no abunda tanto en Alemania como su congénere, mas á pesar de esto se la ha visto tanto en el norte como en el sur, en el este y el oeste, en las fronteras y en el interior de este país.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Ambas especies viajan de noche. En Alemania no se presentan hasta mayo y por lo regular no antes de mediados del mes; viven en los pantanos donde abunda el agua, en los lagos tranquilos y bordeados de cañaverales ó de yerbas y cubiertos de rosas acuáticas; tambien frecuentan las aguas estancadas de rios y praderas pantanosas; siempre se ocultan, sobre todo de dia, y solo se las ve por la tarde ó por la noche, siendo muy difícil hacerlas remontarse. En agosto, ó lo mas tarde en setiem-

bre, emprenden su viaje de invierno, ocultándose en todos los casos mas que ninguna otra especie de la familia.

Todos los observadores que tuvieron la suerte de ver una ú otra especie en libertad hacen elogios de ellas. Las dos son superiores á la polla de los pantanos manchada, no solo por su belleza, sino tambien por la gracia de movimientos, aunque se asemejen en sus usos y costumbres á dicha especie. Corren, nadan y se sumergen con la misma agilidad, pero su vuelo es igualmente defectuoso, y cuando cruzan los aires llevan pendientes los piés. Saben ocultarse con la misma destreza, pero se presentan mas á menudo al descubierto, á veces de una manera verdaderamente provocativa. Esto se observa sobre todo en la polla de las turberas, observada perfectamente por Naumann y Kutter. «A veces, dice el primero, la inofensiva ave sale de su escondite cuando oye la voz del hombre, apareciendo á la orilla del agua; entonces suele colocarse junto á una hoja flotante ó en algun islote descubierto, y saluda al intruso con voz chillona.» Tambien Kutter habla de la poca timidez, ó mas bien singular confianza de esa especie, al dar cuenta de sus observaciones en una pareja encontrada por él. «La hembra, dice el citado naturalista, corria agachada, aunque rápidamente, sobre las hojas de rosa lacustre y la ligera capa de plantas que cubrian la superficie, apoderándose acá y allá de un insecto acuático; y otras veces nadaba presurosa en medio de las hojas, inclinando con gracia su cabeza. Tambien ví al macho muy á menudo; y entretenidos en su caza, los dos se acercaron á mí de tal modo que no pudieron menos de verme, mas no por eso se inquietaron. Solo un movimiento brusco de mi parte podia espantarlos: entonces sumergíanse con la rapidez del rayo en el líquido elemento quedando invisibles un rato.» La voz de ambas especies es aguda y chillona, asemejándose tanto entre sí que apenas se podría reconocer diferencia. Naumann traduce su grito de llamada por la sílaba *kiihk*. Al acercarse el hombre producen un *kik kik kik*, corto, repetido muchas veces rápidamente y parecido al grito de llamada del pico medio.

El alimento de ambas aves consiste en toda clase de insectos que viven en el agua ó en sus orillas, como por ejemplo escarabajos, moscas, mosquitos, chinches, pequeñas langostas y tambien arañas y caracoles. Algunas veces comen, segun parece, sustancias vegetales tiernas, y las sienten en caso de necesidad. Ciertos individuos cautivos que yo cuidé, aves graciosas por todos conceptos, acostumbráronse pronto á un alimento compuesto de larvas de hormiga y de gusanos de harina.

A fines de mayo ó primeros de junio, ambas especies dan principio á la reproduccion, eligiendo para fabricar su nido un espeso sauce ó yerbas pantanosas, en el agua ó en sus inmediaciones; prefieren un sitio rodeado de aquella por todas partes; inclinan algunos tallos de juncos ó se sirven de una rama conveniente, y sobre esta base vacilante forman su nido, compuesto de hojas secas de caña entrelazadas cuidadosamente en figura de olla. La especie de las turberas pone ocho ó diez huevos; la enana de siete á ocho, de cáscara lisa, grano fino y sin brillo; los de la primera miden 0^m,032 de largo, por 0^m,022 de grueso, y son de color pardo amarillo sucio, con muchos puntos de un pardo amarillo ó gris amarillo: los de su congénere tienen unos 0^m,026 de largo, por 0^m,020 de grueso y son de un color gris amarillento con manchas cenicientas que á su vez están cubiertas de otras de un pardo rojo. Las hembras los cubren con mucho afán, y conducen á sus hijuelos apenas se han secado, al pantano ó á la turbera, á menudo á mucha distancia del nido. Los polluelos nacen con un plumon lanoso negro; al cabo de tres semanas revisten el primer plumaje y abandonan á su madre.

Los mismos enemigos que amenazan á la polla de los pantanos manchada ponen en peligro tambien á sus congénere; los huevos, sobre todo, son devorados muy á menudo por las ratas acuáticas, y tambien los pollos ó la hembra, mientras cubre ó cria, perecen muchas veces entre las garras de los carnívoros ó de las rapaces.

LOS FULICIDOS — FULICIDÆ

CARACTÉRES.— Los fulicidos ó pollas de agua que cuentan cuarenta especies diseminadas en todo el globo y

reunidas en una familia independiente, son tan congénicas de los rálidos, que algunos naturalistas los consideran quizás con razon como tales. Tienen el cuerpo robusto; cuello de mediana longitud; la cabeza grande; pico corto, por lo regular fuerte, alto, grueso, encorvado en la arista, con una protuberancia callosa y desnuda en la frente; los piés son robustos, de altura regular; los dedos muy largos ó bordeados de unos lóbulos laterales; las alas muy cortas, siendo las rémiges tercera ó cuarta las mas largas; la cola es muy corta; el plumaje abundante, suave, é impermeable; de barbas anchas y mas ó menos de un solo color. La estructura interna se parece á la de los rálidos.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Habitan los




Fig. 211.—EL PORFIRIO PURPÚREO Ó CALAMON DE EUROPA

lagos cubiertos de cañas, los grandes pantanos, los estanques, las orillas de las corrientes, cuya superficie se oculta bajo los juncos y las plantas acuáticas; pero siempre en aguas dulces. Viven en medio de los juncos, particularmente sobre el agua cubierta de una rica vegetacion. No corren tan bien como los rascones, pero les aventajan por su destreza para nadar y sumergirse; como ellos tienen el vuelo pesado, vacilante y fatigoso. No son aves sociables: cuando han elegido un dominio, le conservan para sí, ahuyentando de él á sus semejantes, y aun á las otras aves. En tales circunstancias dan pruebas de un valor que se aviene mal con su reducida talla; acometen y matan á las aves pequeñas, y destrozan muchas crías. En cambio son muy cariñosas entre sí las parejas, y manifiestan el mas vivo amor á su progenie.

Su nido se reduce á una tosca construccion de juncos y cañas; se halla en medio de estas plantas ó muy cerca, y á veces flota en la superficie del agua. Los pollos nacen cubiertos de un plumon muy blando, de color oscuro. Despues del período del celo, jóvenes y viejos abandonan juntos el país, y se dirigen á otros mas favorables á fin de mudar. Las gallinulidas observan esencialmente un régimen vegetal.

CAZA.—Se persigue á todas estas aves porque su carne es buena, aunque inferior á la de otras acuáticas; sin contar que abundan mucho y causan considerables daños, lo cual justifica su exterminio. Tambien sufren las continuas acometidas de las rapaces, particularmente de los falconidos; pero escapan con frecuencia sumergiéndose ú ocultándose entre las cañas.

CAUTIVIDAD.—Se puede acostumbrar fácilmente á las

gallinulidas á vivir en pajarera y conservarlas largo tiempo. Las mas se domestican notablemente; hasta hay algunas á las que se puede dejar salir y entrar en la casa libremente, y que siguen al amo cuando pasea. Varias de ellas, no obstante, pecan de molestas por su ardor bético; otras son nocivas porque matan las pequeñas aves de corral.

LOS PORFIRIOS Ó CALAMONES —PORPHYRIO

El tipo de este género, la mas hermosa de las gallinulidas de Europa, merecia ya cierto aprecio entre los griegos y romanos; se criaba en los templos y se le puso bajo la proteccion de los dioses. Hoy dia no sucede así, porque se le caza menos que á las otras gallinulidas, teniendo en cuenta su belleza.

CARACTÉRES.—Los porfirios, ó *pollas sultanas*, como se las ha llamado tambien, son aves de talla regular, pico fuerte, duro, grueso, muy alto, casi tanto como la cabeza, dilatado sobre la frente en una gran callosidad que se corre hasta mas allá de los ojos; los tarsos son largos y fuertes; los dedos grandes, completamente separados; las alas bastante largas y obtusas, con la cuarta rémige mas prolongada; la cola es relativamente larga y redondeada; el plumaje liso, de vivos y magníficos colores.

EL PORFIRIO PURPÚREO Ó CALAMON DE EUROPA—PORPHYRIO VETERUM

CARACTÉRES.—El porfirio purpúreo (fig. 211) tiene

la cara y la parte anterior del cuello de color azul turquesa; el occipucio, la nuca, el bajo vientre y las nalgas de un azul añil oscuro; la parte baja del pecho, el lomo, las cobijas de las alas y las rémiges, del mismo tinte, mas vivo; la rabadilla blanca; el ojo rojizo pálido, rodeado de un estrecho círculo amarillo; el pico blanco, con la callosidad frontal roja; los tarsos de color rojizo de carne. Esta ave mide 0^m,47 de largo por 0^m,83 de punta á punta de ala; estas tienen 0^m,24 y la cola 0^m,10. Los pequeños tienen el lomo gris azul y el vientre manchado de blanco.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Este porfirio habita las regiones pantanosas de Italia, España, Portugal, la Rusia meridional, el noroeste de Africa y de Palestina; preséntase bastante á menudo en el norte de Italia y mediodía de Francia; ha sido cazado repetidas veces en Inglaterra, y una vez, en 1788, cerca de Melchingen, en el principado de Sigmaringen. En los inviernos rigurosos se dirige al sur de España y al noroeste de Africa, mas por lo regular permanece siempre en el territorio donde anida.

EL PORFIRIO SULTAN — PORPHYRIO SMARAGNOTUS

CARACTERES.—El porfirio sultan, el *dicke* de los árabes, tiene la parte posterior del cuello y la anterior del ala de un azul de índigo; la anterior del cuello de un azul turquí; el pecho de azul añil, que pasa poco á poco al negro de pizarra en el vientre; y el dorso de un verde oscuro. Los ojos son pardo amarillentos; el pico de un rojo de sangre, y los piés de un rojo de ladrillo.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta especie, al contrario de la anterior, emprende viajes regulares. A orillas de los lagos del Egipto inferior preséntase á principios de abril, cria sus pequeños y vuelve á dejar su patria para invernar en el centro, oeste y sur de Africa. Segun se dice, se han visto varias veces individuos errantes de esta especie en Cerdeña y el sur de Francia.

EL PORFIRIO ENANO—PORPHYRIO MINUTUS

CARACTERES.—No podemos pasar en silencio esta especie, tipo del sub-género de los hidromios (*Hydrobia*), pues se cazó un individuo jóven en 1857, segun Bolle, cerca de Lucca, y otro algunos años antes á orillas de la Albufera, cerca de Valencia, segun dice Guirac. La cabeza de esta ave, la barba, los muslos y la region de la rabadilla son negras; el dorso, las espaldas y las tectrices de las alas de un verde amarillento pardusco; la rabadilla y las tectrices superiores de la cola de un aceituna oscuro; el cuello, el pecho y el vientre de un azul de cobalto intenso; las rémiges de un negro pardo oscuro, orilladas de verdoso; las rectrices del centro de un verde aceituna pardusco; las otras negruzcas, orilladas de un borde verde aceituna pardusco; y las tectrices inferiores de la cola blancas. Los ojos son de un rojo de ladrillo; el pico de un rojo de coral; la callosidad de la frente de un verde pálido; los piés de un sonrosado oscuro. Los individuos jóvenes tienen la cara superior pardusca y la parte superior del ala verde, con bordes de un pardo amarillo en todas las plumas; la cara inferior es de un amarillo pardusco, mas claro en la garganta; la region de los costados de un azul cobalto; la rabadilla negruzca. La longitud del ave es de 0^m,26, las alas miden 0^m,14 y la cola 0^m,06.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN DE LOS PORFIRIOS.—Todas estas aves viven en los pantanos, cerca de los campos sembrados, y en los arrozales, que continuamente sumergidos, parecen verdaderas lagunas.

Todos los porfirios observan las mismas costumbres, y se parecen mucho, por tal concepto, á nuestra polla de agua, pero su aspecto es mas arrogante y su andar mas majestuoso. Su paso es mesurado; posan con lentitud un pié delante de otro; reunen los dedos en el momento de levantar la pierna; los separan al sentar el pié, de modo que cubren un gran espacio, y á cada paso corresponde un movimiento de cola. A la manera de la polla de agua, los porfirios pueden moverse, medio volando y corriendo, sobre una superficie flotante de hojas acuáticas; nadan bien, aunque no tengan precision de hacerlo; deslizanse ligeramente sobre el agua, y avanzan inclinando con gracia la cabeza. En el vuelo difieren de las otras gallinulidas por su belleza, mas no por la facilidad para moverse; no les agrada remontarse por los aires, pues revolotean con torpeza, y sé posan bien pronto en una espesura de juncos, de cañas ó de altas yerbas, donde se pueden ocultar. Sus largas patas rojas, que llevan pendientes durante el vuelo, son un magnífico adorno; pero por ellas se les reconoce desde lejos. Su voz se asemeja al cacareo de la gallina y al grito de la polla de agua, solo que es mas fuerte y grave que este.

Los observadores han emitido juicios muy contradictorios respecto á la inteligencia de estas aves. No se puede negar que el porfirio azul sea tímido, á la par que prudente, y que su excesivo recelo debe atribuirse á las persecuciones que sufre. Temminck, reproduciendo un relato de Cantraine, refiere que esta ave introduce su cabeza en el agua cuando se ve amenazada, creyéndose asi segura. Todos los demás observadores guardan silencio sobre este particular, y los árabes, que no habrian dejado de notar semejante hecho, no me han hablado jamás de él. Segun mis propias observaciones, puedo decir que el porfirio azul tiene los mismos usos que la polla de agua; que asi como ella, forma parejas, evitando la sociedad de sus semejantes; y que habita cierto dominio en el cual no tolera la presencia de ninguna de aquellas. Es probable que el porfirio azul haga lo mismo.

Estas especies observan el mismo régimen que las otras gallinulidas: en ciertas estaciones se alimentan exclusivamente de sustancias vegetales y de retoños de yerbas, de hojas, de granos y sobre todo de arroz. En el período del celo vagan continuamente por los pantanos en busca de nidos, y devoran las crías de las pequeñas y de las grandes aves. En todos los sitios donde habitan se encuentra un considerable número de cáscaras de huevos rotos, y con frecuencia se observan en los individuos cautivos indicios evidentes de sus instintos sangui-narios. A semejanza de las rapaces, acechan á los gorriones que se aproximan á su comedero, é imitando á los gatos, se ponen al acecho á la entrada de los agujeros de raton. De un solo picotazo, matan á su víctima; cógenla entonces con una pata, la desgarran y se llevan los pedazos á la boca con la otra. Comen con voracidad los peces.

Antes del apareamiento, los porfirios viven sobre todo en los arrozales; pero cuando anidan, fijanse entre los juncos y las cañas. Su nido, siempre bien oculto, y situado comunmente al ras de la superficie del agua, se compone de tallos de yerba, de arroz, de juncos y hojas de caña; su estructura es bastante tosca y se parece un poco al de la gallina, de agua. La puesta se verifica en mayo: consta de tres á cinco huevos un poco mayores que los de la ortega de los abedules, es decir, tienen 0^m,055 de largo por 0^m,038 de grueso; son de forma ovoidea, cáscara lisa, poco brillante, y fondo amarillo de ocre oscuro ó gris rojo, con manchas violáceas, sobre las que se destacan otras aisladas de un tinte pardo rojizo. Los pollos nacen cubiertos con un plumon azul negro; tienen el pico azulado, lo mismo que la callosidad frontal y los tarsos; y aprenden muy pronto á nadar y sumergirse. Sus padres les guían, y velan por su seguridad, anunciándoles cualquier pe-

ligo. En las localidades donde no se les persigue manifiestan mucha confianza.

En los porfirios que yo cuidé pude observar que ambos sexos construyen el nido, cubren alternativamente los huevos y crian juntos su progenie. El macho, sin embargo, solo permanece en el nido el tiempo necesario para que la hembra pueda tomar alimento, pero en cambio vigila, y acomete á todo intruso alado, sobre todo á sus semejantes. Al cabo de veintiocho dias nacen los pollos, que permanecen algunos dias en el nido; entre tanto, la madre los cubre y alimenta con las sustancias que el macho trae. Mas tarde, este último toma tambien parte en la alimentacion; así como la hembra, coge un poco de comida con la punta del pico, de tal modo que solo parece pegada en él; inclínase y la ofrece á los polluelos hasta que estos se deciden á tomarla. A los ocho dias abandonan el nido y comienzan á correr, aunque torpe y apresuradamente, siendo conducidos tan pronto por la hembra como por el macho. Tardan mucho en aprender á buscar por sí mismos el alimento. El plumon es de un negro de carbon, excepto el borde de las alas, que es de un rojo de orin vivo, con varias motas de un rojo canela en la cabeza; este color negro palidece primero en el vientre, y el plumon se convierte poco á poco en el primer plumaje, semejante en la cara superior al de los adultos, mientras que la inferior es de un gris leonado pardusco. Estos colores se igualan, sin mudar la pluma, al de los adultos; al mismo tiempo, el pico y la callosidad de la cabeza, que son de un azul claro, y los piés, de un azul oscuro, se vuelven gradualmente rojos. En diciembre efectúase la primera muda, despues de la cual los pollos no se distinguen ya de los adultos.

CAUTIVIDAD.—Todos los porfirios se domestican fácilmente, acostúmbranse pronto á toda clase de alimento y á los habitantes de la casa; viven con buena inteligencia con las gallinas cuando estas son adultas y se las deja en libertad; vagan por el patio y el jardin ó por la calle; entran en las habitaciones; piden de comer en la mesa, y constituyen entonces un verdadero adorno del corral. Consérvanse tambien muchos años y se reproducen fácilmente cuando se les cuida bien.

LAS POLLAS DE AGUA — STAGNICOLINÆ

CARACTERES.—Las pollas de agua, ó *gallinulas*, se distinguen por los siguientes: pico cónico, comprimido lateralmente, de cortes acerados, formando dientecitos muy finos, y sobrepuesto de una callosidad frontal; patas grandes; dedos largos, de cara plantar ancha, provistos de lóbulos membranosos; alas anchas y sub-agudas, con la tercera rémige mas larga; cola corta, compuesta de doce pennas; plumaje compacto y abundante. Esta sub-familia y á la vez género está representada en nuestros países por la especie siguiente:

LA PULLA DE AGUA COMUN—STAGNICOLA CHLOROPUS

CARACTERES.—A pesar de su sencillo plumaje, la polla de agua es una bonita ave: el manto y la parte inferior del lomo son de un pardo aceitunado oscuro; el resto del cuerpo de un gris apizarrado oscuro; los costados tienen manchas blancas, y la rabadilla es de este color. El iris presenta tres círculos concéntricos: el interno amarillo, el medio gris negro y el extremo rojo; el pico es rojizo en la base y amarillo en la punta; los tarsos de un verde amarillento. El ave mide 0^m,31 de largo por 0^m,60 de punta á punta de ala, esta tiene 0^m,20 y la cola 0^m,06 (fig. 212).

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave, propia de todos los continentes, es comun en Europa, excepto en el extremo norte; es ave de paso en Alemania, donde se presenta á fines de marzo y vuelve á marcharse en octubre. Probablemente viaja apareada y á pié; algunas veces inverna tambien entre nosotros (1).

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—En la primavera llegan por lo regular ambos sexos en la misma noche al estanque, donde anidan; raras veces se presentan uno despues del otro.

Sin embargo, Naumann, que observó largo tiempo á una pareja, pudo ver que tan pronto se presentaba antes el primero como la segunda. Una vez apareció la hembra sola; trató inútilmente de atraer á los machos que pasaban y al cabo de dos semanas desapareció. En otra ocasion se presentó el macho solo; día y noche lanzaba sus gritos de llamada, mezclados con sonidos plañideros, y por último llegó una compañera al cabo de cinco dias. Cuando una pareja ha tomado posesion de un estanque, no se cuida de los gritos que lanzan las aves de su especie al cruzar los aires; pero si está un individuo solo contesta en seguida, invitando á los suyos á que se acerquen á él.

Esta ave busca con preferencia los estanques pequeños cuyas orillas, cubiertas de juncos y de césped, están sombreadas por las cañas y jarales, y cuya superficie líquida se oculta en parte bajo un tapiz de plantas acuáticas. A cada pareja le agrada tener para sí un estanque, y no quiere vecinos; solo en las grandes lagunas se fijan varias parejas, cada una de las cuales defiende su dominio. Si están próximos varios estanques, los machos hacen excursiones en ellos; pero siempre son ahuyentados por los legítimos propietarios, que reunen sus esfuerzos contra el intruso.

«Si tomamos al cisne como símbolo de la sublime majestad, dice Liebe, debemos considerar á la ave, de que hablamos como tipo de la gracia. Esta polla de frente roja se sumerge con la misma facilidad con que revolotea por los cañaverales. De día nada ligera y graciosamente, casi como una gaviota, moviendo á compás su corta cola en medio del follaje de las rocas lacustres y de la yerba ranaria; inclinándose á derecha é izquierda recoge algun pequeño objeto desconocido; á veces se sumerge para buscar una pequeña mata en el fondo, y despues examina la superficie del agua á fin de ver si hay conchas é insectos acuáticos. De noche le gusta trepar por las cañas, lo cual efectúa recogiendo con sus largos dedos al mismo tiempo tres ó cuatro tallos, tan diestramente que apenas puede percibirse el rumor producido. En el período del celo agrádale subir á la copa de los sauces que rodean los estanques, y vagar allí horas enteras. Cuando se la espanta corre ó revolotea sobre las hojas volantes de las plantas acuáticas ó se sumerge, desapareciendo en el estanque.» Si le amenaza algun peligro rema con ayuda de sus alas apresuradamente entre el fondo y la superficie, sube á esta para respirar, asomando solo el pico, y continúa despues su marcha. El vuelo es pesado y poco rápido; el ave suele seguir la línea recta, con el cuello y las piernas tendidas, y á poca altura al principio; despues elévase mas, y entonces vuela mas fácilmente.

«La polla de agua, dice mi padre, tiene una destreza particular para esconderse; aun donde hay pocas cañas se agacha tan bien, que no es posible dar con ella. Conserva el cuello debajo del agua, sin sacar mas que la cabeza, la cual oculta entre los juncos: si se acerca un perro de muestra, se libra de él sumergiéndose. He visto ejemplos sorprendentes de la

(1) En la Albufera de Valencia, donde se la conoce con los nombres de *Polla d'aigua* y *Polleta*, es muy comun, y segun Vidal, reside en todos tiempos.