

LA GAVIOTA VERDE Ó GLAUCA—LARUS GLAUCUS

CARACTERES.—Esta especie, llamada también *alcalde*, y una de las mayores, tiene el dorso y las espaldas de un ligero gris azulado claro, ó azul de gaviota; las grandes rémiges, que con las alas plegadas apenas sobresalen de la cola, tienen un tinte gris azulado claro, y todas las demás partes blancas. Los ojos son de un amarillo de paja; el pico amarillo de limón; la mandíbula inferior tiene sobre el ángulo saliente una mancha longitudinal roja; los pies son de un amarillo pálido. En invierno véase en el cuello varias manchas de un pardusco pálido; en los individuos jóvenes el plumaje es de un blanco sucio, con fajas, líneas onduladas y manchas grises y de un gris pardusco; las grandes rémiges son de este último tinte, pero mas claro. La longitud del ave es de unos 0",75 por 1",70 de ancho de punta á punta de ala; estas miden 0",47 y la cola 0",22.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—La patria de esta hermosa especie es el extremo norte de ambos mundos. En sus viajes llega hasta la latitud de la costa septentrional de Africa, pero la mayoría de individuos inverna en Islandia ó en el norte de Escandinavia, y otros no abandonan su patria.

LA GAVIOTA DE ALAS BLANCAS—LARUS LEUCOPTERUS

CARACTERES.—Esta ave difiere de la anterior por su tamaño mas reducido y sus alas mas largas, que sobresalen varios centímetros de la cola; las rémiges primarias son de un solo color blanco y los pies rojos. En los individuos pequeños ó jóvenes las rémiges son de un blanco gris pardusco pálido, y tienen junto á la punta blanca una manchita de color oscuro en forma de media luna. La longitud es cuando mas de 0",65 por 1",36 de ancho de punta á punta de ala; estas miden 0",43 y la cola 0",19.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—También esta especie es propia del extremo norte, y se presenta todos los inviernos en nuestras costas.

LA GAVIOTA PLATEADA—LARUS ARGENTATUS

CARACTERES.—Esta especie difiere de las dos anteriores por su dorso azul, un poco mas oscuro; por la punta blanca de las tectrices de los hombros y de las grandes superiores de las alas, y por el color de las rémiges primarias; las dos primeras son casi del todo negras, y en la punta, que es blanca, se ve una faja de aquel color; las otras, que adquieren gradualmente hacia su parte posterior un color mas gris, son blancas en la punta y negras junto á ella. Los pies son de un color de carne pálido. El plumaje de los individuos jóvenes se parece al de sus congéneres, pero es mucho mas claro. La longitud del ave es de 0",65 por 1",45 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0",45 y la cola 0",18.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El mar del Norte y el Antártico albergan una infinidad de estos larinos, que también se encuentran en las costas de la América del norte. En sus viajes de invierno visitan todas las costas de Europa y penetran á menudo muy en el interior de la tierra firme por la parte del Mediterráneo y del mar Negro.

LA GAVIOTA AFINE—LARUS AFFINIS

CARACTERES.—Esta especie se distingue de la anterior por tener mas larga la punta de las alas, por el color gris

mate de pizarra del dorso y por su mucho mas reducido tamaño.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta especie representa á la anterior en el extremo norte de América, sobre todo en Groenlandia: últimamente se la ha cazado en Helgoland.

LA GAVIOTA LEUCOFEA—LARUS LEUCOPHÆUS

CARACTERES.—Solo difiere de la gaviota afine por el dorso, que es de color gris de ratón mas bien que azulado, y por los pies, de un amarillo de ocre claro. Los individuos jóvenes tienen completamente el mismo plumaje que los de aquella especie. La longitud del ave es de 0",64, la de las alas de 0",43 y la de la cola de 0",26.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Habita el Mediterráneo y los mares Negro y Caspio, desde donde se traslada á los ríos afluentes, vagando alguna vez también hasta los territorios vecinos.

LA GAVIOTA DE AUDOUIN—LARUS AUDOUINI

CARACTERES.—Las espaldas y el dorso son de un azul de gaviota muy vivo; las dos primeras rémiges primarias tienen en la extremidad una gran mancha blanca; las otras, de un ceniciento mate, son blancas en la punta y negras junto á ella; las rémiges secundarias y las plumas de los ojos son de un blanco azulado en la punta, y todas las otras partes blancas; las inferiores presentan un ligero viso rojo de aurora. En invierno las plumas de la nuca ostentan líneas oscuras en los tallos, y la cara inferior carece del lustre rojizo. Los ojos son pardos; el pico, de un rojo de lacre, está cruzado junto á la punta por una faja transversal oscura; los pies son negros.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El área de dispersión de esta ave parece limitarse al Mediterráneo, desde donde se traslada cuando mas á los ríos afluentes, como por ejemplo el Nilo.

LA GAVIOTA SONROSADA—LARUS GELASTES

CARACTERES.—El viso sonrosado del plumaje de esta especie se extiende por toda la cara inferior del tronco, y oscuro al principio, adquiere gradualmente un matiz mas pálido. El lomo y las espaldas son de un azul de gaviota; la cabeza, el cuello y la cola blancos; las cuatro rémiges primarias anteriores del mismo color en las barbas exteriores, excepto la primera que es negra en este sitio, y las demás de un azul de gaviota; todas ellas tienen las barbas interiores de un ceniciento pardusco y la punta negra. En invierno solo se ve un ligero viso del color sonrosado. Los ojos son de un blanco de perla, y en los individuos jóvenes de un blanco claro; el pico rojo de coral y los pies de un rojo de lacre. La longitud de esta especie es de 0",45 por 1",02 de ancho de punta á punta de ala; estas miden 0",30 y la cola 0",12.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—También este larino habita el Mediterráneo, de donde se disemina por el mar Negro hasta el Caspio, y por otro lado hasta las costas de la India y las del noroeste de Africa.

LA GAVIOTA BLANCA—LARUS CANUS

CARACTERES.—Esta especie, propia del norte, tiene el dorso de color azul de gaviota; el resto de las plumas pequeñas y la cola, blancos; la primera rémige negra, con una

ancha faja blanca junto á la punta; la segunda, igualmente negra, tiene la faja mas estrecha, y mas aun la tercera; las otras son en su mayor extensión grises y solo hacia la punta negras, orilladas, como todas las demás plumas de las alas, de un borde blanco. En invierno, la cabeza, la parte posterior del cuello y los lados del pecho presentan sobre un fondo blanco varias manchas grises; en el plumaje de los individuos jóvenes la cara superior del tronco es de un gris pardusco oscuro; el buche y los costados presentan grandes manchas de un pardo gris. La mitad anterior de la cola y las puntas de las rémiges son de un negro pardo. Los ojos son pardos; el pico de un gris sucio, amarillo en la punta y negro en los pequeños; los pies de un verdoso azul hasta amarillo verdoso. La longitud de esta especie es de 0",45 por 1",12 de ancho de punta á punta de ala; estas miden 0",36 y la cola 0",14.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El territorio donde anida se extiende desde las costas septentrionales de Alemania por el norte del antiguo continente. Esta ave cruza en sus viajes toda la Europa, la mayor parte del Asia y el norte de Africa, visitando también aguas interiores situadas á mucha distancia de la costa.

LA GAVIOTA MARINA—LARUS MARINUS

CARACTERES.—Entre los larinos de dorso oscuro esta especie es la mas grande. La cabeza, el cuello y la nuca, toda la cara inferior del tronco, la parte inferior del dorso y la cola son de un blanco deslumbrante; la parte superior de aquel y las alas de un negro de pizarra, y las puntas de las rémiges blancas. Los individuos jóvenes tienen en la cabeza, el cuello y las regiones inferiores, cuyo fondo es blanco, unas fajas y manchas longitudinales de color amarillento ó pardusco; el dorso y las tectrices superiores de las alas son de un gris pardo con bordes mas claros; las rémiges y rectrices negras, estas últimas con dibujos blancos. Los ojos son de un gris plateado y sus círculos de un rojo de cinabrio; el pico amarillo, y junto á la extremidad de la mandíbula inferior rojo; los pies de un amarillo gris claro. La longitud del ave es de 0",73 por 1",70 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0",50 y la cola 0",20.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—La parte norte de nuestro globo comprendida entre los 70 y 60° de latitud es la patria de este larino. En invierno visita con regularidad las costas del mar alemán del Norte y del Báltico, llegando hasta el sur de Europa y aun mas hacia el mediodía. Raras veces se encuentran en verano individuos adultos de esta especie por la parte del sur mas allá de los 50° de latitud norte. Alguna vez se ven individuos errantes en el interior del país.

LA GAVIOTA OSCURA—LARUS FUSCUS

CARACTERES.—Esta especie, la mas afine de la anterior, difiere de ella por su tamaño, bastante mas reducido, por las alas que sobresalen de la cola, por tener las fajas blancas mas estrechas en la extremidad de las rémiges, y por el color amarillento vivo de los pies. Su longitud es cuando menos de 0",60 por 1",40 de punta á punta de las alas; estas miden 0",40 y la cola 0",15 de largo.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Habita todos los mares de Europa y está diseminada desde la China hasta el oeste de Africa.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—La falta de espacio me obliga á limitarme á la descripción de la gaviota marina.

Atendida su talla, es entre sus semejantes una de las especies menos turbulentas y mas pacíficas, lo cual no es debido á la indolencia ni á pereza, pues distínguese por lo ágil y activa. Anda bien; barbota profundamente en las aguas bajas; nada mucho y con gusto aunque el mar esté agitado; duerme algunas veces flotando en el agua, y mas bien ligera que pesada. Revolotea con las alas tendidas; muévase con lentitud; se cierne formando remolinos, remontándose unas veces contra el viento ó dejándose caer. Resiste al embate de una furiosa tormenta; apenas divisa una presa, cae sobre ella desde bastante altura, hundiéndose en las olas á cierta profundidad. En cuanto á su valor y arrojo, estas aves son superiores á la mayor parte de sus semejantes, así como les aventajan por su tendencia á la rapiña, su avidez y voracidad. Cuando la gaviota marina no se ocupa en la incubación, huye del hombre con tanto cuidado como intrepidez demuestra para acometerle en dicha época. Su voz ronca se expresa por *ach ach ach*; cuando se anima emite el sonido *kjan*, grito que se puede traducir por diversas entonaciones.

Los peces, mas ó menos grandes, constituyen el principal alimento de las gaviotas; sus restos y los de los mamíferos son su comida favorita. Además de esto, dan caza á los lemmings, á los arvicolas, á las aves pequeñas y enfermas que pueden atrapar; arrebatan los huevos de las acuáticas mas débiles, ó buscan en la ribera toda especie de gusanos y animales pequeños. Cuando las gaviotas encuentran restos de crustáceos ó conchas de ciertos moluscos, demasiado duros, vuelan con su presa y la dejan caer desde una gran altura sobre una roca para que se despedace. La gaviota cautiva se acostumbra fácilmente al pan y acaba por comerlo con mucho gusto.

He hallado con frecuencia gaviotas marinas durante mi viaje por Noruega y Laponia; pero no he visto nido alguno sino en la región septentrional del país, en Porsangerfjord. Ví algunos individuos de la especie plateada en las islas Loffoden, en la cima de la montaña, pero no pude encontrar ninguna marina á pesar de mis continuadas pesquisas. Una isla de Porsangerfjord estaba habitada por varios centenares de individuos de estas dos especies: hallábanse los nidos en tierras pantanosas, no muy próximos; pero tampoco alejados unos de otros á mas de cincuenta pasos; los nidos de una especie aparecían mezclados con los de otra, como si toda la colonia perteneciera á la misma. Algunos de ellos eran de construcción esmerada, pero los otros bastante toscos. Las puestas constaban de tres huevos, grandes, de cáscara gruesa, granujientos, mates, con manchitas y puntitas pardas ó de un tinte ceniciento aceitinado ó pardo oscuro sobre fondo gris verdoso. Las gaviotas guardaban sus huevos con mucha solicitud: todas lanzaron discordantes gritos al penetrar yo en la isla; las hembras que cubrían no se movieron, permitiéndome acercarme á pocos pasos cual si esperasen que los individuos encargados de vigilar podrían hacerme retroceder; otras se levantaron produciendo gritos penetrantes, rodeábanme y me acometían sin cesar, remontándose para caer sobre mí de nuevo. Varias veces se remolinaron tan cerca de mi cabeza, que me tocaron con el extremo de sus alas, aunque sin atreverse á herirme con su acerado pico. En algunos nidos encontré pequeños, que al acercarme trataron de ocultarse entre las briznas de yerba, consiguiéndolo perfectamente.

Mas tarde pude observar el trabajo de incubación en los individuos cautivos que yo alimentaba: la pareja habia elegido para anidar un agradable sitio del parque, resguardado por un matorral, y apropiándose un nido que allí encontré, puso la hembra tres huevos, que cubrió ella con preferencia. El macho velaba entre tanto por su compañera, anunciando

mi llegada tan pronto como me veía. Si alguna vez me acercaba al nido mas que de costumbre, macho y hembra se precipitaban contra mí gritando, acometíanme valerosamente, picoteándome á veces con mucha fuerza las piernas. Los pequeños nacieron á los veintiseis días de incubacion, y sus padres les obligaron á salir en seguida del nido; pero al principio los conducian á él todas las tardes. Durante el día se paseaban al rededor de las breñas, y obedecian siempre á los avisos de sus padres, los cuales conocian tan bien mi voz, que me bastaba llamarlos para despertar su inquietud. Siempre que lo hacia, salíanme al encuentro lanzando sus gritos penetrantes *djau, kjau, achach, achach*, y procurando distraer mi atencion de los hijuelos, oprimiéndolos contra sí. La solicitud que manifestaban hacia su progenie disminuía segun iban creciendo, aunque no dejaban de acudir en su auxilio cuando fueron mas grandes siempre que álguien se acercaba mucho. La pareja mantuvo siempre á respetuosa distancia á las demás aves del parque todo el tiempo que duró la incubacion.

Audubon ha observado en la especie un hecho que se refiere particularmente á la gaviota plateada: cuando se inquieta á las hembras viejas que cubren y se les quitan sus huevos, eligen la copa de un árbol para fabricar su nido, y se fijan á considerable altura del suelo.

Las gaviotas no deben temer mucho los ataques de sus enemigos: solo el pigargo ó los estercorarios acometen á las grandes especies de este grupo, aunque tambien sucede con frecuencia, que son acosados á su vez y deben abandonar la presa.

El hombre se apodera de los huevos que ponen; pero no las persigue.

LOS CROICOCÉFALOS—CHROICOCEPHALUS

CARACTÉRES.—Con este nombre se designan las especies de la familia que con su plumaje de verano tienen la cabeza y la parte superior del cuello de un color oscuro, que forma como una capucha.

A pesar de esto no se les puede conceder el rango de género independiente.

EL CROICOCÉFALO ICTIAETO—CHROICOCEPHALUS ICHTHYAETUS

CARACTÉRES.—Esta especie, la mas grande del grupo, tiene la cabeza y el cuello de color negro de hollín; la parte inferior de la nuca, el centro del dorso, la rabadilla, todas las regiones inferiores y la cola, blancas; las plumas del manto de un azul de gaviota; las rémiges primarias blancas, excepto la primera que es negra en las barbas exteriores; las cinco ó seis primeras tienen junto á la punta una ancha faja negra; las rémiges secundarias posteriores son de un azul de gaviota con borde blanco en la punta. En invierno, la capucha negra está indicada solo por algunas plumas mas oscuras. Los ojos son pardos; el pico de amarillo naranja, con una mancha roja cerca de la punta; y los piés amarillos. La longitud de esta especie es de 0",70; la de las alas de 0",48 y la de la cola de 0",19.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave anida en las llanuras situadas entre el lago de Aral y el mar Caspio, desde donde se traslada en verano al mar Negro y al Mediterráneo, á los lagos costeros y á las corrientes de agua dulce del norte de la India. En sus viajes llega algunas veces á la Europa occidental.

EL CROICOCÉFALO RISUEÑO—CHROICOCEPHALUS RIDIBUNDUS

CARACTÉRES.—Esta especie, mucho mas diseminada, y por lo tanto mas conocida que la anterior, ha sido llamada tambien *corneja marina*, *cabeza de moro*, etc. La parte superior de la cabeza y la anterior del cuello son de color pardo de hollín; la nuca, la cara inferior del tronco, la cola y las rémiges, hasta la extremidad, blancas; las plumas del dorso de un azul de gaviota, y las de las rémiges, negras. Los ojos son de un pardo oscuro y sus círculos rojos; el pico y los piés de un rojo de lacre. En invierno falta la caperuza; la parte posterior del cuello es gris; una mancha que hay detrás de las orejas, de un gris oscuro, y el pico y los piés de un color mas pálido que en la primavera. En los individuos jóvenes la parte superior del tronco es pardusca. La longitud de esta especie es de 0",42, por 0",94 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0",31 y la cola 0",13.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave abunda solo mas acá de los 60° de latitud norte y anida desde aquí hasta los 30° de la misma. Construye sus nidos en todas las aguas interiores de Europa, Asia y América, cuando son favorables.

EL CROICOCÉFALO DE CABEZA NEGRA—CHROICOCEPHALUS MELANOCEPHALUS

CARACTERES.—Esta especie se distingue de la anterior por su pico un poco mas grueso, por ser negras las barbas exteriores de la primera rémige y por el viso sonrosado de la cara inferior del cuerpo: el tamaño es el mismo de la especie anterior.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El croicocéfalo de cabeza negra habita en el Mediterráneo, sobre todo en Italia y Turquía.

EL CROICOCÉFALO ENANO—CHROICOCEPHALUS MINUTUS

CARACTÉRES.—El croicocéfalo enano es un ave graciosísima y la mas pequeña de todos los larinos conocidos. Tiene la caperuza de color negro de hollín muy oscuro; el lomo de un azul fino de gaviota; la nuca blanca; la cara inferior del tronco de este mismo color, con viso sonrosado; la cola es blanca; las rémiges de un color azul de gaviota con anchos bordes blancos en la punta. En invierno, la capucha está solo indicada, y la cara inferior del tronco blanca. Los ojos son pardos; el pico de un rojo negruzco; y los piés de un rojo de coral. La longitud es de 0",28, por 0",70 de ancho con las alas extendidas; estas miden 0",22 y la cola 0",09 de largo.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El este de Europa y oeste de Siberia deben considerarse como centro del dominio donde esta graciosa gaviota anida; en invierno se presenta en el sur de Asia y de Europa y el norte de Africa.

Además de los croicocéfalos descritos se han observado en Europa, segun dicen, el croicocéfalo de ojos blancos (*Larus leucophthalmus*) procedente del sur del mar Rojo y del mar Indico, y el croicocéfalo de mejillas negras (*Larus atricilla*), propio de la América del norte. No me parece sin embargo cosa probada que estas dos especies hayan visitado nuestro continente.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—En otros tiempos, el croicocéfalo risueño, cuya descripcion nos da una idea bastante exacta de los usos y costumbres de todos los croicocéfalos, era un ave muy conocida en los lagos y estanques de

Alemania; pero el progreso de los desmontes en la actualidad, la ha ahuyentado de varios países, por donde solo cruza ahora en la época del paso.

Esta ave llega todos los años á los países meridionales de Europa, y abandona nuestras latitudes en los meses de octubre y noviembre para ir á pasar el invierno á las regiones templadas. Vuelve cuando desaparecen los hielos; en los años favorables se la ve ya en marzo, pero por lo general espera los primeros días de abril. Los individuos viejos que se han reproducido ya vuelven apareados, y casi en seguida comienzan á construir su nido, mientras que los jóvenes buscan solo la compañera; los que no son aun aptos para la reproduccion vagan por los campos. La gaviota risueña no busca el mar ni lo habita sino durante el invierno: raro es verla fijarse en las costas bravas, ó en una isla para poner; las aguas dulces rodeadas de campos son sus parajes favoritos.

Esta gaviota figura entre las mas bonitas aves del mar, sobre todo en la época del celo, que es cuando reviste su mas bello plumaje. Sus movimientos son sumamente graciosos, sueltos y ligeros; anda de prisa durante mucho tiempo; sigue horas enteras á los labradores, ó se ocupa en perseguir á los insectos en las praderas y los campos. Nada graciosamente, aunque no con rapidez; remóntase con la misma facilidad ya esté en tierra ó en el agua; vuela velozmente, con la mayor soltura, y sin ningun esfuerzo, trazando en los aires las curvas mas caprichosas.

Sus costumbres son interesantes, y con razon se le considera como un ave cautelosa y algo desconfiada, aunque vive por su gusto cerca del hombre, cuyas intenciones trata de adivinar para ajustar á ellas su conducta. En las pequeñas ciudades de Suiza y en todos los puntos del sur de Europa no alejados del mar, se la considera casi como un ave doméstica. Vaga alrededor de las personas sin inquietud, porque sabe que nadie le hará daño; pero cobra desconfianza cuando ha sido objeto de alguna persecucion, y jamás olvida un engaño. Vive en la mejor inteligencia con las demás aves de su especie, por mas que la envidia y la voracidad sean los rasgos dominantes de su carácter. Reina entre las gaviotas risueñas tal armonía, que se les podría aplicar aquel proverbio que dice que «una corneja no saca los ojos á otra.» No les gusta ponerse en relacion con otras aves; evitan cuanto pueden su compañía, y acometen de concierto á las que se acercan, esperando ahuyentarlas así. Cuando esta gaviota habita una misma isla con otras especies de larinos, precipitase casi con furor sobre sus congéneres si se acercan á su dominio, siendo tratada por ellos del mismo modo. Esta gaviota considera como enemigos, no solo á las aves de rapina, á los cuervos, á las cornejas, á las garzas y á las cigüeñas, sino tambien á los ánades y á otros inofensivos habitantes de las aguas, sobre todo cuando osan acercarse á su nido.

La voz del croicocéfalo risueño es tan desagradable que justifica el que se le haya dado el nombre de corneja marina. Un sonido chillon, *kriach*, constituye su grito de llamada; para charlar emite la sílaba *heck ó skerr*; expresa su cólera por el grito penetrante *kerreckeheck*, ó un sonido ronco equivalente á *girr*, al que sigue el de *kriach*.

Los croicocéfalos se alimentan principalmente de pececillos é insectos, aunque no desprecian los pequeños roedores ó un animal muerto. Esta ave alimenta á sus hijuelos casi exclusivamente de insectos: á pesar de su poca fuerza, acomete á los animales de cierta talla cuando pueden servirle de presa, y sabe reducir hábilmente los grandes pedazos de carne á pequeños fragmentos proporcionados á su esófago. No le agradan las materias vegetales, pero se acostumbra bien pronto al pan y acaba por comerle con evidente placer. Caza durante todo el día, descansa un instante y vuelve á revolotear.

Abandona los lagos para ir en busca de alimento á los campos y praderas, volviendo despues al agua para beber y bañarse: hecha la digestion, comienza de nuevo su cacería. A la ida y á la vuelta suele seguir el mismo camino, pero explora tan pronto una region como otra.

La estacion de la puesta comienza á fines de abril: la colonia de aves, turbulenta al principio, acaba por apaciguarse despues de numerosas contiendas para obtener un sitio. Jamás se ve á los croicocéfalos risueños anidar aislados, y rara vez en reducidas bandadas, pues por lo regular constituyen agrupamientos de centenares y miles de individuos, que se aglomeran cuanto es posible en un reducido espacio. Los nidos están situados en espesuras de cañas ó de juncos, en medio de aguas tranquilas ó de un pantano; se componen de briznas de aquellos ó de pequeñas cañas; algunas veces están en medio de la yerba, pero siempre en parajes difícilmente accesibles. Las aves comienzan por amontonar estos materiales, forman la cavidad, y á principios de mayo se encuentran en cada nido de tres á cinco huevos. Estos tienen bastante volúmen, pues miden unos 0",050 de largo por 0",036 de grueso; su fondo es ligeramente verdoso como el del aceite, y están cubiertos de manchitas y puntos de un tinte gris ceniciento que tira al rojo ó de un pardo oscuro; pero algunas veces varían de forma y de color. Macho y hembra cubren por turno, aunque solo durante la noche, pues consideran que de día basta el calor del sol.

Los pequeños nacen á los diez y ocho días, y al cabo de tres ó cuatro semanas tienen ya suficiente fuerza para emprender su vuelo. Cuando el nido está rodeado de agua, no le abandonan en los primeros días, pero en las pequeñas islas les gusta salir para recorrer la tierra firme. A los ocho días se aventuran ya en el agua, á la segunda semana revolotean, y á la tercera se declaran ya casi independientes.

Los padres se ocupan continuamente en preservar á sus hijuelos de todo peligro: si se presenta alguna rapaz á lo léjos, una corneja ó una garza real, prodúcese gran agitacion en la colonia, oyéndose al momento ruidosos clamores; las hembras que cubren abandonan sus huevos; espesas falanges de estas aves se lanzan contra el enemigo, y se valen de todos los medios para ahuyentarlo. Acometen valerosamente al perro y al zorro, y rodean al hombre que se acerca, lanzando al mismo tiempo tan ruidosos gritos, que se necesita verdaderamente cierto valor para soportar semejante clamoreo. Persiguen encarnizadamente al enemigo que huye, y solo poco á poco se vuelve á restablecer la tranquilidad.

CAZA.—En la Alemania del norte hay costumbre de organizar cacerías contra estas aves en épocas determinadas, y entonces se matan algunos centenares de individuos; pero por otra parte, siempre recibe uno ú otro de los cazadores algunos perdigones. Esta inútil efusion de sangre conocida con el nombre de *tiro de las gaviotas* y que es una fiesta popular, recuerda una censurable costumbre de los habitantes de la Europa meridional, y no tiene excusa alguna. Los croicocéfalos risueños, léjos de ser nocivos, como se ha creído hasta el día, son por el contrario aves útiles, que durante su existencia prestan servicios en los campos. Los pocos peces que cogen nada significan si se tiene en cuenta el sinnúmero de insectos que exterminan; y por lo tanto se les debería tener alguna consideracion, aun cuando solo fuese porque constituyen un bello ornamento de nuestros rios y lagos.

CAUTIVIDAD.—Los croicocéfalos risueños son muy agradables cuando están cautivos, sobre todo si se crían desde pequeños. Aliméntanse principalmente de carne ó de peces; pero se les puede acostumbrar á que coman pan, de modo que su mantenimiento es poco costoso. Si se comienza por cuidarles bien, adquieren pronto una notable docilidad;