

ce tambien curiosos dibujos formados por las manchas. El elafis de cadena mide unos 4 piés (medida inglesa) (fig. 63).

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta especie habita los mismos países que la anterior.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Los parajes húmedos y sombríos son de ordinario los que prefiere esta serpiente, que se alimenta de pequeños cuadrúpedos, reptiles y aves, cuando las puede coger. Es un animal de perversa índole y temible por su ferocidad.

### LOS ESPILOTES—SPILOTES

**CARACTÉRES.**—Con el nombre de espiotes ó culebras manchadas, Wagler forma un género de ofidios, cuyos caracteres son los siguientes: el cuerpo esbelto, fuertemente comprimido en los lados, y por lo tanto elevado en el dorso en forma de quilla; la cabeza prolongada, oval, con el hocico redondeado y bastante destacada del cuello; ojos grandes; las ventanas nasales redondas y dispuestas lateralmente en la extremidad del hocico, y la cola de longitud regular, pero esbelta y aguzada. Grandes escudos protegen la cabeza, mientras que el cuerpo aparece cubierto por escamas romboidales, comparativamente pequeñas y angostas, y algo aquilladas en la línea dorsal.

### EL ESPILOTES CANINANA—SPILOTES POECILOSTONA

**CARACTÉRES.**—Como tipo del género elegiremos la culebra manchada propiamente dicha, el *caninana* de los brasileños, ofidio del que tenemos algunas noticias merced á las observaciones del príncipe de Wied y de Schomburgk.

Esta culebra, que alcanza hasta 2 y 3 metros de largo, lleva sobre fondo amarillo-gris, fajas gris-azuladas ó negruzcas en forma angular con el vértice inclinado hácia adelante. Desde el ojo hasta el cuello, corre á cada lado un rasgo mas oscuro; los escudos labiales tienen igualmente los bordes oscuros; la parte inferior del cuerpo está manchada de negro, sobre fondo pardo oscuro. En una sub-especie ó variedad de algunos naturalistas, pero que el príncipe de Wied supone ser el macho, la parte inferior del cuello, la abdominal y los bordes de los escudos labiales aparecen de un tinte amarillento.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—La caninana es una de las culebras de mayor tamaño y mas comunes del Brasil y de la Guayana. Hasta el presente no se sabe que habite otros países.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Fija esta culebra su morada, por lo general, en los grandes bosques, ó en los terrenos húmedos y pantanosos; trepa por los árboles, y nada en el agua con grande agilidad, mientras que en el suelo reptaba con menos soltura. Consiste su alimento principal en ratas, en pájaros y los huevos de estos, aunque acomete tambien á varias especies de su clase. El príncipe de Wied dice que la vió mas de una vez despues de tragarse un sapo, en completo estado de postracion, y su cuerpo ensanchado de una manera informe. Es de todo punto inofensiva; deja que el hombre se le acerque hasta muy corta distancia, y no da otra señal de inquietud que levantar un poco la cabeza y dilatar el cuello. Aunque casi todos los indígenas saben que este reptil nada tiene de peligroso para el hombre, hay, sin embargo, algunos que se empeñan en considerarla como venenosa, ó que realmente la confunden con especies que lo son, y la tratan como si lo fuera.

Algunos observadores mas recientes difieren de la opinion del príncipe, calificando á este reptil de audaz y maligno.

Todas las especies del género se asemejan por sus usos y costumbres. Una especie afine de la que hemos descrito ha sido llamada por los brasileños *devoradora de gallinas*, porque aseguran que manifiesta una preferencia especial por los polluelos. Habita muy á menudo en las inmediaciones de los rios donde causa con frecuencia un espanto terrible á las lavanderas negras, que entretenidas en la conversacion y sin hacer caso de lo que pasa á su derredor, ven aparecer de pronto una serpiente de esa especie. Los brasileños refieren los cuentos mas maravillosos del espiotes, pretendiendo entre otras cosas que visita las mujeres dormidas en su lecho para mamar de sus pechos.

Puede ser que se haya sorprendido alguna vez á esta culebra bebiendo leche; pero á pesar de eso no puede caber duda de que tales cuentos no son sino fábulas que carecen de toda verosimilitud.

**CAUTIVIDAD.**—Acerca de este punto, véase lo que dice Schomburgk: «Durante varios meses he tenido cautiva á una de estas culebras, que media 6 piés de largo, y pude estudiarla detenidamente. Lo que mas me llamó la atencion fué su constante deseo de beber, circunstancia de que solo me apercibi por casualidad. Cuando ya hacia algunos dias que la tenia en casa, reparé que sus fuerzas vitales habian disminuido bastante: no queria comer y permanecia todo el dia enroscada en un rincon de la jaula. Para refrescarla, la rocié con algunas gotas de agua, é inmediatamente se puso á recoger el líquido que corria por el suelo. Desde entonces cada dia se le daba una racion de agua, como á los demás animales, y jamás dejaba una gota. Consistia su alimento en ratones y pájaros vivos, que en el momento de introducirlos en la jaula, los cogia por la cabeza y se los engullia. Despues de comer, se tranquilizaba y permanecia casi todo el dia en un mismo sitio, sin moverse, haciendo la digestion, pero despidiendo al propio tiempo un hedor insoportable. Dos ó tres horas despues, se encontraban en el suelo de la jaula, en forma de pelota, las plumas y todo aquello que el estómago no habia podido digerir. Animales muertos no tocaba jamás aunque le apretase el hambre. Esta magnífica culebra, que tenia ya muy domesticada, la perdí desgraciadamente cerca de las costas de Inglaterra; sin duda alguna, el frio fué la causa de su muerte.»

### LOS CORIFODONES—CORYPHODON

**CARACTÉRES.**—Llamamos corifodones á las especies de la sub-familia que se distinguen por su gran tamaño, su estructura robusta, y el corte trasversal del tronco, que es redondeado; la separacion de la cabeza se marca mucho; la cola igualmente adelgazada, mide la tercera parte ó mas de la longitud total del cuerpo; las escamas, lisas y ligeramente aquilladas, están dispuestas en quince series longitudinales; las de la cabeza son de forma regular y las del vientre planas; los dientes aumentan en tamaño de adelante atrás.

### EL CORIFODON PANTERA—CORYPHODON PANTHERINUS

**CARACTÉRES.**—Dice el príncipe de Wied que la coloracion de esta culebra es constante, esto es, que no varía, como sucede en otras, segun la edad y el sexo. Es un fondo gris amarillento, con una serie longitudinal de grandes manchas pardas, orilladas de tinte mas oscuro, que en el cuello afectan la figura de losanges, mientras que en el dorso son de forma irregular, pero flanqueadas á cada lado de otra mancha parecida. Los escudos labiales de color amarillo blanquizco tienen un engaste negro, y detrás de cada ojo se

ve un rasgo pardo oscuro. En los individuos jóvenes, las manchas están mas apiñadas, lo que hace aparecer mas oscura la coloracion general.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—La culebra pantera habita el este del Brasil y la Guayana. El príncipe de Wied la vió cerca de Rio Janeiro, en las alturas cubiertas de arbustos que se encuentran detrás de San Cristóbal, y tambien mas al norte en Parahiba y Espíritu Santo.

Wucher la observó cerca de Bahía y Hensel en el Rio Grando do Sul. No es raro á orillas de Espíritu Santo, y cerca de Bahía es una de las especies mas comunes.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Este reptil frecuenta los terrenos pantanosos y los húmedos cubiertos de arbustos y pequeñas plantas. No es tan ágil en sus movimientos como otras especies del mismo género, y fácilmente se le puede uno acercar, sin que por eso dé muestras de inquietud. Consiste por lo general su alimento en sapos y ranas, siendo tambien probable que acometa dentro del agua á los peces; parece por consiguiente que en lo esencial observa el mismo género de vida que nuestra culebra comun. En Rio Grande do Sul se le confunde á menudo, segun Hensel, con el chakaraka, serpiente en extremo temida y venenosa.

### LA CULEBRA NEGRA—CORYPHODON CONSTRICTOR

**CARACTÉRES.**—Tiene la parte superior de su cuerpo de un negro azulado, que se convierte en el abdomen en ceniciento y por debajo del cuello en gris claro; algunos individuos presentan manchas irregulares de tinte mas subido que la coloracion general (fig. 64).

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta especie es originaria de la América del norte.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—De todos los ofidios norte americanos este es el mas extendido y el que mas abunda. Busca con preferencia las localidades ricas en aguas, y fija su morada en las márgenes de los rios y lagos, especialmente donde encuentra arbustos ó maleza en contacto inmediato con el agua. Lo mismo que muchas culebras de nuestro continente, emprende la especie de que tratamos excursiones á través de los terrenos secos, siendo entonces cuando se la puede observar en las mas distintas localidades. Si hemos de dar crédito á las relaciones de la mayor parte de los viajeros y naturalistas que han estudiado la vida de este reptil en libertad, debemos reconocerle como el mas ágil de su clase. Repta con la misma velocidad por los terrenos secos y pedregosos, trepa con igual destreza por los árboles y nada y se sumerge con extraordinaria perfeccion. Su alimento es muy variado, consistiendo principalmente en peces, reptiles, pájaros y pequeños mamíferos; acomete á las jóvenes serpientes de cascabel y ratas de tamaño muy regular; pero destruye por otra parte gran número de nidos de pájaros muy útiles al hombre. En algunas partes se le considera como uno de los enemigos mas eficaces de sus temibles congéneres. Geyer, que ha observado detenidamente las costumbres de la serpiente de cascabel, considera muy probable el aserto de otros autores respecto á la caza que da la culebra negra á los hijuelos de dicha serpiente, pues los individuos adultos de esta especie persiguen tenazmente á aquella. Esta persecucion suele terminar con la fuga de la culebra, que escapa trepando á un árbol. Ambos reptiles se persiguen mutuamente en un círculo, cambian rápidamente de direccion, pasando uno al lado del otro, y continúan su carrera hasta que la serpiente de cascabel ha llegado al mas alto grado de excitacion y ciega de furor no ve su camino, cuando la astuta culebra trepa con gran rapidez al árbol mas cercano y abandona el campo á su enemigo.

Como consecuencia de la destruccion, que se le atribuye, de las jóvenes serpientes de cascabel, es considerada generalmente la culebra negra como un animal útil; sin embargo, no en todas partes se la mira con buenos ojos, y en alguna hasta es temida, en primer lugar por sus rapiñas en los corrales, y despues por el furor con que, segun afirman algunos autores, suele acometer en ciertas épocas todo cuanto encuentra delante de sí. Refiere Kalm que durante el periodo del celo acostumbra salir como flecha disparada de entre la maleza y acomete al hombre, persiguiéndole con tal rapidez que apenas puede este escaparse; si llega á alcanzarle el reptil, se enrosca inmediatamente á los piés de aquel, obligándole á caer. Sin embargo, no tiene nada de peligroso su mordedura, pues no causa mas daño que la herida poco profunda hecha con un cuchillo. Como cuando repta con suma velocidad por encima de la hojarasca produce la culebra negra un ruido parecido al de la serpiente de cascabel, se la confunde algunas veces con esta, causando el consiguiente susto al viajero.

Los observadores modernos no contradicen este aserto, muy poco probable, que por consiguiente se halla en todas las obras de historia natural sin que se dude de su exactitud, como en mi opinion deberia hacerse. Puede ser que el corifodon negro se precipite con bastante rapidez sobre su víctima; es posible tambien que merezca el nombre de corredor que se le ha dado, ó que se distinga por sus movimientos en extremo rápidos; pero ese cuento es tan extravagante que no se puede creer en su exactitud.

**REPRODUCCION.**—Hasta ahora pocas son las observaciones que se han hecho sobre este punto, con referencia á la culebra de que tratamos. Catesby opina que este reptil debe ser ovovivíparo.

**CAUTIVIDAD.**—Al igual de las demás especies de la misma familia, se conforma muy pronto la culebra negra con el estado de cautividad, y cuidada debidamente resiste la misma durante muchos años. Sin embargo, la compañía de otros ofidios en la misma jaula no es muy de su gusto, y usa para con los de menor tamaño el derecho del mas fuerte, esto es, que de cuando en cuando ahoga á uno de sus compañeros y se lo traga sin contemplacion ninguna.

## LOS DIACRANTERAS —DIACRANTERA

**CARACTÉRES.**—Con el nombre de diacranteras designábase antes á las culebras, en que los dientes posteriores de la mandíbula superior son mas grandes que los otros, hallándose separados de ellos por un claro. Algunos naturalistas creen de bastante importancia tales caracteres para formar una familia independiente de los ofidios que pertenecen á este grupo, curioso para nosotros porque en el sur de Europa se halla representado por varias especies. En estas últimas funda Wagler un género especial.

### LOS ZAMENIS—ZAMENIS

**CARACTERES.**—Los zamenis tienen el cuerpo prolongado, la cabeza plana y marcadamente separada del cuello; los ojos de tamaño regular, con pupilas redondas; las fosas nasales se hallan situadas á los lados, cada una entre dos escudos; en la cabeza se ve además que cada escudo se divide á menudo en dos y hasta tres, y que los ojos están rodeados á veces de pedazos separados de los escudos del labio superior. Las escamas son lisas ó ligeramente aquilladas; los escudos abdominales abovedados; los de los costados afectan tambien un poco la forma de quilla; los de la cara inferior de



la cola están dispuestos en dos series. Numerosos dientes se cuentan en ambas mandíbulas y en el paladar; el último suele ser el mas grande, y está separado de los otros por un pequeño claro.

El zamenis mas comun en Europa es el zamenis de flecha, del que se encuentran dos variedades constantes, consideradas por los naturalistas anteriores como especies.

Una de estas variedades es el zamenis verde amarillo (*Zamenis viridiflavus*) que se halla en la parte occidental de su área de dispersion; la otra no se describió hasta mas tarde bajo el nombre de culebra saltadora (*Zamenis jaculator*), y despues con el de zamenis del Caspio (*Zamenis trabis*); esta última habita en la parte oriental del área de dispersion de la especie. Necesitaríamos varias páginas para hacer una descripción minuciosa de las variedades principales y de segundo orden, y por lo tanto nos limitaremos á indicar á continuación los caracteres de las formas que principalmente deben distinguirse.

#### EL ZAMENIS VERDE AMARILLO—ZAMENIS VIRIDIFLAVUS

**CARACTERES.**—Esta variedad, segun parece, no alcanza nunca el tamaño del zamenis del Caspio; cuando mide 1<sup>m</sup>,30 de largo, pero tampoco suele llegar á esta dimension. La cabeza y la nuca son de un color amarillo gris; el dorso y la cola verdes con fajas trasversales negras é irregulares; las partes abdominales son amarillas, con iguales fajas de un dibujo mas regular; las manchas forman en la parte posterior del tronco unas rayas que se extienden paralelamente hasta la extremidad de la cola. En otros individuos predomina en el dorso en vez del verde un bonito verde amarillo, en cuyo caso las regiones inferiores son de un amarillo canario. Otras variedades tienen el lomo de un pardo aceituna sin manchas, y en una llega á ser completamente negro, con el centro del vientre de un amarillo de paja y la cara inferior de la cola, así como los costados, de un azul metálico.

#### EL ZAMENIS DEL CASPIO—ZAMENIS TRABALIS

**CARACTERES.**—En este ofidio predomina en el dorso un color gris azulado ó pardusco, con rayas longitudinales mas ó menos marcadas, porque el centro de cada escama es de distinto color que el de los bordes. Además de las fajas, que pueden ser mas claras y hasta casi blancas ó bien de un rojo de orin, ó de un pardo rojizo; los individuos jóvenes de esta variedad presentan en el tronco unas manchas negras mas ó menos marcadas y dispuestas en series longitudinales. La parte superior de la cabeza es siempre pardusca con líneas y puntos amarillos y parduscos que constituyen unos dibujos de mármol. Los escudos de los labios superiores y los que hay delante ó detrás de los ojos tienen siempre un color claro, ó bien pardusco ó amarillo; los primeros están provistos de bordes estrechos de color mas oscuro; la region abdominal, en cambio, es de un solo color, tan pronto amarillo pardusco como rojo de ladrillo; los escudos del vientre, en algunos individuos, están muy orillados de negro en su borde posterior, y además se observan en ellos unas manchas poco marcadas y de color gris.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE AMBAS VARIETADES.**—El zamenis verde amarillo está diseminado desde la Hungría occidental por todos los países del Mediterráneo, pero solo en Francia penetra hasta mas allá de los Alpes. Abunda en Croacia, Carniola, el sur de Carintia y el

del Tirol; en este último país, segun Gredler, llega á ser la culebra que mas á menudo se encuentra, por cuanto se aproxima atrevidamente á las casas. En la parte meridional de Suiza, es decir, en el Tesino y Valais, escasea, y Fatio cree que allí ha sido importado por los romanos, porque se le encuentra en varios baños; en muchas regiones del sur de Francia, y en el norte, hasta los 50°, este ofidio no es del todo raro; abunda en España y mas allá del Mediterráneo, es decir en Marruecos, Argelia y Túnez; y es muy comun en los contornos de Roma, donde se le ve en las inmediaciones de la ciudad y hasta en los jardines interiores de la misma. En Dalmacia, segun Erber, abunda mas que ningun otro ofidio; tambien se le ha observado en el Levante.

Desde Hungría, hácia el este, el zamenis del mar Caspio representa á sus congéneres, extendiéndose por todo el sur de Rusia, y desde el Levante por toda el Asia Menor y la Persia. Si hemos de dar crédito á ciertas noticias, llega hasta á la India oriental. Se le conoce desde Buda-Pesth por toda la Hungría, Eslavonia, las islas Cícladas, el Asia Menor, los países del Cáucaso, en las regiones interiores del Volga, del Tereck, del Ural, y en general por toda la Rusia meridional, desde el Dnieper hasta el mar Caspio. En las estepas del sur de Rusia puede considerarse este ofidio como la serpiente mas comun. Reuniendo ambas variedades en una especie, como yo propongo, y designando á esta con el nombre de zamenis de flecha, el área de dispersion de esta serpiente se extenderia cuando menos desde la costa occidental de la península Ibérica hasta la costa oriental del mar Caspio y desde los 36° hasta los 50 de latitud norte.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—El zamenis elige su residencia al acaso, tal como se le ofrece la localidad. En las estepas de la Rusia habita las llanuras mas secas y cálidas; en Dalmacia y el Tirol busca los lugares bañados por el sol, pero no secos, de las regiones cultivadas, fijándose en los arbustos ó á lo largo de las cercas, en las calles ó ruinas antiguas y en montones de piedra, tanto de la llanura como de las montañas bajas. Tambien trepa á los árboles, ó por lo menos Gredler asegura haber observado que al sacudir algunos cayeron tales serpientes en vez de insectos.

El alimento de los zamenis se compone, segun Erber, de lagartos y ratones, pero probablemente tambien de otros ofidios, porque se ha observado en cautividad que ataca á estos últimos. En todo caso parece que prefiere los reptiles á los ratones. Erber y Metaxa observaron como acometia serpientes. Metaxa tuvo un zamenis verde amarillo reunido con otros en la misma jaula, y con gran pesar suyo echó de ver que el primero habia devorado dos de sus compañeros, entre los cuales se contaba uno de su misma especie. Se acudió cuando habia devorado ya la mitad de su segunda victima, y habiéndosele obligado á expelerla, reapareció viva é ilesa; en cuanto á la primera, extraida del estómago de su enemiga, despues de matar al reptil, aun no estaba muerta. Erber pudo ver como un zamenis le devoró un tarbofis vivaz, observando que ni siquiera teme á las especies venenosas de su orden y que sobre todo ataca y devora á la víbora de las arenas. Segun las observaciones de Effeldt, los lagartos verdes constituyen su alimento favorito, pero tampoco desprecia de ningun modo los ofidios, comiéndose así los de la misma especie como los de otra cualquiera. Una vez llegó á tiempo para ver como un zamenis verde amarillo de mas de un metro de largo estaba devorando otro individuo de la misma especie y de casi igual longitud; á pesar de todos sus esfuerzos no pudo introducirle en el estómago, de modo que el observador se vió obligado á cortar la parte que aun salia de la boca. Otra vez sorprendió á una que ya habia devorado la mitad de un individuo de la misma especie, y con la esperanza de

salvarle, obligó al voraz reptil á soltar su presa, que al fin salió viva, aunque en extremo débil. Sin embargo, al otro dia las dos serpientes habian muerto. En las islas Cícladas los griegos temen mucho á los zamenis, segun Erber. «No cabe duda, dice, que saquean los gallineros y palomares, pero quizás sea una exageracion acusarles de robar tambien corderos.»

Segun la afirmacion de Erhard, cuyas noticias están conformes con las de otros naturalistas, el zamenis no tiene nada de la pereza de otros ofidios; muy léjos de ello, siempre está en movimiento; persigue á su presa corriendo y saltando, con el cuerpo medio erguido; y por eso parece muy bien elegido su nombre alemán de *phelmnatter* (culebra-flecha); trepa por los árboles y atraviesa á nado las aguas, cruzando, segun aseguran los pescadores griegos, hasta los brazos de mar. No la infunde ningun temor el hombre; muy por el contrario, le ataca siempre primero, silbando y bufan-

do con fuerza, como lo hacen, segun se dice, las serpientes venenosas de la India occidental.

Entre las serpientes no venenosas de Europa el zamenis pasa con razon por el mas mordedor y vivaz. La pequeña variedad conocida en Alemania bajo el nombre de *zornnatter* (culebra irascible, *coluber communis*, ó sea la culebra verde amarilla ya citada,) procura generalmente morder al que quiere cogerla; el zamenis del mar Caspio, especie mas grande que la anterior, si bien suele retirarse, no teme al caballo ni al jinete, y hasta osa acometer cuando este último la sorprende. Segun las observaciones de Pallas, entonces se coloca algunas veces en espiral; deja al adversario acercarse y tiende súbitamente la cabeza hácia adelante para morder, cogiéndose á menudo á los labios del caballo, á la manera de un perro de presa. No podemos extrañar por lo tanto que los zamenis de mayor tamaño sean temidos en todas partes á causa de su índole maligna; aunque les falta, sirviéndonos



Fig. 65.—LA CULEBRA DE COLLAR

de la expresion de Erhard, el veneno infernal de las víboras de lanza y del laquesis, y aunque sus ataques contra un hombre experto solo redundarian en perjuicio del reptil, pueden asustar sin embargo bastante á los niños y mujeres ignorantes. En las islas Cícladas y en todas las del Mediterráneo en general, sin exceptuar Sicilia y las islas Jónicas, circulan con frecuencia relatos en que se habla de la muerte de alguna ú otra serpiente de tamaño extraordinario, tratándose de hacer creer que estos reptiles fueron en otro tiempo el terror de los que habitaban cerca de ellos. Así por ejemplo, cuéntase que en Cefalonia, isla que segun Erhard puede considerarse como un verdadero nido de serpientes, dos hermanos mataron en el pico de una montaña, durante su sueño, una serpiente que hacia mucho tiempo habia fijado allí su domicilio, haciendo inaccesible durante muchos años la montaña tanto para hombres como para animales; Erhard averiguó en el lugar mismo que la montaña en que al decir de la gente se efectuó la hazaña conservaba todavia el nombre de los dos hermanos, habiendo sido cedida por documento formal á estos y sus descendientes como propiedad perpetua y exenta de contribucion.

Así tambien se refiere que en la region de Gallipoli, á orillas del Bósforo, en territorio asiático, se mató hace bastantes años una serpiente solo de una perdigonada dirigida á la cabeza; el reptil arrancó de raíz en su agonía las cepas que le rodeaban, solo con los movimientos convulsivos de su cola: tres hombres no pudieron trasportar su cadáver. No es necesario probar que todos los cuentos de esta clase son cuando menos muy exagerados, pero deben citarse porque probablemente todos se refieren á nuestra culebra.

**CAUTIVIDAD.**—A causa de la índole maligna del zamenis, no es fácil obtener individuos vivos. Erber le tacha además de astuto y cauteloso, alegando que estas cualidades dificultan mucho su caza; añade tambien que en cautividad se muestra siempre tímido, lo cual no impide que el guardian, aunque el reptil se haya familiarizado al parecer con él, se acerque con precaucion, porque nunca puede estar seguro de sus mordiscos. Acostúmbrase sin embargo pronto á comer y pierde tambien paulatinamente mucho de su irascibilidad, pero nunca se domestica verdaderamente y necesita tanto calor, que en los países septentrionales no resiste el invierno sino cuando se le prodigan todos los cuidados posibles en una jaula bien arreglada.

#### LOS PERIÓPIDOS—PERIOPS

**CARACTERES.**—Wagler separó, bajo el nombre de periópodos, algunas especies de zamenis, formando con ellas un género independiente. Estas especies se caracterizan por su tronco prolongado y plano en la cara inferior; la cola, fuerte y corta, solo ocupa una quinta parte de la longitud total; los ojos se hallan en cavidades marcadas, separados de los escudos de los labios superiores por tres ó cuatro escuditos irregulares; las sienas están cubiertas de muchos escudos escamosos, pequeños é irregulares; las escamas pequeñas, en forma de lanceta y prolongadas, tienen por delante dos foseas puntiformes y pertenecen á la clase de escamas sobrepuestas; forman de veinticinco á veintisiete series longitudinales.