

pecho, ni los cordones del mismo color, que parecen servirle de lazo; tiene la garganta gris; el pecho y el vientre, de amarillo-verduzco; y toda la parte superior del cuerpo, del mismo color, algo mas subido. En general esta hembra no difiere mucho del ave representada en las láminas iluminadas con el nombre de *mirlo de vientre anaranjado del Senegal*.

Brisson habló del peto-negro de que se trata en este artículo, como de una ave procedente del cabo de Buena-Esperanza; y ciertamente procedia de allí, pues fue traída por el abad de La Caille: pero si hemos de creer á Edwards, venia aun de mas lejos, y su verdadero clima es Ceilan. Edwards tuvo ocasión de tomar informes exactos acerca de esto de Juan Gedeon Loten, que fue gobernador de Ceilan, y que á su vuelta de las Indias regaló á la Sociedad Real muchas aves de ese pais, entre las cuales habia un peto-negro. Edwards añade una reflexion muy justa, que ya hice en los tomos anteriores, y que no será inútil repetir aquí; á saber, que siendo el cabo de Buena-Esperanza un punto de reunion á donde aportan buques de todas partes, deben encontrarse allí mercaderías, y por consiguiente aves de todos los paises; y que muchas veces se padece equivocacion, suponién-

do que todas las que vienen de aquella costa son originarias de ella. Esto manifiesta claramente porque en los gabinetes hay tanto número de aves y de otros animales que se titulan del cabo de Buena-Esperanza.

X.

EL VERDE-ANARANJADO (*), ó MIRLO DEL SENEGAL CON VIENTRE ANARANJADO (**).

He llamado á esta especie nueva *verde-anaranjado*, porque este nombre recuerda la idea de los principales colores de esta ave. Un hermoso verde-subido, enriquecido con reflejos que giran entre diferentes gradaciones de amarillo, reina sobre toda la parte superior del cuerpo, comprendidas la cola, las alas, la cabeza, y aun la garganta; pero en la cola es mas claro que en lo restante del cuerpo. La parte inferior de este desde la garganta es de un brillante anaranjado; y además, en las alas cuando plegadas se percibe

(*) *Oranvert* del Autor.

(**) Reunido á la especie precedente.

un rasgo blanco, que pertenece á la orilla este-
rior de algunas de las grandes pennas; el pico y
los pies son pardos. Esta ave es menor que el
mirlo; su longitud es de unas nueve pulgadas; el
vuelo, de trece y cuarto; la cola de tres, y el
pico de trece á catorce líneas.

VARIEDAD DEL VERDE-ANARAN- JADO.

El *anaranjado-azul* (*). He dicho que el verde-
anaranjado tenia analogías con la hembra del
peto-negro; pero no tiene menos con otra ave
representada en las láminas iluminadas con el
nombre de *mirlo del cabo de Buena-Esperanza*,
que yo llamo anaranjado-azul porque tiene toda
la parte inferior del cuerpo anaranjada desde la
garganta hasta el bajo vientre inclusive, domi-
nando esta tinta en la parte superior desde la
base del pico hasta el extremo de la cola. Este
azul es de dos tintas: la mas subida ribetea todas
las plumas, de lo que resulta una variedad deli-

(* Oranbleu del Autor.

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

cada, regular y de hermoso efecto. El pico y los
pies son negros, como tambien las pennas de las
alas, de las cuales la mayor parte de las medias
están ribeteadas de un gris blanco. En fin, el co-
lor de las pennas de la cola es entre el de todas
las plumas del cuerpo el que parece mas uni-
forme.

XI.

EL MIRLO PARDO DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA (1).

Turdus bicolor, L.

Esta nueva especie, casi del mismo tamaño
que el mirlo, es debida á Sonnerat. Su longitud
total es de once pulgadas y media, y las alas se
estienen algo mas allá de la mitad de la cola.
Casi todo su plumaje es de un pardo cambiante,
que arroja reflejos de un verde sombrío; y el
vientre y el obispillo son blancos.

(1) No debe confundirse con otro mirlo pardo del
Cabo, del cual hablaré luego con el nombre de *mo-
renillo*, que es mucho mas pequeño.

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

XII.

EL BANIAHBU DE BENGALA (1).

Turdus canorus. GMEL.

El plumaje de esta ave es enteramente pardo, mas oscuro en la parte superior del cuerpo que en la inferior, como tambien en el borde de las coberteras y pennas de las alas; el pico y los pies son amarillos, y la cola cuneiforme, de unas tres pulgadas y media de largo, la cual escede á las alas cuando recogidas en la mitad de su longitud: he aquí los principales rasgos que caracterizan á esta ave extranjera, cuyo tamaño es algo mayor que el del tordo.

Lineo, siguiendo á los naturalistas suecos que viajaron por Asia, dice que esta misma ave se encuentra en la China, en donde parece que ha sufrido la influencia del clima, puesto que los baniahus de aquel país son grises por encima, de color de herrumbre por debajo, y tienen una

(1) En aleman, *braungelber-mistler*. Algunos le han llamado *beniahbú*.

pinta blanca en los dos lados de la cabeza. La denominacion de *aves cantoras*, que les aplica Lineo apoyándose sin duda en buenos datos, supone que el canto de esos mirlos extranjeros es agradable.

XIII.

EL UROVANG, ó MIRLO CENICIENTO DE MADAGASCAR.

Turdus urovang. GMEL.

La denominacion de *mirlo ceniciento* da en general una idea bastante justa del color que domina en el plumaje de esta ave; pero no debe creerse que este color tenga en todas partes el mismo tono. Es muy subido y casi negro, con leve tinta verde, en las plumas largas y estrechas que cubren la cabeza; menos subido y sin mezcla alguna de otra tinta en las pennas de la cola y de las alas, en el cuello, garganta y pecho; y finalmente, aquel color es mas claro debajo del cuerpo, y toma una leve tinta amarilla cerca del bajo vientre.

Este mirlo es casi del tamaño de nuestra malviz; pero tiene la cola algo mas larga, no tanto las alas, y mucho menos los pies (1); el pico, amarillo como el de los mirlos, marcado con una raya parda hácia el extremo, y acompañado de lagunas barbas al rededor de su origen. La cola consta de doce pennas iguales, y los pies son de un pardo claro.

XIV.

EL MIRLO DE PALOMAR.

Turdus columbinus. GMEL.

Llámanle en Filipinas *estornino de palomar*, porque es doméstico por instinto, y parece que busca á los hombres ó mas bien sus comodidades en sus propias habitaciones, y viene á criar hasta en los palomares; pero tiene mas analogías con el mirlo comun que con el estornino, ora por la forma del pico y de los pies, ora por las proporciones de las alas, que solo

(1) La longitud total del ave es de diez pulgadas, el vuelo de catorce, la cola de cuatro, el pico de catorce lineas, y el pie de nueve á diez.

llegan hasta la mitad de la cola, etc. Su tamaño es á poca diferencia el de la malviz; y el color de su plumaje es liso, aunque está muy distante de ser uniforme y monótono. Consiste en un verde-cambiante, que á cada momento presenta gradaciones distintas, y que se multiplica con mil reflejos. Esta especie es nueva, y la debemos á Sommerat. En su coleccion se encuentran tambien individuos procedentes del cabo de Buena-Esperanza, que pertenecen visiblemente á la misma especie, pero que difieren de ella en tener el obispillo blanco por encima y por debajo, y en ser mas pequeños. No acertamos en si esto será una variedad de clima, ó solamente de edad.

XV.

EL MIRLO ACEITUNADO DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA.

Turdus olivaceus. GMEL.

La parte superior del cuerpo de esta ave, comprendiendo todo lo que se ve de las pennas

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA
PREPARATORIA

de la cola y de las alas cuando están plegadas, es de un pardo aceitunado; la garganta, de un pardo leonado con pintas de color pardo decidido; el cuello y el pecho, del mismo color que la garganta y sin pintas; todo lo restante de la parte inferior del cuerpo es de un hermoso leonado; y finalmente, son pardos el pico, los pies, y el lado interno de las pennas de las alas y de las laterales de la cola.

Este mirlo es del tamaño de la malviz; tiene unas quince pulgadas de vuelo, y nueve y media de longitud total; el pico, doce líneas; el pie, diez y seis; la cola, que consta de doce pennas iguales, tres pulgadas y media; y las alas recogidas solo llegan á la mitad de su longitud.

XVI.

EL MIRLO DE GARGANTA NEGRA
DE SANTO DOMINCO.

Turdus ater. GMEL.

La pieza negra que cubre la garganta de esta ave se estiende por una parte hasta debajo del

ojo, y aun hasta el pequeño espacio que media entre el ojo y el pico; y por la otra baja sobre el cuello hasta el pecho: además, está ribeteada con una ancha faja de un rojo mas ó menos oscuro, que se prolonga por encima de los ojos y parte anterior del vértice de la cabeza. El resto de esta, la cara posterior del cuello, el dorso y las coberteras pequeñas de las alas son de un gris blanco, algo variegado con algunas tintas pardas; las grandes coberteras de las alas y las pennas son de un pardo negruzco, ribeteado de gris-claro, y separadas de las coberteras pequeñas por una línea amarilló-acetunada, que pertenece á dichas coberteras menores. Este mismo amarillo-acetunado reina en el obispillo y en la parte inferior del cuerpo, aunque en esta está variegado con algunas manchas negras bastante grandes y sembradas con claridad por todo el espacio comprendido entre las piernas y la pieza negra de la garganta. La cola es del mismo gris que la parte superior del cuerpo en sola su parte céntrica; pero las pennas laterales están esterriormente ribeteadas de negro, color de los pies y del pico.

Esta ave, que aun no habia sido descrita, es á corta diferencia del tamaño de la malviz; su longitud total es de unas nueve pulgadas; el pi-

COLEGIO CIVIL

L. JONES.

co, de una; la cola, de tres y media; y las alas, que son muy cortas, no llegan mas allá del cuarto de la longitud de la cola.

XVII.

EL MIRLO DEL CANADÁ (*).

Turdus noveboracensis. LATH.

AL mirlo de monte (que solo es una variedad del peto-blanco) es entre todos los nuestros al que parece acercarse mas el ave de que aquí tratamos. Es mas pequeña; pero sus alas son asimismo relativamente proporcionadas á la cola, puesto que plegadas no se extienden mas allá de la mitad de su longitud; y los colores del plumaje, que no son muy diferentes, están casi distribuidos del mismo modo. Consisten en un fondo oscurecido, variegado indistintamente con un color mas claro, á escepcion de las pennas de la cola y de las alas, que son de un pardo negruzco y uniforme. Las coberteras de las alas

(*) Esta especie pertenece al género *algarroba* de Vieillot, que la llama *algarroba negra*, *pendulinus ater*.

(A. R.)

COLECCION CIVIL
BIBLIOTECA
MUSEO HISTORICO NATURAL

tienen reflejos de verde subido, pero lustroso; todas las otras plumas son negruzcas, con estremo rojo: lo que separándolas unas de otras, produce una variedad regular, y hace que pueda contarse el número de las plumas por el de las marcas rojas.

XVIII.

EL MIRLO ACEITUNADO DE LAS INDIAS.

Turdus indicus. GMEL.

TODA la parte superior de esta ave, comprendidas las pennas de la cola y lo que se ve en las pennas de las alas, es de un verde-aceituna subido; toda la inferior es del mismo fondo de color, aunque de tinta mas clara y que participa de amarillo; las barbas internas de las pennas del ala son pardas, ribeteadas en parte de amarillento, y el pico y los pies casi negros. Esta ave es menor que la malviz; su longitud total es de nueve pulgadas y tercio; su vuelo, de catorce y media; la cola, de cuatro; el pico, de quince líneas; el pie de diez, y las alas plegadas llegan á la mitad de la cola.

COLECCION CIVIL
BIBLIOTECA
MUSEO HISTORICO NATURAL

XIX.

EL MIRLO CENICIENTO DE LAS
INDIAS.*Turdus cinereus.* GMEL.

El color ceniciento de esta ave es mas subido en la parte superior que en la inferior; las grandes coberteras y las pennas de las alas están ribeteadas de gris-blanco por fuera; pero la orla de las medianas es mas ancha, y tienen otra del mismo color por dentro, desde su nacimiento hasta los dos tercios de su longitud. De las doce pennas de la cola, las dos del medio ofrecen el mismo color de ceniza que la parte superior del cuerpo; las dos siguientes son en parte de igual color, aunque su lado interno es negro; las ocho restantes son negras como el pico, los pies y las uñas. Cerca del ángulo de la abertura del pico se ven algunas barbas negruzcas.

Esta ave es mas pequeña que el mirlo; ocho pulgadas y tres cuartos son su longitud total; catorce y dos tercios, la del vuelo; la cola tiene

tres y media; trece líneas el pico, y los pies no pasan de doce.

XX.

EL MIRLO PARDO DEL SENEGAL.

Turdus senegalensis. GMEL.

Si sería difícil encontrar cosa mas uniforme y comun que el plumaje de esta ave, no lo fuera menos hallar otra mas fácil de describir. Gris-pardo en la parte superior y anterior, blanco-sucio en la inferior, pardo en las pennas de las alas y de la cola, en el pico y en los pies; he aquí sus señas, obra de tres pinceladas. No iguala á la malviz en tamaño; pero tiene mas larga la cola y mas corto el pico. Segun Brisson, su longitud total es de nueve pulgadas y tercio; su vuelo, de trece; de cuatro su cola; de diez líneas su pico; el pie, de trece; y sus alas cuando recogidas no llegan á la mitad de la cola, que consta de doce pennas iguales.

tres y media; tres líneas el pico, y los pies
no pasan de doce.

EL MIRIO PARDO DEL SENEGAL.

Merula senegalensis, Gmel.

Si sería difícil encontrar cosa más uniforme
y común que el plumaje de esta ave, no lo fuera
menos hallar otra más fácil de describir. Cien-
pardo en la parte superior y anterior, blanco-
sucio en la inferior, pardo en las penyas de las
alas y de la cola, en el pico y en los pies; he
aquí sus señas, copia de tres plumadas. No
igualta a la mayoría en tamaño; pero tiene más
larga la cola y más corto el pico, según Brisson.
su longitud total es de nueve pulgadas y tercio;
su vuelo, de trece; de cuatro su cola; de diez
líneas su pico; el pie; de tres y sus alas cuan-
do recogidas no llegan a la mitad de la cola,
que consta de diez penyas iguales.

FIN DEL TOMO VI.

COLEGIO CIVIL

