

AVES ESTRANJERAS

QUE TIENEN ANALOGIA

CON EL MIRLO DE EUROPA.

I.

EL AMARILLEJO (*) DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA.

Turdus morio. L.

Este mirlo de Africa lleva, como los nuestros, el uniforme de color amarillo y negro; de donde viene su nombre de *amarillejo*, aunque el negro de su plumaje es mas brillante, y tiene reflejos que en ciertos dias le dan un viso verduzco. Solamente se ve el amarillo, ó mas bien el rojo, en las grandes pennas de las alas, de las cuales

(*) Eu francés . *jaunoir*.

COLECCION CIVIL
BIBLIOTECA

COLECCION CIVIL
BIBLIOTECA



1 El verde-dorado o Mirlo de cola larga del Senegal 2 El Mirlo moñudo de la China

Sculptor J. Ponceau

las tres primeras tienen el extremo pardo, y las demás terminan en el negro-brillante de que he hablado. Este mismo color campea con reflejos en las dos pennas intermedias de la cola, y en lo que es posible ver de las dos pennas medias de las alas: todo lo que de ellas está oculto, todas las pennas laterales de la cola, y el pico son de un negro puro; mas no así los pies, que son pardos.

El amarillo es algo mayor que nuestro mirlo comun. Su longitud es de catorce pulgadas, su vuelo de diez y ocho, la cola de cuatro y media; el pico, que es grueso y recio, de diez y siete líneas, y el pie de diez y seis. Las alas recogidas solo llegan á la mitad de la cola.

II.

EL MIRLO MOÑUDO DE LA CHINA (1).

Gracula cristatella. LATHAM.

AUNQUE esta ave sea algo mayor que el mirlo, tiene el pico y los pies mas cortos, y la cola

(1) Los viajeros hablan de un mirlo negro de Ma-

ain mucho mas ; casi todo su plumaje es ne-
gruzco con una tinta oscura de azul sin reflejos.
En medio de sus alas se ve una mancha blanca
que pertenece á las grandes pennas de las mis-
mas alas, y algo de blanco en la estremidad de
las pennas laterales de la cola ; el pico y los
pies son amarillos, y el iris de un hermoso color
anaranjado. Tiene en la frente un pequeño co-
pete de plumas largas, que levanta cuando le
place; pero sin embargo de esta marca distintiva
y de la diferencia observada en sus proporccio-
nes, no pudiera considerársele como una varie-
dad de clima en la especie de nuestro mirlo de
pico amarillo, puesto que como él tiene grandí-
sima facilidad en aprender á silbar los aires y
á pronunciar las palabras. Difícilmente se le
trasporta vivo desde la China á Europa. Su lon-
gitud es de nueve pulgadas y media ; las alas
plegadas llegan hasta la mitad de la cola, que
solo tiene de largo tres pulgadas, y que consta
de doce pennas casi iguales.

dagascar, que tiene un moño colocado precisamen-
te como el del mirlo de este artículo.

III.

EL PODOBÉ DEL SENEGAL.

Turdus erythropterus. GMEL.

DEBEMOS á Adanson esta especie extranjera y
nueva, que tiene el pico pardo, las alas y los
pies de color rojo, las alas cortas, y la cola lar-
ga y cuneiforme marcada de blanco en la estre-
midad de sus pennas laterales y de sus cober-
teras inferiores. En todo lo demas el podobé es
negro como nuestros mirlos, y se les parece en
el grandor y forma del pico, que sin embargo
no es amarillo.

IV.

EL MIRLO DE LA CHINA.

Turdus perspicillatus. LATH.

ESTE mirlo es mayor que el nuestro, tiene los pies mucho mas recios, y la cola mas larga y de distinta forma, pues es cuneiforme. El accidente mas notable de su plumaje son un par de anteojos, que parecen colocados en el nacimiento del pico, y que por ambas partes se estienen por sobre los ojos; los lados de estos anteojos son de figura casi oval y de color negro, de modo que resalta sobre el plumaje gris de la cabeza y del cuello. Este mismo color gris mezclado con una tinta verduza reina sobre la parte superior del cuerpo, comprendiendo las alas y las penas intermedias de la cola, pues las laterales están mucho mas ennegrecidas. Una parte del pecho y del vientre es de color blanco-sucio un poco amarillo hasta las coberteras inferiores de la cola, que son rojas. Las alas en estado de reposo no se entienden mucho mas allá del origen de la cola.

V.

EL VERDE-DORADO, ó MIRLO DE COLA LARGA DEL SENEGAL.

Turdus caesus. L.

LA cola de este mirlo es efectivamente muy larga, supuesto que la longitud de toda el ave, que es de unas ocho pulgadas desde la punta del pico hasta la estremidad del cuerpo, no compone todavía los dos tercios del largo de su cola. La estension del vuelo no corresponde ni con mucho á esa dimension escesiva, antes bien es proporcionalmente menor, pues apenas escede á la del mirlo, que es ave mas pequeña. El verde-dorado tiene tambien el pico mas corto, bien que sus pies son mas largos (1). El color general de esta ave es el hermoso y resplandeciente

(1) Brisson establece como medidas justas las siguientes: longitud total, veinte y una pulgadas; longitud desde la punta del pico al estremo de las uñas, doce pulgadas; vuelo, diez y seis y media; cola, trece y quince líneas; pie, veinte y una.

verde que se ve brillar en el plumaje de los ándes, y no varía sino en la diferencia de las tintas y en la diversidad de reflejos que toma en distintos puntos. En la cabeza es una tinta negra, á través de la cual penetra el color de oro; en el obispillo y en las dos largas pennas intermedias de la cola son reflejos purpúreos; en el vientre y piernas es un verde cambiante en color cobrizo; en casi todo lo restante es un hermoso verde-dorado, como lo indica el nombre que he dado á esta ave mientras no se sabe el que tiene en su patria. En el Gabinete Real hay una ave enteramente parecida á esta (1), á escepcion de que ni por asomo tiene la cola tan larga. Es probable que sea un verde-dorado cogido en tiempo de la muda, durante el cual puede muy bien perder su larga cola, como le sucede á la viuda.

(1) Esta ave está rotulada *mirlo verde del Senegal*.

VI.

LA HERRADURA, ó MIRLO DE COLLAR DE AMERICA (*).

UNA marca negra en forma de herradura que baja por encima del pecho de esta ave, y una faja del mismo color que parte por ambos lados de debajo del ojo para retirarse hácia atrás, es todo el negro que se nota en su plumaje. La primera de estas manchas, por su forma determinada, me ha parecido ser la mas propia para caracterizar á la especie, esto es, para distinguirla de los otros mirlos con collar. La herradura está diseñada en campo amarillo, que es el color de la garganta, de toda la parte inferior del cuerpo, y que vuelve á aparecer entre el pico y los ojos; el pardo reina en la cabeza y detrás del cuello; y el gris-claro en los costados. Además de esto, el vértice de la cabeza está marcado con una raya blanquecina; toda

(*). Esta especie es la misma que el estornino de la Luisiana, anteriormente descrito. Véase la nota que pusimos en aquel lugar; (A. R.)

la parte superior del cuerpo es de gris de per-
diz; las pennas de las alas y de la cola, pardas
con algunas manchas rojizas (1); los pies, pardos
y muy largos; y el pico, que es casi negro, tiene
la forma del de los mirlos. Asimismo tiene de
comun con estos que canta muy bien por la
primavera, aunque su voz tiene poca estension.
Casi se mantiene únicamente de las semillas
que encuentra por encima de la tierra (2); en lo
que se parece á las alondras, aunque es mucho
mayor que ellas y aun que nuestro mirlo, y tam-
bien tiene prolongada como aquellos la uña
posterior. Se posa sobre la cima de los arbol-
llos; y se ha observado que en la cola tiene un
movimiento de abajo arriba muy precipitado.
Si se ha de hablar con ingenuidad, esta ave
no es alondra ni mirlo; pero el mirlo comun es
el ave de Europa con que tiene mas analogia.
Se halla en la Virginia, en la Carolina, y en casi
todo el continente de América (3).

(1) Lineo dice que las tres pennas laterales de la
cola son blancas en parte.

(2) Como, por ejemplo, la del *ornitogalo* con flor
amarilla.

(3) Lineo dice que se la encuentra tambien en
Africa.

COLEGIO SAN-
BARTOLOME
BIBLIOTECA



1. El Mirlo verde de Angola. 2. El verde amarillento
jaco ó Mirlo del Senegal con vientre amarillento.

Sculpit. A. Turdieu.

El individuo que observó Catesby pesaba tres onzas y cuarto; tenía once pulgadas y media desde la punta del pico al extremo de las uñas; la longitud del pico era de diez y siete líneas, la de los pies de veinte y una, y las alas recogidas se extendían hasta la mitad de la cola.

VII.

EL MIRLO VERDE DE ANGOLA.

Turdus nitens. GMEL.

La parte superior del cuerpo, la cabeza, el cuello, la cola y las alas de esta ave son de color aceitunado, aunque en las alas se notan manchas oscuras. En el dorso y en la faz anterior del cuello se ve alguna mezcla de verde con azul, de cuyo último color es el obispillo, y que campea también en la parte superior del pecho; el violado, en lo restante del mismo pecho; en el vientre, piernas y plumas que cubren el oído; y finalmente, las coberteras inferiores de la cola son de un amarillo aceitunado, y los pies y el pico de un negro decidido.

20.

COLECCION ENL.

BIBLIOTECA

DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

Esta ave es de igual tamaño que el de aquella que Brisson llamó con el mismo nombre, y aun se le parece en las proporciones del cuerpo, bien que es distinto el plumaje de esta última, cuyo color es un hermoso verde de ánade, con una mancha de azul de acero pavonado en la parte anterior del ala.

El tamaño de estas aves es á poca diferencia el de nuestro mirlo; su longitud, de unas diez pulgadas y media; su vuelo, de catorce y cuarto; y el pico, de trece á catorce líneas: las alas cuando recogidas llegan hasta la mitad de la cola, compuesta de doce pennas iguales.

Parece probable que estas dos aves pertenecen á la misma especie; pero ignoro cual de las dos representa el tronco primitivo, y cual debe ser mirada como rama colateral, ó si se quiere, como simple variedad.

VIII.

EL MIRLO VIOLADO DEL REINO DE JUIDA.

Turdus auratus. GMEL.

El plumaje de esta ave está pintado con los mismos colores que el de la precedente; á saber, violado, verde y azul, aunque distribuidos de distinto modo. El viola reina en la cabeza, cuello y toda la parte superior del cuerpo; el azul, en la cola y coberteras superiores; el verde, en las alas, que tienen tambien una faja azul cerca de su borde inferior.

Este mirlo es de igual talla que nuestro mirlo verde de Angola; parece tener el mismo continente; y como viene de los mismos climas que aquel, me sentiria dispuesto á referirlo á la misma especie si no tuviese las alas mas largas, lo que supone otros hábitos y modo de andar: pero como la mayor ó menor longitud de las alas en las aves disecadas depende en gran parte del modo con que se las ha preparado, no puede

sobre esto establecerse una diferencia específica, y es prudente quedarse con la duda, esperando observaciones mas decisivas.

IX.

EL PETO-NEGRO DE CEILAN.

Turdus zeylanus. GMEL.

Si doy nombre particular á esta ave, es porque los que la han visto no están conformes en orden á la especie á que pertenece. Brisson quiso que fuese un mirlo, y Edwards una urraca ó una picaza. En cuanto á mí, la convierto en un peto-negro, en tanto que mejor conocidos sus hábitos y costumbres, nos pongan en estado de referirla á sus verdaderos análogos de Europa. Es mas pequeña que el mirlo, y proporcionalmente tiene el pico mas recio; su longitud total es de unas ocho pulgadas y media; su vuelo, de trece; su cola, de cuatro; el pico de catorce á quince líneas, y el pie de diez y seis. Las alas plegadas traspasan la mitad de la cola, que es algo cuneiforme.

El peto negro por el cual está caracterizada

esta ave, hace mas efecto en cuanto está contiguo por arriba y por abajo á un color mas claro; pues la garganta y la parte inferior del cuerpo son de un amarillo bastante vivo. De los dos extremos del borde superior de ese peto parten dos especies de cordones del mismo color, que al principio elevándose por ambos lados hácia la cabeza sirven de marco á la hermosa placa amarillo-anaranjada de la garganta, y que encorvándose en seguida para pasar por debajo de los ojos van á terminar y en cierto modo á injerirse en la base del pico. Dos cejas amarillas, que proceden de la inmediacion de las narices, abrazan el ojo por encima, y encontrándose en oposicion con los cordones negros que lo abarcan por debajo, dan cierto carácter al aspecto de esta ave. Toda su parte superior es aceitunada; pero este color parece ofuscado por una mezcla de ceniciento en el vértice de la cabeza; y al contrario, es mas brillante en el obispillo y en la orilla exterior de las pennas del ala. Las mayores de estas pennas tienen el extremo pardo; las dos intermedias de la cola son de un verde aceitunado, como toda la parte superior del cuerpo, y las dos laterales negras con cabos amarillos.

La hembra no tiene ni la placa negra en el