



1080011899

QL676

B8

v.7-8



UAM
FONDO
RODRIGO DE LLANO

COLEGIO CIVIL
REPARATORIA N.º 1
BIBLIOTECA

FONDO
RODRIGO DE LLANO

AVES

XXI

EL ANOMIMO, O LIBRO DE MADAGASCAR

Turdus madagascariensis Gmel.

AVES.

Conservo á esta ave en nombre patrio, y se-
ta de desear que los viajeros nos trajesen los
verdaderos de las aves estrangeras, como suelo
hacer, de poder emplear con resultados felices
las observaciones hechas acerca de cada
especie, y de aplicarlas sin miedo de equivo-
carse á su verdadero objeto.

El taraburái es algo menor que la malva. Su
plumaje en general es muy oscuro en la cabeza,
cuello y parte inferior del cuerpo; pero las
barreras de la cola y de las alas son de un
de. La cola es verde dorada, con blancos
cuando tambien las alas, las plumas
son de color de violaceo.

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

REPARATORIA N.º 1

AVES.

XXI.

EL TANAOMBÉ, ó MIRLO DE MADA-
GASCAR.

Turdus madagascariensis. GMEL.

CONSERVO á esta ave su nombre patrio, y seria de desear que los viajeros nos trajesen los verdaderos de las aves extranjeras, como medio único de poder emplear con resultados felices todas las observaciones hechas acerca de cada especie, y de aplicarlas sin miedo de equivocarse á su verdadero objeto.

El tanaombé es algo menor que la malviz. Su plumaje en general es muy oscuro en la cabeza, cuello y parte inferior del cuerpo; pero las coberteras de la cola y de las alas son de tinta verde. La cola es verde-dorada con ribete blanco, como tambien las alas, las que además de esto son de color de viola cambiante en verde en las

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

estremidades de las grandes pennas, de color de acero pavonado en las pennas medianas y grandes coberteras, y tiene una mancha oblonga de un hermoso amarillo-dorado en esas mismas pennas medianas; el pecho es de un pardo rojo; lo restante de la parte inferior del cuerpo, blanco; el pico y los pies negros, y el tarso muy corto. La cola es algo ahorquillada; las alas cuando recogidas solo llegan á la mitad de su longitud: sin embargo, este mirlo tiene á proporcion el vuelo mas estendido que la malviz (1). Es notable que en un individuo que tuvo proporcion de observar, el pico era mas corvo hácia la punta de lo que aparece en su retrato; en cuya circunstancia el tanaombé parece aproximarse al mirlo solitario.

(1) Segun Brisson, la dimensiones cabales son: longitud total ocho pulgadas y media, vuelo catorce y un tercio, cola tres tercios, pico trece líneas, y pie diez.

El tanaombé es algo menor que el mirlo solitario, plumaje en general es muy oscuro en la cabeza, cuello y parte inferior del cuerpo; pero las coberteras de la cola y de las alas son de un verde claro. La cola es verde-naranja con ribete blanco como tambien las alas, las que ademas de esto son de color de violeta cambiante en verde en las

COLECCION DE
BIBLIOTECA
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

XXII.

EL MIRLO DE MINDANAO.

Turdus mindanaoensis. GMEL.

El color de acero pavonado que se ve en una parte de las alas del tanaombé está estendido en el mirlo, de este artículo por la cabeza, garganta, cuello, pecho y toda la parte superior del cuerpo hasta el extremo de la cola; vese en las alas una faja blanca cerca de la orilla esterna, y es tambien blanca la parte inferior del cuerpo.

La longitud total del ave no escede de ocho pulgadas, y las alas solo llegan á la mitad de la cola, que es cuneiforme. Esta especie nueva fue traída por Sonnerat.

Daubenton el joven observó otro individuo de la misma, que tenia las estremidades de las pennas largas de la cola y de las alas de un verde subido y cambiante, y muchas manchas de violado cambiante por el cuerpo, y principalmente detrás de la cabeza. Quizás era una hembra ó un macho joven.

XXIII.

EL MIRLO VERDE DE LA ISLA DE FRANCIA.

Turdus mauritanus. GMEL.

En el plumaje de esta ave se observa la mayor uniformidad, pues es en todas partes de un verde azulado y oscuro, bien que el pico y los pies son cenicientos. Es menor que la malviz; su longitud total no pasa de ocho pulgadas, el vuelo de doce, el pico de doce líneas, y las alas plegadas llegan al tercio de la cola, que solo tiene tres pulgadas. Las plumas que cubren la cabeza y el cuello son largas y estrechas. Es especie nueva.

XXIV.

EL CASCO-NEGRO, ó MIRLO DE CABEZA NEGRA DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA.

Turdus atricapillus. GMEL.

Aunque á primera vista el casco-negro se parece en el plumaje á la especie siguiente que es el morenillo, y sobre todo al mirlo de culo amarillo del Senegal que considero como variedad de esta misma especie, sin embargo, si se toma el trabajo de comparar detenidamente á estas aves, se verán en sus colores diferencias bastante notables, y mas todavía en las proporciones de los miembros. El casco-negro es mas pequeño que la malviz, su longitud total es de diez pulgadas y media, el vuelo de once, la cola de cuatro y tercio, el pico de quince líneas, y el pie de diez y seis; de donde se sigue que su vuelo es menos estendido, y al contrario que proporcionalmente tiene el pico, los pies y la cola mas largos que

COLEGIO ONA
BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO DE P

el morenillo. Su cola cuneiforme está asimismo formada de otra manera, y compuesta de doce plumas; y cada ala tiene diez y nueve, de las cuales la quinta y sexta son las mas largas.

En cuanto al plumaje, se le asemeja en el color pardo de la parte superior del cuerpo; pero difiere de él en el del casco, que es un negro brillante; en el rojo del obispillo y de las coberteras superiores de las alas; en el rojizo de la garganta y toda la parte inferior del cuerpo hasta las coberteras inferiores de la cola inclusive; en la rayita parda de los costados; en la manchita blanca que aparece sobre las alas y pertenece á las grandes pennas; en el color negruzco de las penas de la cola; y finalmente, en la marca blanca que termina las laterales, y que es tanto mayor cuanto es mas esterna la pluma.

VARIEDAD DEL XXXV. DEL

CABO

EL MORENILLO DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA.

Turdus capensis. GMEL.

El color que domina en el plumaje de esta ave es el pardo-subido: reina en la cabeza, cuello, parte superior del cuerpo, cola y alas; se aclara un poco en el pecho y costados; toma un viso amarillento en el vientre y piernas; y desaparece en las coberteras inferiores de la cola, para dejar que brille un hermoso amarillo. Esta mancha amarilla hace mucho mas efecto porque corta el color de las rectrices, que por encima y por debajo son de un pardo todavía mas subido. Los pies y el pico son absolutamente negros.

Este mirlo no es mayor que una alondra; tiene doce pulgadas de vuelo; y sus alas no escenden del tercio de la cola, que tiene unas tres pulgadas y media de largo, es cuneiforme, y consta de doce pennas.

COLEGIO DE

BIBLIOTECA

UNIVERSIDAD DE

VARIEDAD DEL MORENILLO DEL CABO.

El ave representada en las láminas iluminadas con el nombre de *mirlo del Senegal con cola amarilla* (1). Ofrece mucha relacion con el morenillo: solamente es algo mayor y tiene la cabeza y la garganta negras; en todo lo restante conserva los mismos colores y casi las mismas proporciones, lo que al principio me habia inducido á creer que era simple variedad de edad ó sexo; pero habiendo tenido despues proporcion de observar que entre un gran número de aves enviadas por Sonnerat se habian encontrado muchas rotuladas *mirlo del Cabo* que eran perfectamente semejantes al individuo descrito por Brisson, y que no habia un solo individuo con cabeza y garganta negras, pareceme ahora mas verosímil que el ave de la lámina representa una variedad de clima. El pico de esta ave es mas ancho en su nacimiento, y mas corvo que el del mirlo comun.

(1) La parte superior del cuerpo es menos amarilla y mas parda en el individuo que yo he observado de lo que aparece en la lámina.

XXVI.

EL MIRLO PARDO DE JAMAICA (1).

Turdus aurantius. GMEL.

El pardo-oscuro reina efectivamente sobre la cabeza, parte superior del cuerpo, alas y cola de esta ave; un pardo mas claro, en la parte anterior del pecho y del cuello; el blanco-sucio, en el vientre y en lo restante de la inferior del cuerpo. Lo que hay de notable en este mirlo es la garganta blanca, y el pico y los pies anaranjados. Tiene las aberturas de las narices muy grandes. Su longitud total es de unas siete pulgadas y cuatro líneas, el vuelo de diez y media, la cola de tres, el pie de dos pulgadas y media, y el pico de trece líneas. Por sus dimensiones se puede juzgar que es mas pequeño que nuestra malviz. Generalmente suele permanecer en los bosques de monte, y es tenido por excelente bocado. Todo lo que Sonnerat dice del interior de esta ave se reduce á que su gordura es de un hermoso color de naranja.

(1) En inglés, *thrush*.

COLEGIO CUBA
BIBLIOTECA
MANHATTAN N.Y.

XXVII.

EL MIRLO CON CORBATIN DE CAYENA.

Turdus cinnamomeus. GMEL.

El corbatin de este mirlo es muy ancho y de un hermoso negro ribeteado de blanco; se estiende desde el nacimiento de la mandíbula inferior del pico, y tambien desde el espacio comprendido entre la superior y el ojo, hasta la parte media del pecho, en donde el ribete blanco que se ensancha en aquel punto, está transversalmente rayado de negro; cubre los lados de la cabeza hasta los ojos, y abraza los tres cuartos de la circunferencia del cuello. Las coberteras grandes y pequeñas de las alas son del mismo negro del corbatin, si bien las pequeñas tienen el extremo blanco, lo que produce pintas de este color, y las dos filas de coberteras grandes terminan con ribete leonado. Lo demas del plumaje es de color de canela, y los pies y el pico



1 El Mirlo con corbatin de Cayena.
2 El Mainate de las Indias Orientales.

Sculpsit A. Turdieu.

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

MAY 11 1894

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

MAY 11 1894

Este mirlo es menor que nuestra malviz, y tiene corva la punta del pico, lo mismo que el solitario. Su longitud total se aproxima á ocho pulgadas; la cola, á tres; el pico tiene trece líneas; y las alas, que son cortas, apenas pasan del nacimiento de la cola.

XXVIII.

EL MIRLO MOÑUDO DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA (1).

Turdus cafer. GMEL.

El moño de esta ave no es permanente, sino que solo está formado de algunas plumas largas y estrechas, que en los momentos de perfecto reposo se estienden naturalmente sobre el vértice de la cabeza, y el ave las alza cuando le antoja. El color de dicho moño, de lo res-

(1) Esta ave tiene mas de nueve pulgadas desde la punta del pico hasta el extremo de la cola, siete y media hasta la punta de las uñas, su cola cuatro, el pico catorce líneas, otras tantas el pie, y diez el dedo medio.

tante de la cabeza y de la garganta es un hermoso negro con reflejos violados; y la faz anterior del cuello y el pecho presentan los mismos reflejos en campo pardo. Domina este color en todo lo inferior del cuerpo; se extiende por el cuello, por las coberteras de las alas, por una parte de las pennas de la cola, y aun por debajo del cuerpo, en donde forma una especie de ceñidor que pasa por encima del vientre: pero en todos esos puntos este color está amezclado con otro blanquizco, que ribetea y diseña el contorno de cada pluma, á poca diferencia como sucede con el mirlo de peto blanco. El de este artículo tiene las coberteras inferiores de la cola rojas, las superiores blancas, el bajo vientre de este mismo color, y en fin el pico y los pies negros. Los ángulos de la abertura del pico están acompañados de largas barbas negras inclinadas hácia adelante. Este mirlo no es mayor que la alondra moñuda. Tiene de trece á catorce pulgadas de vuelo, las alas recogidas no llegan á la mitad de la cola, las pennas mas largas son la cuarta y quinta, y la mas corta la primera.

XXIX.

EL MIRLO DE AMBOINA.

Turdus amboinensis Gmel.

Coloco á esta ave entre los mirlos, en donde la puso Brisson sin estar bien seguro de que perteneciese á este género mas bien que á otro. Seba, que fue el primero que nos la dió á conocer, dice que se la coloca entre los ruiseñores por la excelencia de su canto. No solo canta sus amores en la primavera, sino que levanta entonces su hermosa y larga cola, y la lleva sobre su dorso de un modo muy chocante. Tiene toda la parte superior del cuerpo de un pardo rojizo, comprendidas la cola y las alas, las que están marcadas con una mancha amarilla, de cuyo color es todo lo inferior del cuerpo; pero el lado inferior de las pennas de la cola es dorado, esta es cuneiforme por lo comun, y consta de doce.

LEGIO CIV.
BIBLIOTECA
PREPARATORIA No. 1

XXX.

EL MIRLO DE LA ISLA DE BORBON.

Turdus borbonicus. GMEL.

El tamaño de esta avecilla es como el de la alondra moñuda, poco mas ó menos; tiene nueve pulgadas de longitud total, trece de vuelo, de doce á trece líneas de pico, y otro tanto de pie, y sus alas recogidas no llegan á la mitad de la cola; que tiene cuatro pulgadas, y que por consiguiente forma casi la mitad de la longitud total del ave.

El vértice de la cabeza está cubierto con una especie de casquete negro; todo lo restante de la parte superior del cuerpo, las pequeñas coberteras de las alas, todo el cuello y el pecho son de un ceniciento aceitunado; lo que resta de la inferior del cuerpo es de un aceitunado amarillento, á escepción del medio del vientre que es blanquizo. Las grandes coberteras de las alas son pardas con mezcla de rojo; las pennas de las alas, medio partidas entre estos dos mismos colo-

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA
PREPARATORIA No. 1

res, de modo que el pardo campea en lo interior y por debajo, y el rojo por la parte de afuera. Es menester escluir las tres pennas del medio que son enteramente pardas, así como las de la cola que están además cortadas en su estremidad por dos fajas de pardos distintos y muy poco aparentes en campo pardo. El pico y los pies son amarillentos.

XXXI.

EL MIRLO DOMINICO DE FILIPINAS.

Turdus dominicanus. GMEL.

La longitud de las alas es uno de los atributos mas notables de esta nueva especie; pues cuando recogidas, se estienden casi hasta la punta de la cola.

Su color, como tambien el de la parte superior del cuerpo, es un fondo pardo con manchas irregulares de acero pavonado, ó mas bien de violado-cambiante (1). Este fondo pardo toma un

(1) Estas manchas violadas, sembradas irregularmente sobre el cuerpo, hicieron sospechar á Danben-

COLEGIO CIVIL
PREPARATORIA No. 1
BIBLIOTECA

viso de violeta en el origen de la cola, y otro verdoso en la estremidad, se aclara hácia el cuello, y se vuelve blanquizco en la cabeza y en toda la parte inferior del cuerpo. El pico y los pies son de un pardo claro.

Esta ave solo tiene siete pulgadas de largo. Es una especie nueva debida á Sonnerat.

XXXII.

EL MIRLO VERDE DE LA CAROLINA (1).

Muscicapa viridis. LATH.

CATESBY, que observó á esta ave en su pais nativo, dice que no es mayor que una alondra, que tiene casi su misma figura, que es muy es-
quiva, que se oculta muy bien, que frecuenta las orillas de los rios caudalosos á dos ó tres-
ton el jóven, que ese individuo habia sido muerto al acabar la muda y antes que los verdaderos colores del plumaje hubiesen tomado consistencia.

(1) En inglés, *yellow-breasted chat*; en latin *cenan-*

tha americana, etc.

BIBLIOTECA
PREPARATO
COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA
PREPARATO
COLEGIO CIVIL

cientas millas del mar, que vuela con los pies estendidos hácia atrás como entre nuestras aves lo verifican las que tienen la cola muy corta, y que su canto es muy estrepitoso. Hay indicios de que se alimenta con la semilla del solano de flor purpúrea.

Toda la parte superior del cuerpo de este mirlo es de un verde oscuro; el ojo, casi circuido de blanco; la mandíbula inferior, finamente ribeteada de este color mismo; la cola, parda; la parte inferior del cuerpo, amarilla, á escepcion del bajo vientre que es blanquizco; el pico y los pies, negros. Las remeras no llegan al nacimiento de la cola. La longitud total del ave es de unas siete pulgadas y cuarto, la cola de tres y media, el pie de catorce líneas, y el pico de once.

XXXIII.

EL TERAT-BULAN, ó MIRLO DE LAS INDIAS.

Turdus orientalis. GMELL.

Lo que caracteriza á esta especie es el pico, el pie y los dedos mas cortos proporcionalmente en los demas mirlos, y la cola cuneiforme, aunque de distinto modo de lo que suele serlo: las seis pennas del medio son igualmente largas, y solo son progresivamente mas cortas las tres laterales de cada lado. Este mirlo tiene la parte superior del cuerpo, del cuello, de la cabeza y de la cola, negra; el obispillo, ceniciento; y las tres pennas laterales de cada lado tienen el extremo blanco. Reina este mismo color sobre toda la parte superior del cuerpo y de la cola, en la faz anterior del cuello, y en la garganta; y se estiendé por una y otra parte hasta encima de los ojos: pero en cada lado hay un rasguillo negro que parte de la base del pico, parece que pasa por debajo del ojo, y vuelve á

amanecer mas allá. Las grandes pennas de las alas son negruzcas, y por el lado interno ribeteadas de blanco hasta la mitad de su longitud; las pennas medianas, como tambien las grandes coberteras, están ribeteadas de blanco en toda su longitud por el lado esterno.

Esta ave es algo mayor que la alondra: tiene doce pulgadas y cuarto de vuelo; sus alas recogidas se estienden hasta mas de la mitad de la cola; su longitud, contada desde la punta del pico hasta el extremo de la cola, es de siete pulgadas y media, y hasta el de las uñas de seis y cuarto; la cola tiene tres, nueve líneas y media el pico, diez el pie, y ocho el dedo medio.



XXXIV.

EL SAUI-JALA, ó MIRLO DORADO DE MADAGASCAR.

Turdus nigerrimus. GMEL.

ESTA especie, que pertenece al antiguo continente, no se aparta en un todo del uniforme de nuestros mirlos: tiene el pico, los pies y las uñas negruzcas; una especie de collar de hermoso terciopelo negro que pasa por debajo de la garganta, y no se estiende sino un poco mas allá de los ojos; las pennas de la cola y de las alas, y las plumas de lo restante del cuerpo, negras y ribeteadas de color de limon, como lo están de gris en el mirlo de peto blanco; de modo, que el contorno de cada pluma está vistosamente diseñado sobre las plumas inmediatas que ribetea.

Esta ave es á corta diferencia del tamaño de la alondra: tiene once pulgadas de vuelo; la cola es mas corta que en nuestros mirlos con respecto á la longitud total del ave que es de seis

pulgadas y media, y relativamente á la de las alas que se estienden casi hasta los dos tercios de la cola; el pico tiene doce líneas, diez y nueve la cola, trece el pie, y doce el dedo del medio.



XXXV.

EL MIRLO DE SURINAM.

Turdus surinamus. GMEL.

EN este mirlo de América vemos el mismo fondo de color que en el nuestro comun: casi es por todas partes de un negro brillante, aunque amenizado con otros colores; en el vértice de la cabeza, con una mancha de leonado-rojizo; en el pecho, con dos marcas del mismo color, pero de tinta mas clara; en el obispillo, con una mancha de la misma tinta; en las alas, con una línea blanca que las ribetea desde su nacimiento hasta la doblez de la muñeca ó de la tercera articulacion; y finalmente, debajo de las alas, con el blanco que reina en todas sus coberteras inferiores, de modo que en el acto de volar muestra tanto blanco como negro. Los pies son pardos; el pico, negruzco, como tambien las pennas

de las alas, todas las cuales, á escepcion de las dos primeras y de la última, son de un leonado amarillento en su origen, pero solamente en el lado inferior.

El mirlo de Surinam no es mayor que una alondra: su longitud total es de siete pulgadas y media, de once su vuelo, la cola de tres y media poco mas ó menos, de nueve líneas su pico, de ocho á nueve el pie, y las alas recogidas pasan un poco de la mitad de la cola.

XXXVI.

EL PALMERO.

Turdus palmarum. GMEI.

El hábito de esta ave de posarse y anidar en las palmeras, en donde sin duda encuentra un alimento de su gusto, ha dado motivo á que la llamasen *palmero*. Su tamaño es igual al de la alondra; su longitud es de siete pulgadas y media, su vuelo de doce, la cola de tres, y el pico de doce líneas.

Lo mas notable que desde luego ofrece su plu-

maje es una especie de largo copete negro que por ambas partes descende hasta debajo de los oídos, y que en cada lado tiene tres marcas blancas, una cerca de la frente, otra sobre el ojo, y debajo de este la tercera; el cuello por detrás es ceniciento y no está cubierto con dicho copete, y por delante es blanco, así como la garganta; el pecho es ceniciento, y lo restante de la parte inferior del cuerpo gris-blanco; la parte superior, comprendidas las pequeñas coberteras de las alas y las doce pennas de la cola, de un hermoso verde-acituna; lo que se ve de las pennas de las alas es casi del mismo color, y pardo lo restante. Dichas pennas en estado de reposo se estienden algo mas allá de la mitad de la cola, y el pico y los pies son cenicientos.

El ave de que Brisson formó otra especie de palmero, no difiere absolutamente de esta sino en que el copete en vez de ser enteramente negro tiene una faja cenicienta en el vértice de la cabeza, y en tener menos blanco debajo del cuerpo; pero como á escepcion de esto tiene exactamente los mismos colores, como en todo lo restante se le parece en tales terminos que la descripción del uno puede convenir al otro sin variar una palabra, y vive en el mismo pais, me veo precisado á mirar á estos dos individuos co-

mo pertenecientes á la misma especie, y á considerar al primero como el macho, y al segundo como la hembra.

XXXVII.

EL MIRLO VIOLADO Y CON VIENTRE BLANCO DE JUIDA.

Turdus leucogaster. GMEL.

El nombre de este mirlo es una descripción casi completa de su plumaje, con solo añadir que tiene las pennas grandes de las alas y el pico negruzcos, y los pies cenicientos. En cuanto á las dimensiones, es algo menor que la alondra, su longitud total es de unas siete pulgadas y media, su vuelo de doce, la cola de diez y nueve líneas, el pico de nueve, el pie de diez, y las alas plegadas cogen los tres cuartos de la cola.

XXXVIII.

EL MIRLO ROJO DE CAYENA.

Turdus rufifrons. GMEL.

TIENE la parte anterior y los lados de la cabeza, la garganta, toda la faz anterior del cuello y el vientre, rojos; el vértice de la cabeza y toda la parte superior del cuerpo, comprendiendo las coberteras superiores de la cola y las pennas de las alas, de color pardo; las coberteras superiores de las alas, negras ribeteadas de amarillo vivo que resalta sobre el color del fondo, y termina cada lado de esas coberteras una línea undulante; las coberteras inferiores de la cola son blancas; la cola, el pico y los pies, cenicientos.

Esta ave es mas pequeña que la alondra, pues solo tiene siete pulgadas y media de longitud total. No he medido su vuelo, pero no puede ser muy estenso porque las alas plegadas no pasan de las coberteras de la cola. El pico y el pie tienen cada uno de trece á catorce líneas.