

## PAJAROS ESTRANJEROS

QUE TIENEN ANALOGIA CON EL VERDERON.

## I.

## EL CATOTOL.

*Fringilla catotol.* GMEL.

Así se llama en Méjico un pajarillo de la talla de nuestro verderon, que tiene toda la parte superior variegada de negruzco y leonado; toda la inferior, blanquizca; y los pies, cenicientos: permanece en las llanuras; come la semilla del árbol que los Mejicanos llaman *hoauhtli*, y canta muy bien.

## II.

## EL ACATECHILI (1).

*Fringilla mexicana.* GMEL.

Lo poco que se sabe de este pájaro no permite que se le separe del verderon: es á poca diferencia del mismo tamaño, canta y come lo mismo que él, tiene la cabeza y la parte superior del cuerpo de un pardo-verdoso, y la garganta y toda la parte inferior del cuerpo de un blanco matizado de amarillo. Fernandez le llama *pájaro que se roza contra las cañas*, lo cual tendrá sin duda relacion con algunos de sus hábitos.

## LOS TANGARAS.

En los climas cálidos de America se encuentra un género muy numeroso de pájaros, algunos

(1) He formado este nombre del de *acatechichietli* que le dan los Mejicanos, y que dificilmente pronunciarían los Europeos.

de los cuales se llaman *tangaras* en el Brasil, cuyo nombre han adoptado los nomencladores (1) para todas las especies que componen este género. La mayor parte de los viajeros han tomado estos pájaros por especies de gorriones; y efectivamente solo difieren de los de Europa en los colores y en un pequeño carácter de conformacion, que consiste en tener la mandíbula superior del pico escotada en ambos lados hácia la estremidad; pero se parecen á los gorriones en todos los demas caracteres, y aun tienen casi todos sus hábitos naturales, supuesto que su vuelo es corto y poco elevado, y desapacible la voz de la mayor parte de sus especies. Debe tambien colocárseles entre los granívoros, pues solo se alimentan de frutos muy pequeños. Por otra parte, son casi tan familiares como los gorriones, pues los mas se acercan á las casas y son sociales entre sí. Habitan las tierras secas, los sitios descubiertos, y nunca los cenagosos. Ponen dos huevos y rara vez tres, como lo verifican los gorriones de Cayena; cuando los de Europa ponen cinco ó seis, diferencia casi general entre los pájaros de los climas cálidos y de los templados. El corto número del producto de cada puesta queda compensado por su mayor frecuencia; pues como sienten el amor en todas

(1) Marcgrave, Willughby, etc.

las estaciones porque la temperatura es casi siempre la misma, producen en cada puesta menor número de huevos que los pájaros de nuestros climas, que solo tienen una ó dos épocas de amor.

El género entero de los tangaras, de que conocemos ya mas de treinta especies sin contar las variedades, pertenece al parecer esclusivamente al nuevo Mundo; porque todas esas especies nos han venido de Guayana y de otros países de América, y ni una siquiera de Africa ni de las Indias. Esta multitud de especies nada tiene de sorprendente, pues hemos observado que en general el número de ellas y de los individuos es en las aves quizás diez veces mayor en los climas cálidos que en los otros, porque en ellos el calor es mas fuerte, mas comunes los bosques, las tierras menos pobladas, los alimentos mas abundantes; y las escarchas, las nieves y los hielos, desconocidos en aquellos climas, no acaban con ningun individuo; en vez de que basta un invierno rígido para reducir casi a la nada la mayor parte de las especies de nuestros pájaros. Debe tambien producir esta diferencia el que encontrando los pájaros de los climas cálidos su subsistencia en todas las estaciones, no son viajeros, y hay tambien muy pocos erráticos: nunca cambian de país á no ser que falten

los frutos de que se mantienen, en cuyo caso van á buscarlos á cortísima distancia; y de ahí es que no debe admirarnos la numerosa muchedumbre de pájaros que se encuentran en los ardientes climas de América.

Para evitar la confusion, dividiremos en tres órdenes las treinta especies de tangaras, valiendonos para ello de la diferencia mas sencilla, que es la de tamaño.

### EL GRAN TANGARA.

#### PRIMERA ESPECIE.

*Tanagra magna.* Linn.

EL gran tangara está representado en las láminas iluminadas con el nombre de *tangara de los bosques de Cayena*; denominacion que adoptamos entonces porque nos aseguraron que nunca salia de los bosques para ir á la campiña: pero Somini de Manoncourt nos ha informado de que este tangara no solo habitaba en los bosques de Guayana, sino que muchas veces se le veia en los sitios descubiertos trepando por los zarzales. El macho y la hembra, que se

parecen mucho, van comunmente juntos, se alimentan de pequeños frutos, y tambien comen algunas veces insectillos que encuentran en las plantas. No damos aqui su descripcion, porque la lámina iluminada representa á este pájaro en su tamaño natural, y con mucha exactitud en cuanto á la distribucion de los colores. Es una especie nueva, no indicada por naturalista alguno.

### EL MOÑITO.

#### SEGUNDA ESPECIE.

*Tanagra cristata.* L.

ESTE pájaro no es absolutamente tan grande como el anterior, aunque en este género es algo mas grueso. Le llamamos *moñito* porque difiere de todos los demas tangaras por un pequeño moño que tiene sobre la cabeza, ó que alza mas bien cuando está agitado. Primero se le representó en las láminas iluminadas con el nombre de *tangara moñudo de Guayana*, y tambien con el de *tangara moñudo de Cayena*, porque no se advirtió que fuese la misma especie de pájaro,

y el uno variedad del otro. Considerando pues estas dos láminas como que representan dos variedades de edad ó de sexo, y comparándolas entre sí, no quedará duda de que se trata de una misma especie.

Este pájaro es muy comun en las tierras de Guayana, en donde se alimenta de frutos pequeños: despide un grito agudo como el del pinzon, pero no tiene su canto. No permanece en los bosques ni en los mangles, y solo se le encuentra en sitios descubiertos ó desmontados.

### EL TANGAVIO (\*).

#### TERCERA ESPECIE.

*Tanagra bonariensis.* GMEL.

DEBEMOS el conocimiento de este pájaro al difunto Mr. Commerson, en cuya coleccion se encontró una piel bastante bien conservada. Le habia llamado *verderon negro*; pero ciertamente no es un *verderon*, pues en toda su conformacion se parece perfectamente á los tangaras.

(\*) Segun Desmarest, este pájaro es una especie del género tropical. (A. R.)

Además, este pájaro está muy distante de ser negro, pues en su cuerpo y vientre reina un violado subido con algunos visos verdosos en las alas y en la cola; por cuyo motivo le hemos llamado *tangavio* por contraccion de *tangara violado*.

Este pájaro, medido desde la estremidad del pico hasta la de la cola, tiene nueve pulgadas y tercio de longitud; su pico es negruzco y de nueve á diez líneas de largo; la cola, que no es cuneiforme, tiene tres pulgadas y media de longitud, y escede á las alas en veinte y una líneas; el tarso tiene mas de una pulgada de largo, es negro como los dedos, y las uñas son recias y gruesas. La hembra tiene la cabeza de un negro lustroso como de acero pavonado: todo lo restante de su plumaje es de un pardo uniforme. Sin embargo, encima del cuerpo y del obispillo se descubren algunas tintas de negro-lustroso. Encuéntrase el tangavio en Buenos-Aires, y probablemente en las otras tierras del Paraguay; pero nada sabemos de sus hábitos naturales.