

pulgadas y media; la molleja es musculosa, y está precedida de una mediana dilatacion del esófago, que contiene restos de sustancias vegetales, entre otras huesos de fruta mezclados con piedrecillas; vense leves vestigios de ciego; carece de vejiga de la hiel; el eje mayor de los testiculos tiene cuatro líneas, y el pequeño tres. La longitud total del pájaro es de siete pulgadas y media; el pico es de ocho líneas; el vuelo, de trece pulgadas; y de unas tres la cola, que es algo ahorquillada, consta de doce timoneras, y escede en veinte y una líneas á las alas.

PAJAROS ESTRANJEROS

QUE TIENEN RELACION CON EL VERDERON DE FRANCIA.

I.

EL GUIRNEGAT (1).

Emberiza brasiliensis. GMEL.

Si este verderon no fuese de la América meridional, y su grito no difiriera del del nuestro, lo hubiera presentado como una variedad suya. En cierto modo es mas verderon que el nuestro (2); pues comunmente (3) tiene mas amari-

(1) Es el *gorrión-paja* de Mauduit; y los nombres de *cia pagliarina* ó *pagliarioeia*, de *goldhammer*, *verderon amarillo* y *verderon dorado* le convienen perfectamente.

(2) Nuestro verderon se llama *luteola*, *aureola*, *goldhammer*, *verderon amarillo*, *verderon dorado*, *cia pagliarina*. El amarillo parece que constituye parte de su esencia, á lo menos de su esencia convencional.

(3) En la especie de nuestro

TOMO XXVII.

COLECCION DE
BIBLIOTECA
DEPARATORIA No. 1

III.

LA FLAVÉOLA, ó AMARILLENTA.

Emberiza flaveola. GMEL.

Tiene la frente y la garganta amarillas, y todo lo demas gris: es tamaño como el verdoron comun. Lineo, que dió á conocer esta especie, dice que se le encuentra en los países cálidos, aunque no fija á qué continente pertenece.

IV.

EL ACEITUNADO.

Emberiza olivacea. GMEL.

Este pajarillo, que se encuentra en Santo Domingo, no es mayor que el reyezuelo. Tiene toda la parte superior, y aun la cola y las remeras de las alás, de un verde aceitunado; la garganta,

de un amarillo anaranjado, de cuyo color tiene una pequeña placa entre el pico y el ojo; la faz anterior del cuello es negruzca; toda la parte inferior del cuerpo, de un gris mas claro con una tinta aceitunada; la anterior de las alas, ribeteada de amarillo-claro; y el pico y los pies, pardos. La corbata negra y el amarillo-anaranjado de la garganta y de la placa entre el pico y el ojo no se ven en la hembra. Longitud total, cuatro pulgadas y cuarto; pico, cinco líneas; vuelo, siete pulgadas; veinte y una líneas la cola, que está compuesta de doce rectrices, y escede á las alas en ocho ó nueve líneas.

V.

LA AMAZONA.

Emberiza amazona. GMEL.

Se encuentra este pájaro en Surinam. Se le compara por su tamaño á nuestro paro. Tiene la parte superior de la cabeza leonada; las coberteras inferiores de las alas blanquizas, y pardo todo lo restante.

COLEGIO CIVIL

BIBLIOTECA

PREPARATORIA N.º 1

VI.

LA EMBERIZA DE CINCO
COLORES (1).*Emberiza platensis.* GMEL.

Nada mas sabemos de este pájaro de Buenos-Aires, que lo que nos dice Commerson, el cual si bien habla de su plumaje y de su exterior, no dice una palabra de sus hábitos naturales. Sin mas fundamento que el testimonio de este naturalista lo referimos al verderon de Francia; pues así le llama él, sin decirnos que tenga los caracteres distintivos de la especie, entre otros el tubérculo huesoso de la mandíbula superior del pico.

Este pájaro tiene toda la parte superior del cuerpo de un verde pardo que tira á azul; la cabeza y la parte superior de la cola, de una tinta mas oscura; la de la inferior es mas amarillenta; el dorso está marcado con algunos rasgos ne-

(1) He dado á este pájaro poco conocido el nombre de *emberiza*, que le distingue de nuestro verderon de Francia, sin separarle de él absolutamente.

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

DE LA UNIVERSIDAD

gros; la orilla anterior de las alas es de un amarillo vivo; sus remeras y las rectrices mas esternas de la cola están ribeteadas de amarillo; la parte inferior del cuerpo es de un blanco ceniciento; la pupila, de un azul negruzco; el iris, castaño; el pico, ceniciento, convexo y puntiagudo, con los bordes de la mandíbula inferior entrantes; las narices, cubiertas de una membrana y muy inmediatas á la base del pico; la lengua, terminada en hebrillas; y los pies, de color aplomado. Longitud total, nueve pulgadas y tercio; pico, nueve líneas; vuelo, once pulgadas y dos tercios; y cuatro la cola, con la uña posterior mas grande que las otras.

VII.

EL CASTAÑO.

Emberiza borbonica. GMEL.

Todo el cuerpo de este pájaro es castaño y casi de la misma tinta tanto por encima como por debajo; las coberteras de las alas con sus penas y las de la cola son pardas ribeteadas de castaño mas ó menos claro. El pico es pardo, y los pies amarillentos, levemente teñidos de cas-

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

REPARATORIA

taño, de suerte que no sin razon se ha dado á este pájaro el nombre que lleva. Encuéntrasele en la isla de Borbón; su talla es casi como la del verderon de Francia, pero tiene la cola mas corta y mas largas las alas, á las cuales escede aquella en unas tres lineas.

VIII.

EL GONAMBUCHE.

Emberiza grisea. GMEL.

Seba dice que este pájaro es muy comun en Surinam, que es su tamaño igual al de la alondra, y que canta como el ruiseñor, y por consiguiente mucho mejor que ninguno de nuestros verderones de Francia; lo que es notable en un pájaro de América. Los habitantes del pais dicen que gusta mucho del maiz, y que comunmente se posa en la punta del tallo de esta planta. Su color dominante es el gris-claro; pero tiene una tinta roja en el pecho, cola, coberteras y remeras de las alas, siendo estas últimas blancas por debajo. Longitud total, cerca de seis pulgadas; pico, seis lineas; y veinte y una la cola, que escede en once á las alas.

IX.

LA EMBERIZA FAMILIAR.

Emberiza familiaris. L.

Adopto el nombre de Linceo, porque no conviene multiplicar inútilmente las denominaciones, y esta puede además tener analogía con la indole del pájaro. Su cabeza y pico son negros; la parte superior del cuerpo, cenicienta manchada de blanco, y cenicienta sin manchas la inferior; el obispillo y la region del dorso, que está cubierta por las alas amarillas, son blancos, lo mismo que las coberteras y la estremidad de las rectrices de la cola. Este pájaro se encuentra en Asia, y es casi del tamaño del verderon comun.

COLEGIO GIB

BIBLIOTECA.

PREPARATORIA N.

X.

EL CULI-RUBIO (1).

Emberiza cinerea. GMEL.

Debemos esta especie á Brisson, que la describió en vista de un individuo procedente del Canadá, el cual tenia la parte superior de la cabeza variegada de pardo-rojizo; la superior del cuello, el dorso y las coberteras de las alas, de los mismos colores con una mezcla de gris, que sin mancha alguna reinaba en el obispillo; las coberteras superiores é inferiores de la cola eran de un blanco-sucio rojizo; la garganta y toda la parte inferior del cuerpo, de un blanco-sucio con manchas de color castaño, menos frecuentes en el vientre; las pennas de la cola y de las alas, pardas ribeteadas de gris tirando á castaño; el pico y los pies, de un gris pardo. Longitud total, seis pulgadas y media; pico, seis líneas; vuelo, nueve pulgadas y media; y tres la cola, que constaba de doce timoneras, y escedia á las alas en unas veinte y tres líneas.

(1) En la descripción se verá porque le doy este nombre.

COLEGIO DE
BIBLIOTECA
PREPARATORIA

XI.

EL ROJO-AZUL (1).

Emberiza cærulea. GMEL.

A Brisson debemos tambien este pájaro, que es originario del Canadá. Tiene la parte superior de la cabeza de un rojo oscuro; la superior del cuello y del cuerpo, variegada del mismo rojo-oscuro y de azul; el rojo es menos subido en las pequeñas coberteras de las alas, como tambien en las grandes, que están ribeteadas y terminan en el mismo color; las pennas de las alas y de la cola son pardas con ribete gris-azul; y el pico y los pies, gris-pardos. Longitud total, cinco pulgadas; pico, seis líneas; vuelo ocho pulgadas y media; y una y dos líneas la cola, que consta de doce rectrices, y escede en cuatro líneas á las alas.

(1) He compuesto este nombre de los dos principales colores de su plumaje.

COLEGIO DE
BIBLIOTECA
PREPARATORIA



XII.

LA EMBERIZA DEL CABO (*).

Emberiza capensis. L.

Especie de verderon de Cayena, que suele cantar al amanecer, y que los colonos tienen proporcion de oír porque vive al rededor de las casas. Algunos le llaman *verderon de Cayena*, y se parece tanto al del cabo de Buena-Esperanza representado en las láminas iluminadas, que Sonnini cree que es el mismo pájaro con dos nombres distintos; de donde necesariamente se sigue que una de estas dos denominaciones es equivocada, y como segun Sonnini es este pájaro natural de la isla de Cayena, es sumamente probable que han sido llevados al cabo de Buena-Esperanza los que allí se encuentran. La otra consecuencia mas general que de esto puede deducirse es que todas esas denominaciones, en parte geográficas, en que se hace entrar el nombre del pais como señal distintiva, son equivocadas é inciertas, y están muy distantes de poderse comparar con las que se sacan de

(*) En Cayena *bonjour commandeur.*

los caracteres propios del animal denominado, ya porque este puede encontrarse en muchos paises, ya tambien porque sucede no pocas veces que un animal no es aborigene del territorio de donde se le saca, sobre todo cuando se trata de paises como el cabo de Buena-Esperanza, en donde toman tierra naves que vienen de todas partes del mundo.

Los emberizas del Cabo tienen el agudo grito de nuestros gorriones, siempre van de dos en dos, y comunmente están en el suelo como el verderon de Francia. El macho tiene en la cabeza un casquete negro cortado por una faja gris; la faz, cenicienta; una lista negra que se extiende desde la base del pico hasta el casquete mencionado, debajo del cual se ve por detrás un medio collar rojo. La parte superior del cuerpo es de un pardo verdoso variegado en el dorso con manchas negras oblongas; las coberturas de las alas tienen ribete rojizo; y toda la parte inferior del cuerpo, cenicienta. Es algo mas pequeño que el zizi, pues no tiene seis pulgadas de longitud total, y sus alas son tan cortas, que llegan apenas á la mitad de la cola.

XIII.

EL CALFATE (1).

Emberiza calfat. GMEL.

COMMERSON, que describió este pájaro de la isla de Francia en la isla misma, dice que tiene la parte superior de la cabeza negra; toda la superior del cuerpo, comprendidas las alas y la cola, de un ceniciento azulado; esta última, ribeteada de negro; negra la garganta, y el pecho y el vientre de un color vinoso. Vese tambien en él una faja blanca, que va desde el ángulo de la abertura del pico hasta el occipucio; tiene el cerco de los ojos desnudo y de color de rosa, lo mismo que el iris, el pico y los pies; y las coberteras inferiores de la cola, blancas. El calfate es de tamaño medio entre el gorrion y el pardillo.

(1) En la isla de Francia este nombre se pronuncia tambien *galfat*.

COLEGIO D. N. S. DE LA VIRGEN
BIBLIOTECA
PREPARATORIA N. 2

LA LOXIA (1).

Loxia pyrrhula. L.

La naturaleza ha sido pródiga con este pájaro, pues le ha dado bello plumaje y hermosa voz. Aquel adquiere ya todas sus bellezas despues de la primera muda; mas la voz necesita los socorros del arte para llegar á la perfeccion. La loxia que no ha sido enseñada solo tiene tres gritos poco agradables: el primero, es decir, aquel con que se estrena, es una especie de silbato que al principio arroja una sola vez, despues dos, en seguida tres, cuatro, etc. El silbido es puro, y cuando el pájaro se enardece parece articular repetidas veces la silaba *tui, tui, tui*, y sus sonidos tienen entonces mas fuerza. Despues

(1) En aleman, *blut-finch, quegger, gut-finch, brommeiss, bollen-beisser, rot-vogel, hail, goll, gold-finch, quibusdam, pfaefflin, thum-pfaff, gym-pel, thum-bherz*; en inglés, *bull-finch*; en italiano, *suffuleno, franquello montano*.

Pyrrhula, rubicilla, loxia. En Francia son tantos los nombres que tiene, que no solo cada provincia le ha dado el suyo, sino que tambien lo tiene particular en Paris y en algunas otras poblaciones.

COLEGIO D. N. S. DE LA VIRGEN
BIBLIOTECA
PREPARATORIA N. 2

llo, y no dudo que estas dos razas se cruzarian con buen éxito, y que los hijos que de ellos naciesen serian individuos fecundos y perfeccionados.

El amarillo reina sin mezcla en la cabeza, cuello y parte inferior del cuerpo; orla casi todas las coberteras superiores y pennas de la cola y de las alas, que son pardas; está mezclado en el dorso con pardo y verde; el pico y los ojos son negros, y los pies pardos. Este pájaro se encuentra en el Brasil, y segun todas las apariencias es originario de allí. supuesto que le han dado nombre los naturales del país. Marcgrave elogia su canto y lo compara al del pinzon. La hembra es muy diferente del macho; pues segun el mismo autor, tiene el plumaje y el grito del gorrion.

tran algunos individuos cuya cabeza, cuello y parte inferior del cuerpo son enteramente negros, aunque á la verdad esto es muy raro.

II.

LA TERESA-AMARILLA (1).

Emberiza mexicana. GMEL.

Como no he visto más que el retrato y el esqueleto de este pájaro (2) mejicano, solo puedo decir que por su plumaje se acerca mucho á nuestro verderon de Francia. Tiene casi toda la cabeza, la garganta y los costados del cuello de un amarillo anaranjado; el pecho y la parte inferior del cuerpo, mosqueteados de pardo en campo blanco-sucio; la parte posterior de la cabeza y del cuello y toda la superior del cuerpo, de color pardo, que en ambos lados se prolonga por el cuello en forma de punta, y se estiende casi hasta el ojo; las remeras y rectrices y sus coberteras son pardas, contorneadas de otro pardo mas claro.

(1) Es una especie nueva que no ha sido descrita ni representada hasta ahora.

(2) Este pájaro está representado en las láminas con el nombre de *verderon de Méjico*. Yo le he dado el de *teresa-amarilla*, por reinar este color en la parte anterior de la cabeza y del cuello.

(3) En la especie de nuestro

BIBLIOTECA

REPUBLICANA DE