

los árboles, de donde baja á cada momento á los montones de tierra ó haces de yerba que sobrenadan, meneando su larga cola como las vanderas. Es del tamaño de la alondra moñuda; las remeras de la cola son negras; las dos esternas tienen diez pulgadas y media de longitud y se separan á manera de horquilla; las dos mas inmediatas solo tienen cuatro, y las otras van en disminucion hasta las dos medias, que solo tienen una. Asi este pájaro, que medido desde la punta del pico á la de la cola tiene mas de diez y seis pulgadas, solo cuenta siete desde el pico á las uñas. En el vértice de la cabeza nótese una mancha amarilla, de que sin embargo carecen muchos individuos, probablemente las hembras. Una como toca negruzca, corta y cuadrada, les cubre la parte posterior de la cabeza, desde donde el plumaje es blanco, remontando este color hasta debajo del pico, y descendiendo sobre toda la parte anterior é inferior del cuerpo; el dorso es de un gris verdoso, y parda el ala. Encuéntrase esta moscareta en las orillas del rio de la Plata y en los bosques de Montevideo, de donde la trajo Commerson.

La especie de llanura inundada, fue con todo adoptada por los españoles que conquistaron el nuevo Mundo, por presentar aquellas inmensas llanuras trabajadas por las aguas vistas de lejos, cuando es-

LA MOSCARETA MOÑUDA DE CABEZA DE COLOR DE ACERO ABRILLANTADO.

SEGUNDA ESPECIE.

*Muscicapa paradisi.* GMEL.

Esta moscareta se encuentra en el cabo de Buena-Esperanza, en el Senegal y en Madagascar. Brisson, en su *Ornitología*, la ha presentado tres veces con otros tantos nombres: la primera, en el tomo 2º, pág. 418, con el de *papamoscas moñudo del cabo de Buena-Esperanza*; la segunda, pág. 414, con el de *papamoscas blanco del cabo de Buena-Esperanza*; y la tercera, pág. 416, con el de *papamoscas moñudo del Brasil*. Estas tres especies forman una sola, en la que el pájaro rojo es macho, y hembra el blanco, que es algo mayor que aquel, como lo hemos advertido en la especie del barbichon. Esta diferencia, que solo se nota en la tan iluminadas por los rayos del sol, á manera de dilatadísima sábana, con los pliegues que aparentan las undulaciones del terreno.



clase de las aves de rapiña, aproxima á la de estas el género subalterno de los papamoscas, moscaretas y tiranos.

Esta moscaveta macho tiene ocho pulgadas y dos líneas de longitud, y la hembra nueve y dos tercios, dependiendo casi todo este exceso de la cola: sin embargo, tiene tambien el cuerpo algo mas abultado, y á poca diferencia del tamaño de nuestra alondra comun. Ambas tienen la cabeza y la parte superior del cuello envueltas en color negro con visos relucientes de verde ó azulado, cuyo resplandor es igual al del acero bruñido. Adorna su cabeza (en que brillan los ojos de un rojo encendido) un bello moño del mismo color, suelto y caido hácia atrás á manera de elegante pluma. Vense algunas sedas bastante largas en el ángulo del pico, que tiene doce líneas de longitud y es rojizo y algo arqueado hácia la punta. Todo lo restante de la hembra es blanco, á escepcion de las grandes pennas, cuyo color negro asoma en la punta de las alas recogidas. En las pennas pequeñas y en las coberteras grandes se ven dos órdenes de listas negras, y la costilla de las rectrices de la cola es de un negro igual en toda su longitud. En el macho, debajo de la toca negra, el pecho es gris-azulado; y el estómago, así como la parte inferior del cuerpo, son blancos, cubriendo su

parte superior una capa de rojo-bayo vivo, hasta el estremo de la cola, que está cortada en figura oval y es regularmente cuneiforme. Las dos pennas medias son las mayores; las otras se acortan de dos en dos ó de tres en tres líneas hasta la mas esterna, lo cual se verifica tambien en la hembra.

Esta hermosa moscaveta fue traída del cabo de Buena-Esperanza, y encuéntrase tambien en el Senegal y en Madagascar. Segun Adanson, habita en los mangles á orillas de las aguas en los sitios desiertos del Níger y del Gambia. Seba coloca esta moscaveta en el Brasil, contándola entre las aves del paraíso, y dándole el nombre brasileño de *acamacu*; mas ya sabemos que este compilador de historia natural ha dado frecuentemente á lo que él describe nombres prestados sin discernimiento, y por otra parte no creéremos que un pájaro visto y reconocido en las riberas del Níger por un excelente observador como Adanson, se encuentre al mismo tiempo en el Brasil: sin embargo, Brisson lo coloca allí por el solo testimonio de Seba, y á pesar de que él mismo observa el error en que incurre, y repara al fin sobre este supuesto papamoscas moñudo del Brasil, que probablemente Seba se equivoca llamándolo así, y que es un pájaro procedente de Africa y de Madagascar. Klein lo to-



ma por un tordo moñudo, y Mohering por un grajo: ejemplo de la confusion de que ha llenado la historia natural el prurito de metodizar; y si deseáramos uno mas patente, lo encontraríamos en este mismo pájaro. Al parecer no era bastante haberle convertido en tordo y en grajo, pues Lineo ha querido hacer de él un cuervo, y con motivo de tener la cola larga le llamó *cuervo del paraíso*, de modo que Brisson aplica este pasaje á su especie blanca.

### LA MOSCARETA DE VIRGINIA.

#### TERCERA ESPECIE.

*Muscicapa carolinensis.* GMEL.

CATESBY llama á esta moscareta *pájaro-gato* (*the cat-bird*) porque su voz se parece al mayido del gato. En verano se le ve en Virginia, en donde se alimenta de insectos; pósase en los arbustos y matorrales, y nunca en los árboles grandes. Segun este autor, es tan grande y aun algo mas que una alondra: de lo que resulta que por la talla se aproxima al pequeño tirano; pero su pico recto y casi sin gancho lo aleja de esta fa-

milia. Su plumaje es oscuro y el color está mezclado de negro y pardo mas ó menos claro y subido; la parte superior de la cabeza es negra; y la del cuerpo, alas y cola, de un pardo subido y aun negruzco en esta última. El cuello, el pecho y el vientre son de otro pardo mas claro; una tinta roja deslucida asoma en las coberturas inferiores de la cola, que consta de doce plumas iguales en longitud, siendo la suya de tres pulgadas y media, á cuya tercera parte llegan apenas las alas recogidas; el pico tiene doce líneas, y el pájaro entero nueve pulgadas y tercio. Esta moscareta cria en Virginia; sus huevos son azules, y abandona aquella comarca al acercarse el invierno.

### LA MOSCARETA PARDA DE MARTINICA.

#### CUARTA ESPECIE.

*Muscicapa petechia.* GMEL.

ESTA moscareta no tiene la cola larga como las anteriores. Por su tamaño y figura podria considerársela como el mayor de los papamos-



cas. Difiere de los tiranos en la forma del pico, que no es bastante corvo y que por otra parte es menos recio que el del tirano mas pequeño: sin embargo, tiene nueve líneas de longitud, y el pájaro entero siete pulgadas y media. Un pardo-subido bastante uniforme cubre toda la parte superior del cuerpo, con la cabeza, las alas y la cola; la inferior del cuerpo tiene ondas transversales de blanco, de gris y de tintas claras y débiles de un pardo rojo; algunas plumas mas decididamente rojizas sirven de coberteras inferiores de la cola, que es cuadrada y tiene las orillas de las rectrices esternas franjeadas de blanco.

LA MOSCARETA DE COLA AHOR-  
QUILLADA DE MÉJICO.

QUINTA ESPECIE.

*Muscicapa forficata.* GMEL.

Esta moscareta es mayor que la alondra: su longitud total es de once pulgadas y ocho líneas, de las cuales las seis pertenecen á la cola; los ojos son rojos; el pico, que tiene nueve lí-

neas de longitud, es recto, aplanado y bastante débil. Sus colores son los siguientes: un gris muy claro cubre la cabeza y el dorso, en el cual debiera haberse derramado en la figura iluminada una leve tinta rojiza; el rojo del lado inferior del ala penetra por el costado en el blanco que cubre toda la parte inferior del cuerpo; las pequeñas coberteras en campo ceniciento están ribeteadas de líneas blancas á modo de escamas, lo mismo que las grandes que son negruzcas; las grandes remeras son absolutamente negras y rodeadas de gris-rubiáceo; las plumas mas esternas de la cola son las mas largas, y forman horquilla como la cola de la alondra; las siguientes divergen menos y se acortan hasta la del centro, que solo tiene dos pulgadas y tercio; todas son de color negro-aterciopelado, y están ribeteadas de rubiáceo; las barbas esternas de las dos plumas mayores de cada costado parecen blancas en casi toda su longitud. Algunos individuos tienen la cola mas corta que el que está representado en la lámina, que fue enviado desde Méjico á Mr de Boynes, ministro á la sazón de Marina.



## LA MOSCARETA DE FILIPINAS.

SEXTA ESPECIE.

*Muscicapa philippensis.* GMEL.

Esta moscareta es del tamaño del ruiseñor; su plumaje es gris-pardo en toda la parte superior del cuerpo; las alas y la cola son blanquizas en toda la inferior desde debajo del pico; por debajo de los ojos pasa una línea blanca, y en los ángulos del pico se ven algunos pelos largos y divergentes. Tales son los pocos rasgos oscuros y monótonos con que se puede pintar á este pájaro, que está en el Gabinete; acerca del cual no tenemos por otra parte mas noticia que la de su país nativo.

## LA MOSCARETA DE VIRGINIA DE MOÑO VERDE.

SÉPTIMA ESPECIE.

*Muscicapa crinita.* GMEL.

SIGUIENDO á Brisson, se ha dado á este pájaro el nombre de *papamoscas* en las láminas iluminadas. Catesby lo indicó con el de *cazador de moscas*, y publicó su retrato en la lám. LII; pero lo largo de su cola y pico indica con bastante claridad que debe colocarse entre las moscaretas, y no entre los papamoscas. Por otra parte, es algo mayor que estos, pues tiene nueve pulgadas y tercio, longitud de que coge la cola la mitad; su pico aplanado, guarnecido de sedas y algo corvo en la punta, tiene catorce líneas y media de largo. Su cabeza está adornada de plumillas tendidas que forman medio moño; la parte superior del cuello y todo el dorso son de un verde oscuro; el pecho y la parte anterior del cuello, de un gris aplomado; el vientre, de un hermoso amarillo; el ala parda, lo mismo que la mayor parte de sus grandes pennas, que co-



mo las de la cola están ribeteadas de rojo-bayo. Este pájaro no tiene exactamente la forma de los tiranos, aunque participa al parecer de su índole triste y ruin. Parece, dice Catesby, según los gritos desagradables que da este cazador de moscas, que siempre está colérico, pues no gusta de reunirse con ningún otro pájaro. Cria en la Carolina y en Virginia, y en invierno se retira á países aun mas cálidos.

### EL ESCHET DE MADAGASCAR.

OCTAVA ESPECIE.

*Muscicapa mutata.* GMEL.

DASE en Madagascar el nombre de *eschet* á una hermosa moscaveta de cola larga; y llámase á otras dos *eschet-all* y *eschet-vululú*, que probablemente significan *eschet-rojo* y *eschet-variegado*, y que designan dos variedades de una misma especie. Tres cuenta Brisson; mas algunas diversidades de colores no pueden formar especies diferentes, cuando la forma, la talla y las demás proporciones son las mismas. Vese en los eschetes la prolongada figura de la lavandera,

aunque son algo mayores, pues tienen siete pulgadas y media de longitud hasta la estremidad de la verdadera cola, aun haciendo caso omiso de dos plumas que la alargarian estremadamente si se las incluyese en la medida, pues el eschet que hemos visto tenia once pulgadas desde la estremidad del pico á la de las referidas dos pennas. El pico de estos pájaros, que tiene ocho líneas, es triangular, muy aplanado, muy ancho en la base, algo corvo en la punta, y tiene los ángulos guarnecidos de sedas. Estos tres eschetes tienen el iris amarillo, la pupila azul, y cubre su cabeza un hermoso moño de verde-negro brillante como el acero bruñido, y arremangado hácia atrás.

El color negro del moño del primero le envuelve el cuello, cubre el dorso, las grandes pennas del ala y de la cola (cuyas dos plumas largas tienen ocho pulgadas y son blancas), las pequeñas del ala y toda la parte inferior del cuerpo. En el *eschet-all* el verde-negro de la cabeza solo se nota en las grandes remeras del ala, y las coberteras están marcadas con anchas listas blancas: todo el resto del plumaje es de un rojo-bayo vivo y dorado que Edwards define *hermoso y brillante color de canela*. Estiéndese con igualdad por la cola y por las dos largas plumas que son parecidas á las que prolongan



la cola del gálguio de Angola ó del de Abisínia, con la diferencia que en aquel esas dos plumas son las mas esternas, y en la moscarea de Madagascar las internas.

El tercer eschet, ó sea eschet-vululú, apenas difiere del anterior en otra cosa mas que en las dos largas plumas de la cola que son blancas, pues lo restante de su plumaje es rojo-bayo como el del eschet-all. Las dos pennas del de esta clase que hay en el Real Gabinete tienen siete pulgadas; las de otro individuo que tambien medimos tenian nueve, con las barbas esternas ribeteadas de negro en los tres cuartos de su longitud, y el último blanco; otro tercer individuo carecia de ellas, ó por efecto de algun accidente, ó por no haber llegado todavía á la edad en que la naturaleza las concede á su especie, ó finalmente porque hubiese sido cogido en tiempo de la muda, que en estos pájaros, segun Edwards, dura seis meses.

Por lo demás, se les encuentra en Ceilan y en el cabo de Buena-Esperanza, lo mismo que en Madagascar. Knox los describe bastante bien. Edwards habla del tercer eschet con el nombre de pájaro del paraíso pio, sin embargo de que por otra parte censura un error igual de Seba. Efectivamente, los caracteres por los cuales estos pájaros difieren de las aves del paraíso son

tan numerosos como los que los unen al género de las moscareas (1).

## LOS TIRANOS.

El nombre de tirano dado á estas aves parecerá sin duda muy extravagante. Segun Belon, los antiguos llamaron al reyezuelo moñudo *tyranus*; mas aquí este nombre no solo se ha dado á la cabeza moñuda ó coronada, sino tambien á la índole que tiene algo de sanguinaria: triste muestra de la miseria del hombre, que siempre ha unido la idea de la crueldad al emblema del poder. Con gusto hubiéramos cambiado este nombre funesto y absurdo, si no estuviese ya sancionado por los naturalistas, no siendo esta la vez primera en que á pesar nuestro hemos dejado el cuadro de la naturaleza desfigurado

(1) La urraca moñuda de cola larga (*the crested long tailed pie*, de los *Rebuscos*) no es mas que el segundo eschet, en el cual el negro se figura rojizo; pero la cola y la cabeza son exactamente las mismas, y el ave está en la mejor disposicion para ser conocida. Ray describió este (*Synops.* pág. 195), y otro (pág. 193, tab. II, núm. 13); pero el retrato es malo y la descripción incompleta.



con estos nombres escesivamente disparatados, pero adoptados con harta generalidad. Dejaremos pues el nombre de *tirano* á estas aves del nuevo continente, análogas á los papamoscas y moscasetas en el modo de alimentarse, de los cuales no obstante difieren por su mayor tamaño, fuerza y ruindad: tienen el pico mayor y mas robusto, y su índole mas salvaje y dura les hace audaces, pendencieros, aproximándoles á las picazas, á las cuales se parecen tambien por el tamaño y la forma del pico.

### LOS TITIRIS, ó PIPIRIS.

PRIMERA Y SEGUNDA ESPECIE.

*Lanius tyrannus*, var. A. LATH.

La primera especie de los tiranos es el titiri ó pipiri. Tiene la talla y la fuerza de la picaza gris; nueve pulgadas y tercio de longitud; quince de vuelo; el pico aplanado aunque macizo, de quince líneas de largo, erizado de pelos, y recto hasta la punta, en donde forma un gancho mas decidido de lo que espresa la figura; la lengua es aguda y cartilaginosa. Las plumas del

vértice de la cabeza, amarillas en su raiz, terminan en una mosqueteadura negruzca que cubre lo restante de ellas cuando están caidas; mas cuando el ave está colérica, las alza, y su cabeza se presenta entonces como coronada de ancho moño de hermosísimo amarillo. Un gris-pardo claro cubre el dorso y desaparece sobre los lados del cuello en el gris-blanco apizarrado de la parte anterior é inferior del cuerpo; las penas pardas del ala y de la cola están ribeteadas de un filete rosáceo; la hembra tiene tambien la mancha amarilla en la cabeza aunque menos estendida, y todos sus colores son mas débiles ó deslucidos que los del macho. Una que midió en Santo Domingo el caballero Deshayes tenia una pulgada mas que el macho, siendo las otras dimensiones proporcionalmente mayores; de donde pudiera deducirse que los individuos mas pequeños que generalmente se observan en esta especie, son los machos.

En Cayena se llama este tirano *titiri*, nombre tomado de su grito, que pronuncian con voz aguda y chillona. Comunmente se ve al macho y á la hembra juntos en los claros de los bosques; se encaraman en los árboles elevados, y son muy numerosos en Guayana; crian en los huecos de los árboles ó en la bifurcacion de alguna rama debajo de las mas hojosas. Cuando se trata de



quitarles sus hijos, los defienden con ahinco, y su natural audacia se convierte en furor intrépido. Lánzanse sobre el raptor y le persiguen, y si sus esfuerzos no han podido salvar á los polluelos, los buscan y los alimentan en la jaula en que están encerrados. Esta ave, aunque bastante pequeña, no teme al parecer á ningun animal. «En vez de huir como los otros pájaros, dice Deshayes, ó de ocultarse al aspecto de los azores estriados ó malsines, de los gavilanes y de los otros tiranos de los aires, los ataca con intrepidez, los provoca y los hostiga con tanto ardor y obstinacion que logra ahuyentarlos. Ningun animal se acerca impunemente al árbol en que está colocado su nido. A picotazos y con un encarnizamiento increíble persigue hasta cierta distancia á todos los que considera enemigos, en especial á los perros y aves de rapiña.» Ni el hombre le causa temor, como si este dueño de los animales fuese todavía poco conocido de ellos en las regiones en que hace poco tiempo que reina. Cuando el pico de esta ave se cierra con fuerza en los instantes de su cólera, despidе un castañeteo pronto y reiterado.

En Santo Domingo se le ha dado el nombre de *pipiri*, que espresa tan bien como el de titiri el pio ó grito que le es mas familiar. Distingúense dos variedades ó dos especies muy vecinas: la

primera es la del pipiri grande, del que acabamos de hablar, llamado en el pais *pipiri de cabeza negra* ó *pipiri de grande pico*; el otro, llamado *pipiri de cabeza amarilla* ó *pipiri de paso*, que es mas pequeño y menos fuerte: la parte superior del cuerpo de este es gris y guarnecida de blanco, en vez de que en el pipiri grande es pardo con guarnicion roja. La índole de los pipiris pequeños es menos salvaje que la del otro, que permanece solitario en los sitios retirados y siempre va á pares, siendo así que aquel se presenta muchas veces á bandadas y se acerca á poblado. Se les ve reunidos en vuelos bastante numerosos durante el mes de agosto, en cuya época frecuentan las comarcas que producen cierta especie de bayas, que son el alimento favorito de los escarabajos y de los insectos, y es el tiempo en que están mas gordos y en que comunmente se les da caza. Aunque se les haya llamado pipiris de paso, no hay apariencia, segun Deshayes, de que abandonen la isla de Santo Domingo, que es bastante vasta para que puedan viajar por ella. Es cierto que en algunas estaciones abandonan las comarcas que son mas de su gusto, siguiendo sin interrupcion la madurez de los frutos que llaman á los insectos. Todos sus demas hábitos naturales son los mismos que los del pipiri grande, siendo ambas es-



pecies de las mas numerosas que se ven en Santo Domingo.

Se alimentan de orugas, escarabajos, mariposas y avispas. Se les ve encaramados sobre la mas alta cima de los árboles, especialmente en las palmeras: estas son el punto desde donde se lanzan sobre su presa, que distinguen á gran distancia, y apenas la han cogido vuelven á ocupar su puesto. Desde las siete hasta las diez de la mañana, y de las cuatro á las seis de la tarde es cuando al parecer se dedican mas á la caza: entonces se les ve lanzarse con placer, saltar, revolotear en el aire para alcanzar la presa fugitiva; y su atalaya aislada, y la necesidad que tienen de descubrir gran trecho á su alrededor, son causa de que los cazadores los descubran fácilmente. El pipiri es el ave mas marduguera; de modo, que al despuntar el dia ya se oye su voz desde la cima de los mas altos árboles que son su morada. Sus amores no tienen estacion bien determinada. Deshayes dice que en Santo Domingo se les ve criar en los calores del verano, en otoño, y aun durante el fresco del invierno; sin embargo de que la primavera es la estacion en que mas generalmente hacen su cria, que es de dos ó tres huevos y á veces de cuatro, de color blanquizco manchado de pardo. Barrera dice que esta ave es un abejarruco, y la llama *petit ric*.

## EL TIRANO DE LA CAROLINA.

TERCERA ESPECIE.

*Muscicapa ludoviciana*. GMEL.

SEGUN el carácter é instinto que Catesby señala á esta ave de la Carolina, no titubeamos en reunirla á la misma especie del pipiri de Santo Domingo: el atrevimiento, el valor y los hábitos naturales son los mismos; pero la corona roja que este lleva le distingue de aquel, tanto como el modo de colocar el nido, que construye al descubierto sobre arbustos ó matorrales, y comunmente en los sasafras, cuando el pipiri lo oculta ó por mejor decir lo entierra en los huecos de los árboles. Por lo demás, el tirano de la Carolina es á poca diferencia del tamaño del gran pipiri, aunque su pico parece menos corvo. Catesby dice únicamente que es largo, que está aplinado, y que va en disminucion. La mancha roja que tiene encima de la cabeza es mas brillante y está cercada de plumas negras que la ocultan cuando se apiñan. Esta ave aparece en Carolina y en Virginia por el mes de abril; cria allí, y se retira al acercarse el invierno. Un ave remitida



al Gabinete Real con el nombre de *tirano de la Luisiana* parece ser exactamente la misma que el tirano de la Carolina de Catesby, y es menor que el de Cayena (quinta especie) y casi igual al gran pipiri de Santo Domingo. El ceniciento casi negro domina en toda la parte superior del cuerpo desde el vértice de la cabeza hasta la punta de la cola, que termina en una fajita blanca. Algunas leves ondas blanquizas se entrelazan en las pennas menores del ala, y á través de las mas negruzcas del vértice de la cabeza penetran y brillan algunas pinceladas de anaranjado-subido casi rojo; la garganta es de un blanco bastante claro, que se debilita y mezcla con el negro en el pecho para tomar otra vez su verdadera tinta en el estómago y hasta debajo de la cola.

EL BENTAVEO, ó EL CUIRIRI (\*).

CUARTA ESPECIE.

*Lanius pitangua*. L.

ESTE tirano llamado *bentaveo* en Buenos-Aires, de donde lo trajo Commerson, y *pitangua-guacu* por los Brasileños, fue descrito por Marcgrave, quien le da el tamaño del estornino (observáremos que es mas grueso y mas recio) y un pico grueso, ancho, piramidal, con los bordes cortantes, y de una pulgada de longitud. Dice que tiene la cabeza abultada y larga; el cuello, corto; lo alto de este, la cabeza, el dorso, las alas y la cola, de un pardo-negruzco levemente mezclado con una tinta verde-oscura; la garganta, blanca, así como el cerco del ojo; el pecho y el vientre amarillos, y las pequeñas remeras del ala guarnecidas de rubiáceo. Añade el mismo autor que entre estas aves las hay que tienen una mancha anaranjada en el vértice de la ca-

(\* Cuvier coloca esta ave, bajo la denominación de *tirano de collar del Brasil*, en su género *papamoscas*, division de los *tiranos*.



beza, y otras que la tienen amarilla. Los Brasileños llaman á estas *cuiriri*, las que en todo lo restante son absolutamente parecidas al pitangua-guacu. Seba aplicó, inoportunamente el nombre de *cuiriri* á una especie diferente.

De aquí resulta que el bentaveo de Buenos-Aires, el pitangua y el *cuiriri* del Brasil son una misma ave, cuyas costumbres y hábitos naturales se parecen á los del gran pipiri de Santo Domingo, ó titiri de Cayena; sin embargo de que los colores, el cuerpo recio, y el ancho y grueso pico del bentaveo son caracteres tan aparentes, que á la legua lo distinguen del pipiri.

### EL TIRANO DE CAYENA.

#### QUINTA ESPECIE.

*Muscicapa ferox.* GMEL.

El tirano de Cayena es algo mayor que la pizaca de Europa llamada *desollador*. El individuo que hemos visto en el Gabinete tiene toda la parte superior del cuerpo de un gris ceniciento, oscureciéndose por grados hasta que se pone negro en el ala, algunas de cuyas pennas tienen

una leve orla blanca. La cola es de la misma tinta negruzca, está algo abierta, y tiene tres pulgadas y media de largo; el ave entera mide ocho y dos líneas; el pico, catorce líneas: un gris mas claro cubre la garganta, y se tiñe de verdoso en el pecho; el vientre es de un amarillo pajizo ó azufre claro; entre las plumillas medio levantadas del vértice y de la parte anterior de la cabeza se ven algunas pinceladas de amarillo de limon y de aurora; el pico, aplanado y guarnecido de sedas, se encorva hácia la punta. La hembra es de un gris menos subido.

El tirano pequeño de Cayena representado en las láminas iluminadas algo mas pequeño que el anterior, es una variedad suya. El que describe Brisson en la página 400 no es mas que una variedad del de la página 298 de su obra.



## EL CAUDEC (\*).

SEXTA ESPECIE.

*Muscicapa audax.* GMEL.

ESTE es el *papamoscas manchado de Cayena* de las láminas iluminadas; pero el pico corvo, la fuerza, la talla y la índole le escluyen del número de los papamoscas y le convierten en tirano. En Cayena se le llama *caudec*. Tiene nueve pulgadas y tercio de longitud; el pico, escotado en los bordes, corvo en la punta y erizado de sedas, mide quince líneas; el gris-negro y el blanco mezclado con algunas líneas rojizas en las alas, componen y varían su plumaje; el blanco domina en la parte inferior del cuerpo, en donde se observan manchas negruzcas prolongadas; el negruzco á su vez domina en el dorso, en donde el blanco no forma mas que algunos adornos. Pasan oblicuamente por encima y debajo del ojo dos líneas blancas; y la mancha amarilla del

(\*) Cuvier coloca esta ave, bajo el nombre de *tirano de cola rubia*, en el género de los *papamoscas* y en la division de los *tiranos*.

vértice de la cabeza está medio cubierta con algunas plumillas negruzcas. Las rectrices de la cola, que son negras hácia el medio, tienen un ancho ribete rojo; y la uña posterior es mas recia que las otras. El caudec vive en las cercanías de los ancones, encaramándose por las ramas bajas de los árboles; sobre todo de los mangles; y cazando probablemente las moscas acuáticas. Es menos común que el titiri, pero corren parejas en audacia y maldad. La hembra no tiene mancha amarilla en la cabeza, y la de algunos machos es anaranjada: diferencia que probablemente dependerá de la edad.

## EL TIRANO DE LA LUISIANA.

SÉPTIMA ESPECIE.

*Lanius ludovicianus.* GMEL.

ESTA ave, que fue enviada al Gabinete Real con el nombre de *papamoscas*, debe ser colocada entre los tiranos: es del tamaño de la picaza roja llamada el desollador. Tiene el pico largo, aplanado, guarnecido de sedas y corvo; el plumaje, gris-pardo en la cabeza y dorso, apizar-



rado-claro en la garganta, amarillento en el vientre, y rojo-claro en las grandes pennas; vense algunos rasgos blanquizcos en las grandes coberteras; las alas no cubren mas que el tercio de la cola, la cual es de color ceniciento-pardo bañado del rojo que se nota en el ala. Nada sabemos de sus hábitos; pero lo que llevamos dicho los indica bastante, y además con la fuerza de los pipiris es probable que tenga sus costumbres.

## PAJAROS

QUE TIENEN ANALOGIA CON LOS GENEROS DE LOS  
PAPAMOSCAS, MOSCABETAS Y TIRANOS.

## EL KINKI-MANÚ DE MADAGASCAR.

*Muscicapa cana.* GMEL.

ESTA ave, que se aleja de los papamoscas por la talla, pues es casi tan grande como la picaza, se les parece sin embargo en muchos caracteres, y debe ser colocada en el número de aquellas especies que, aunque próximas á un género, no pueden ser comprendidas en él y quedan indecisas; lo cual basta para convencernos de que nuestras divisiones no forman una línea de separacion en la naturaleza, cuyo orden es distinto del de nuestras abstracciones. El kinki-manú es grueso y macizo atendida su longitud, que no pasa de nueve pulgadas y media. Tiene la cabeza negruzca, y este color descende á ma-