

le atribuye los nombres de *battequeue*, *battelessive*, que equivalen al de lavandera. Efectivamente, estas aguzanieves no se encuentran con menos frecuencia que la lavandera sobre las aguas y los riachuelos pedregosos, y hasta se están allí con más constancia, pues se les ha visto pasar también el invierno: sin embargo, desiertan muchas más en esta estación de las que permanecen en el país, porque son más numerosas en el otoño cuando están entre el ganado, que en el invierno en las fuentes y en las orillas de los arroyos. Lineo y Frisch no hacen mención de esta aguzanieve amarilla, bien sea que la confundan con la que hemos llamado de *primavera*, ó bien porque realmente no se encuentre más que una de estas dos especies en el norte de Europa.

La *aguzanieve de Java* de Brisson se parece tanto á nuestra aguzanieve amarilla, y las diferencias son tan débiles, ó por mejor decir, en tal manera nulas comparando las dos descripciones; que no hemos dudado un punto en referir esta especie de Asia á nuestra especie europea, ó más bien, en no hacer de las dos más que un solo y mismo pájaro.

PAJAROS ESTRANJEROS

QUE TIENEN RELACION CON LAS AGUZANIEVES.

I.

LA AGUZANIEVE DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA.

Motacilla capensis. GMEL.

Las aguzanieves extranjeras tienen tanta relación con las de Europa, que con facilidad pudiera creerse que sus especies eran originariamente las mismas, modificadas solo por la influencia de los climas. La del cabo de Buena-Esperanza, representada en las estampas iluminadas, la trajo Sonnerat, y es la misma que describe Brisson. Un gran manto pardo, terminado de negro sobre la cola, y cuyos dos bordes están unidos debajo del cuello con una banda parda, cubre toda

la parte superior del cuerpo de esta aguzanieve, que es casi tan grande como la lavandera; toda la parte inferior de su cuerpo es blanco-sucia; una pequeña línea de este mismo color corta la cofia parda de la cabeza, y pasa desde el pico hasta encima del ojo; de las pennas de la cola, las ocho intermedias son enteramente negras, y las dos exteriores de cada lado están muy escotadas de blanco; cuando las alas están recogidas parecen pardas, pero abiertas son blancas en la mitad de su longitud.

II.

LA PEQUEÑA AGUZANIEVE

DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA.

Motacilla afra. GMEL.

Dos caracteres nos obligan á separar de la precedente esta aguzanieve que nos ha traído igualmente Mr. Sonnerat del cabo de Buena-Esperanza: primero, el del tamaño, pues esta tiene menos de cinco pulgadas y diez líneas, de las que la cola tiene ya cerca de tres pulgadas; y segundo, el del color: el del vientre es enteramente amarillo, escepto las coberteras inferior-

res de la cola, que son blancas; por encima del ojo le pasa una pequeña lista negra, la cual se estiende todavía mas allá; todo el manto es de color pardo-amarillento; el pico, que es ancho en su base, se va estrechando hácia el centro y se abulta luego en el extremo; este pico es negro, así como la cola, las alas y los pies; los dedos son muy largos, y observa Sonnerat que la uña posterior es mas larga que las otras, y dice al mismo tiempo que esta especie tiene mucha relacion con la siguiente, que nos ha dado tambien á conocer, y que tal vez no es mas que la misma, modificada por la distancia de clima desde el Cabo á las Molucas.

III.

LA AGUZANIEVE DE LA ISLA DE TIMOR (*).

Esta aguzanieve tiene, como la precedente, la parte inferior del cuerpo amarilla, y una raya sobre el ojo de este mismo color; la parte superior de la cabeza y del cuerpo es gris-ceniciento.

(* Gmelin no la considera mas que como una variedad de la aguzanieve de primavera.

ta; las grandes coberteras, que están terminadas de blanco, forman una lista de este color sobre el ala, que es negra, así como la cola y el pico; los pies son de un rojo pálido; la uña posterior es mas que el doble larga que las otras; el pico es como el de la precedente, esto es, ancho al principio, mas delgado en el centro, y abultado luego en la punta; la cola tiene dos pulgadas y diez líneas y media de largo, y es una pulgada y nueve líneas mas larga que las alas recogidas; este pájaro meneas sin cesar la cola, como nuestras aguzanieves.

IV.

LA ACUZANIEVE DE MADRÁS.

Motacilla maderespatensis. GMEL.

RAY es quien ha dado esta especie, y Brisson la ha descrito luego refiriéndose á aquel; pero ni uno ni otro señalan las dimensiones. Con respecto á los colores, no están compuestos mas que de negro y de blanco; la cabeza, la garganta, el cuello y todo el manto, incluso las alas, son negros; todas las plumas de la cola son blancas, excepto las dos del medio, que son

negras y algo mas cortas que las otras, lo que hace la cola ahorquillada; el vientre es blanco, y negros el pico, los pies y las uñas; todo lo que hay negro en el plumaje del macho es gris en el de la hembra.

LOS BECAFIGOS (*).

Los pájaros llamados becafigos, son de un género afine del de los papafigos ó ficédulas, á quienes se parecen en cuanto á los principales caracteres; tienen el pico recto, delgado y muy puntiagudo, con dos pequeñas escotaduras hacia el extremo de la mandíbula superior; carácter que les es comun con los *tangaros*, sino que el pico de aquellos es mas recio y corto que el de los becafigos; estos tienen descubierta la abertura de las narices, lo que los distingue de los paros, y arqueada la uña del dedo posterior, circunstancia que los separa asimismo de las alondras. Por lo tanto, no podemos dispensarnos de hacer de estos pájaros un género particular.

Conocemos cinco especies de becafigos en los

(*). Estos pájaros forman con los reyezuelos una division particular del género oropéndola de Cuvier.

climas mas cálidos del antiguo continente, y veinte y nueve especies en los de América. Estas difieren de las cinco primeras por la forma de la cola, que en los becafigos del antiguo continente es regularmente cuneiforme, en vez que la de los becafigos de América es escotada por la punta y como ahorquillada, por ser las dos pennas del medio mas cortas que las demas; y este carácter basta para conocer á que continente pertenecen estos pájaros. Comenzaremos á hacer la descripción de todos ellos por las especies que se encuentran en el antiguo.

EL BECAFIGO VERDE Y AMARILLO.

PRIMERA ESPECIE.

Motacilla tiphia. GMEL.

ESTE pájaro tiene cerca de cinco pulgadas y media de longitud, el pico mas de ocho líneas, la cola cerca de dos pulgadas, y los pies cerca de nueve líneas; su cabeza y toda la parte superior es de un verde aceitunado; la inferior del cuerpo amarillenta; las coberteras superiores de las alas son de un pardo subido, con dos

listas transversales blancas; las pennas de las alas son negruzcas, y las de la cola son del mismo verde que las del dorso: el pico, los pies y las uñas son negruzcos.

Este pájaro, que ha presentado Edwards, ha venido de Bengala; pero este autor le ha llamado *moscareta* aunque no es del género de los papamoscas ni de los moscaretas, los cuales tienen el pico enteramente distinto. Lineo se ha engañado tambien tomándolo por una *motacilla*, *motacilla*, *lavandera*, ó *aguzanieve*; porque los becafigos, á quienes ha colocado indistintamente con las aguzanieves, no son de su género: los becafigos tienen la cola mucho mas corta, y esto solo es mas que suficiente para distinguir á estos pájaros.

EL CHERIC.

SEGUNDA ESPECIE.

Motacilla madagascariensis. GMEL.

ESTE pájaro es conocido en la isla de Madagascar con el nombre de *tcherich*; y llevado luego á la isla de Francia, le han dado allí el

de *ojoblanco*, porque tiene una pequeña membrana blanca al rededor de los ojos. Es mas pequeño que el precedente, pues no tiene mas que unas cuatro pulgadas y dos líneas de longitud, y las otras dimensiones proporcionadas á esta; tiene la cabeza, la parte superior del cuello, el dorso y las coberteras superiores de las alas de un verde aceitunado; la garganta y las coberteras inferiores de la cola amarillas; la parte inferior del cuerpo blanquizca; las pennas de las alas de color pardo-claro, y ribeteadas de verde aceitunado en su lado exterior; las dos pennas del medio de la cola del mismo verde de oliva que la parte superior del cuerpo, y las otras pennas de la cola pardas y ribeteadas de verde-aceitunado; el pico es de color gris-pardo, y los pies y las uñas cenicientos. El Vizconde de Querhoent, que observó este pájaro en la isla de Francia, dice que aunque es poco medroso, no se acerca mucho á los sitios habitados; que vuela en bandadas, y se alimenta con insectos.

EL PEQUEÑO SIMON.

TERCERA ESPECIE.

Motacilla borbonica. GMEL.

ESTE pájaro, á quien llaman *pequeño simon* en la isla de Borbon, no es originario de esta isla, y necesariamente debe de haber sido llevado de otra parte; porque sabemos por las memorias de personas fidedignas, y especialmente por las de Mr. Commerson, que no existia ninguna especie de animales cuadrúpedos ni volátiles en la isla de Borbon ni en la de Francia cuando las descubrieron los Portugueses. Estas dos islas parece son las puntas de un continente sumergido, y casi toda su superficie está cubierta de materias volcanizadas, de manera que todos los animales existentes allí en el dia han sido llevados de otras partes.

Este pájaro, representado con el nombre de *becafigo de Madagascar*, es precisamente de igual tamaño que el precedente; tiene la parte superior del cuerpo de color apizarrado claro, la inferior gris-blanca, la garganta blanca, las gran-

des plumas de la cola de un pardo subido, y ribeteadas por una parte con un poco de color de pizarra; el pico es pardo, puntiagudo y delgado; los pies son grises, y los ojos negros. Las hembras, y aun los polluelos, tienen con corta diferencia el mismo plumaje que los machos. Este pájaro se encuentra en gran número por todas partes en la isla de Borbon, donde lo ha observado el Vizconde de Querhoent. Comienza á hacer sus nidos por el mes de setiembre, y se encuentran en ellos tres huevos por lo comun, y hay fundamento para creer que hace muchas puestas al año. Anida sobre los árboles aislados, y hasta en las huertas; el nido está compuesto de hojas secas y de crin en lo interior, y los huevos son azules. Este pájaro se deja acercar mucho, vuela siempre en bandadas, y vive de insectos y de pequeños frutos blandos. Cuando descubre en el campo á alguna perdiz que corre por el suelo, á alguna liebre, á algun gato, etc., revolotea al rededor y da un grito particular; lo que sirve de indicio al cazador para encontrar la caza.

EL BECAFIGO AZUL (*).

CUARTA ESPECIE.

Motacilla mauritiana. GMEL.

Esta especie, que probablemente es originaria de Madagascar, no ha sido indicada por ningún naturalista. Parece que el macho no difiere de la hembra mas que por la cola, que es algo mas larga, y por una tinta azulada que tiene sobre la parte inferior del cuerpo, que en la hembra es blanquizca sin mezcla de azul. Por lo demás, tienen la cabeza y toda la parte superior del cuerpo de un ceniciento azulado; las pennas de las alas y de la cola negruzcas y ribeteadas de blanco, y el pico y los pies azulados.

(*) El macho lleva en nuestra Coleccion de láminas el nombre de *becafigo de Madagascar*, y la hembra el de *becafigo de la isla de Francia*.

EL BECAFIGO DEL SENEGAL (*).

QUINTA ESPECIE.

Motacilla flavescens. GMEL.

Nosotros presumimos que los tres pájaros que están representados en nuestras láminas no forman mas que una sola y misma especie, de los cuales el becafigo manchado seria el macho, y los otros dos algunas variedades de sexo ó de edad. Todos tres son muy pequeños, y el de la figura primera lo es mas que los otros.

El becafigo manchado no tiene mucho mas de cuatro pulgadas y ocho líneas de longitud, de las cuales su cola tiene dos pulgadas y cuatro líneas; esta cola es cuneiforme, y las dos plumas del medio son las mas largas. Todas estas plumas de la cola son pardas, con franjas de blanco-rojizo, y lo mismo las pennas de las alas; las otras plumas de estas, así como las de la parte superior del dorso y de la cabeza, son

(*) En nuestra Coleccion lleva el nombre de *becafigo del Senegal*, el de *becafigo manchado del Senegal*, y el de *becafigo de vientro amarillo del Senegal*.

negras con orlas de un rojo claro; el obispillo es de un rojo mas subido, y blanca la parte anterior del cuerpo.

Los otros dos difieren de este, pero se parecen mucho entre sí. El segundo no tiene la cola cuneiforme, y es de un pardo claro, y mas corta á proporción del cuerpo; la parte superior de la cabeza y del cuerpo es parda; las alas son de un pardo negruzco, con franjas sobre las pennas y orladas sobre las coberteras con un pardo rojizo; la parte anterior del cuerpo es de un amarillo claro, y se encuentra tambien algo de blanco debajo de los ojos.

El tercero es mas pequeño que los otros dos; todo su plumaje es con corta diferencia el mismo que el del segundo, excepto la parte anterior del cuerpo, que no es de un amarillo-claro, sino de un rojo-aurora.

Por lo dicho se ve que en ciertas especies del género de los becafigos hay algunos individuos cuyos colores varían muy sensiblemente.

Esto mismo sucede tambien con respecto á los tres pájaros que presumimos no constituyen mas que una sola y misma especie, de la que el primero nos parece ser el macho, y los otros dos variedades de sexo ó de edad; el tercero en especial parece que es la hembra: todos tres tienen la cabeza y la parte superior

del cuerpo pardas, y la inferior gris, con una tinta mas ó menos ligera y mas ó menos estendida de un color rubio; el pico es pardo, y los pies son amarillos.

Ahora pasaremos á hacer la enumeracion de las especies de becafigos que se encuentran en América; los cuales son en general mayores que los del antiguo continente, y solo la primera especie de estos es de igual tamaño. Ya dejamos referido cuales son los caracteres con que se las puede distinguir; pero podemos añadir algunos pequeños hechos con respecto á sus hábitos naturales. Estos becafigos son pájaros errantes que pasan en el verano á la Carolina y hasta al Canadá, y vuelven en seguida á los climas mas calientes para hacer sus nidos y criar en ellos sus hijuelos. Habitan en los sitios descubiertos y en las tierras cultivadas; se posan sobre los arbustos, y se alimentan con insectos y frutos maduros y tiernos, tales como las bananas, las guayabas y los higos, que no son naturales á este clima, sino que los han llevado de Europa; entran en los jardines para andar picando en ellos, y de esto les ha venido su nombre: sin embargo, comen mas insectos que frutas, en razon á que por poco duros que estos sean, ya no los pueden romper.

EL BECAFIGO MANCHADO.

PRIMERA ESPECIE.

Motacilla aestiva. GMEL.

ESTE pájaro se ve en el Canadá durante el verano, pero ni anida allí, ni hace mas que una corta mansion; su residencia ordinaria son las tierras de la Guayana, y las de las otras comarcas de la América meridional. Tiene un canto muy agradable, y bastante parecido al del pardillo.

Su cabeza y toda la parte inferior del cuerpo es de un amarillo hermoso, con algunas manchas rojizas sobre la parte inferior del cuello, sobre el pecho y los costados: la parte superior del cuerpo y las coberteras superiores de las alas son de color verde-aceitunado; las pennas de las alas son pardas, y ribeteadas exteriormente del mismo verde; y las de la cola pardas tambien, pero ribeteadas de amarillo: el pico, los pies y las uñas son negruzcos.

El pájaro que está representado en la misma lámina, es una variedad de esta especie, ó tal

vez la hembra del mismo; pues solo difiere del otro en no tener las manchas rojizas del pecho, y en que la parte superior de la cabeza es, así como el cuerpo, de un verde aceitunado; pero estas pequeñas diferencias no nos parecen suficientes para hacer de él una especie particular.

EL BECAFIGO DE CABEZA ROJA.

SEGUNDA ESPECIE.

Motacilla petechia. GMEL.

ESTE pájaro tiene la parte superior de la cabeza de bello color rojo, toda la superior del cuerpo de un verde aceitunado, y la inferior de un hermoso amarillo, con algunas manchas rojas sobre el pecho y vientre; las alas y la cola son pardas; el pico negro, y los pies rojizos. La hembra solo difiere del macho en que sus colores son menos vivos. Es pájaro solitario y errante: llega á Pensilvania por el mes de marzo, pero no anida en ella; frecuenta las malezas, se posa rara vez en los grandes árboles, y se alimenta con los insectos que descubre sobre los arbolillos.

EL BECAFIGO DE GARGANTA BLANCA.

TERCERA ESPECIE.

Motacilla albicollis. GMEL.

ESTE pájaro se encuentra en Santo-Domingo. El macho tiene la cabeza, toda la parte superior del cuerpo, y las pequeñas coberteras superiores de las alas de un verde aceitunado; los lados de la cabeza y la garganta blancos; la parte inferior del cuello y el pecho amarillentos, con algunas manchas rojas; lo restante de la parte inferior del cuerpo amarillo; y las grandes coberteras superiores de las alas, así como sus pennas y las de la cola pardas y ribeteadas de amarillo-aceitunado; el pico, los pies y las uñas son de un gris pardo.

La hembra solo difiere del macho en tener entreverado de ceniciento el verde de la parte superior del cuello.

EL BECAFIGO DE GARGANTA AMARILLA.

CUARTA ESPECIE.

Motacilla ludoviciana. GMEL.

ENCUÉNTRASE este pájaro en la Luisiana y en Santo Domingo. El macho tiene la cabeza y toda la parte superior del cuerpo de hermoso color verde-aceitunado, el cual toma una ligera tinta amarilla sobre el dorso; los lados de la cabeza son de un ceniciento ligero; la garganta, la parte inferior del cuello y el pecho son de un hermoso amarillo, con pequeñas manchas rojizas sobre el pecho; lo restante de la parte inferior del cuerpo es de un blanco amarillento; las coberteras superiores de las alas son azuladas y terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas trasversales blancas: las pennas de las alas son de un pardo negruzco, y ribeteadas esteriormente de ceniciento-azulado, y de blanco sobre sus lados esteriore; y las tres primeras de cada lado tienen además una mancha blanca en el extremo de su lado in-

terior; la mandíbula superior del pico es parda, la inferior gris, y los pies y las uñas cenicientos.

La hembra solo difiere del macho en que no tiene las manchas rojas del pecho.

No podemos menos de observar que Mr. Brisson ha confundido este pájaro con el trépador de abetos dado por Edwards, el cual aunque es efectivamente un becafigo, no es el de que aquí se trata. Darémos su descripción en los artículos siguientes.

EL BECAFIGO VERDE Y BLANCO.

QUINTA ESPECIE.

Motacilla chloroleuca. GMEL.

ESTA especie se encuentra tambien en Santo Domingo. El macho tiene la cabeza y la parte inferior del cuello de color ceniciento-amarillento; las pequeñas coberteras superiores de las alas y toda la parte superior del cuerpo, de un verde aceitunado, y la garganta y toda la parte inferior del cuerpo de un blanco amarillento;

las grandes coberteras superiores de las alas y las pennas de las mismas son pardas y ribeteadas de verde amarillento; las pennas de la cola son de un verde aceitunado muy subido, y las laterales tienen en el lado interior una mancha amarilla que se va estendiendo á medida que las plumas son mas exteriores; el pico, los pies y las uñas son de un gris pardo.

La hembra, solo difiere del macho en que las tintas de los colores son mas débiles.

EL BECAFIGO DE GARGANTA NARANJADA.

SEXTA ESPECIE.

Motacilla auricollis. GMEL.

MR. BRISSON ha presentado este pájaro con el nombre de *becafigo del Canadá*; pero es probable que no sea mas que un pájaro de paso en aquel clima, como todos los demas becafigos. Este tiene la cabeza, la parte superior del cuello, el dorso y las pequeñas coberteras superiores de las alas de un verde aceitunado; el obispillo y las grandes coberteras superiores de las

alas de color ceniciento; la garganta, la parte inferior del cuello y el pecho anaranjados; el vientre de un amarillo pálido; el abdómen y las piernas de color blanquizco; las pennas de las alas pardas, y ribeteadas esteriormente de ceniciento; las dos pennas del medio de la cola son tambien cenicientas, y todas las demas blancas en su lado interior, y negruzcas en el lado esterior y en el estremo.

La hembra no difiere del macho sino en que los colores son menos vivos.

EL BECAFIGO DE CABEZA CENICIENTA.

SEPTIMA ESPECIE.

Motacilla maculosa. GMEL.

ESTE pájaro ha sido enviado de Pensilvania á Inglaterra, y Edwards lo ha presentado con el nombre de *moscaveta de obispillo amarillo*; pues da, aunque sin razon, el nombre de moscaveta á todos los becafigos que ha descrito y dibujado. Este tiene la parte superior y los lados de la cabeza cenicientos; la parte superior

del cuello y el dorso, verde-aceitunado con manchas negras; la garganta, el pecho y el obispillo, de un amarillo hermoso, con algunas manchas negras sobre el pecho; las coberteras superiores de las alas son de un ceniciento subido, y terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas transversales blancas; las pennas de las alas son de color ceniciento subido y ribeteadas de blanco; y las dos pen- nas del medio de la cola son negruzcas, con una mancha grande blanca en su lado interior; el pico, los pies y las uñas son pardos.

EL BECAFIGO PARDO.

OCTAVA ESPECIE.

Motacilla fuscescens. GMEL.

HANS SLOANE es el primero que ha indicado este pájaro, que dice se encuentra en la Jamáica en los terrenos cultivados, y á quien él llama pájaro comedor de gusanos. Tiene la cabeza, la garganta, toda la parte superior del cuerpo, las alas y la cola de un pardo claro, y la parte inferior del cuerpo variada de los mismos colores

que el plumaje de las alondras. Esta es toda la noticia que de este becafigo nos da dicho autor.

EL BECAFIGO DE MEJILLAS NE-
GRAS (*).

NONA ESPECIE.

El conocimiento de este pájaro lo debemos á Edwards, segun el cual se encuentra en Pensilvania, donde frecuenta los bosquecillos regados por riachuelos, en cuyas márgenes se le ve comunmente. Solo pasa el verano en aquel clima, del cual se aleja durante el invierno; lo que indica que este becafigo no es, como los otros de que hemos hablado, mas que un pájaro de paso en aquellas provincias de la América septentrional.

Tiene los lados de la cabeza de un hermoso negro, y la parte superior de la misma de un pardo rojizo; la parte superior del cuello, el dorso, el obispillo y las alas son de un verde-aceitunado subido; la garganta y el pecho de

(* La mayor parte de los ornitólogos han referido este pájaro á la curruca de pecho amarillo, ya descrita en esta obra.

un amarillo hermoso; el resto de la parte inferior del cuerpo de un amarillo pálido, y el pico y los pies pardos.

EL BECAFIGO MANCHADO DE AMARILLO.

DECIMA ESPECIE.

Motacilla tigrina. GMEL.

TAMBIEN debemos á Edwards el conocimiento de este pájaro. El macho y la hembra que él describe fueron cogidos juntos en el mar en una embarcacion que se hallaba á ocho ó diez leguas de las costas de Santo Domingo; era por el mes de noviembre, y en este mismo buque llegaron á Inglaterra. El autor observa, y con razon, que son pájaros de paso, y que entonces hacian su travesía desde la América septentrional á la isla de Santo Domingo.

Este becafigo tiene la cabeza y toda la parte superior del cuerpo de un verde aceitunado; una lista amarilla por encima de los ojos; la garganta, la parte inferior del cuello, el pecho y las coberteras inferiores de las alas, de un

amarillo hermoso, con algunas pequeñas manchas negras; el vientre y las piernas de un amarillo pálido sin manchas, y las alas y cola de un verde-aceitunado oscuro: se ve tambien una mancha larga blanca sobre las coberteras superiores de las alas, y las pennas laterales de la cola son blancas en la mitad de su longitud.

La hembra solo difiere del macho en tener blanquizco el pecho con dos manchas pardas, y menos brillante el verde-aceitunado de la parte superior del cuerpo. El pájaro que ha presentado Brisson como una especie, con el nombre de *becafigo pardo de Santo Domingo*, es esta hembra.

EL BECAFIGO PARDO Y AMARILLO (*).

UNDECIMA ESPECIE.

ENCUÉNTRASE este pájaro en Jamáica. Sloane y Browne han dado su descripcion, y Edwards ha presentado su figura iluminada con el nombre de *reyezuelo amarillo*; lo que es una equi-

(*) Gmelin considera esta ave como simple variedad del pollito ó cantor.

vocacion. Catesby y Klein han cometido otra, tomando este pájaro por un paro. Este hace su cria en la Carolina; pero no permanece allí en invierno. Tiene la cabeza, toda la parte superior del cuerpo, las alas y la cola de un pardo verdoso; dos pequeñas listas pardas á cada lado de la cabeza; toda la parte inferior del cuerpo de un hermoso amarillo, y las coberturas superiores de las alas terminadas de verde aceitunado claro, lo que forma sobre cada ala dos listas oblicuas; las pennas de las alas están ribeteadas esteriormente de amarillo, y el pico y los pies son negros.

EL BECAFIGO DE LOS ABETOS (*).

DUODECIMA ESPECIE.

Sylvia pinus. LATH.

ESTE es el pájaro que Edwards ha llamado *trepador de abetos*; pero no es del género de los trepadores, aunque tiene la costumbre de trepar por los abetos de la Carolina y Pensilvania.

(*) Este pájaro pertenece á la division de los pardillos.

El pico de los trepadores es, como se sabe, corvo en forma de hoz, siendo así que el de este pájaro es recto; y es tan parecido en todo lo demas á los becafigos, que no se le debe separar de este género. Catesby se ha equivocado tambien poniéndolo en el número de los paros, verosimilmente porque trepan asimismo por los árboles; pero los paros tienen el pico mas corto y menos agudo que los becafigos; y por otra parte, estos no tienen como aquellos las aberturas de la nariz cubiertas de plumas. Mr. Brisson se ha equivocado tambien tomando por un paro el trepador de abetos de Catesby, que es nuestro becafigo, y separando el trepador de Edwards del de Catesby.

Este pájaro tiene la cabeza, la garganta y toda la parte inferior del cuerpo de un amarillo muy hermoso, y una pequeña lista negra á cada lado de la cabeza; la parte superior del cuello y del cuerpo es de un verde amarillo ó color aceitunado brillante, y mas vivo todavía sobre el obispillo; las alas y la cola de color pardo-oscuro azulado, y las coberturas superiores terminadas de blanco, lo que forma á cada lado de las alas dos listas transversales blancas; en fin, el pico es negro, y los pies de un pardo amarillento.

La hembra es enteramente parda.