

rior de la cabeza es gris negruzco; el dorso y las alas de un pardo negro empañado; la parte inferior de las penas de las alas inmediatas al cuerpo tiene algunas manchas blancas; la cola es negra, rayada, y con punta blanca; el pecho es de un amarillo de piñuela empañado, el vientre de un amarillo claro, y el vientre y el pecho rayados de negro; el iris es de color anaranjado pálido, el pico negro y los pies rojizos.

Este cuclillo se encuentra en la isla de Panay, una de las Filipinas; es casi del tamaño del nuestro, y su cola se compone de diez pennas iguales.

.....

XIV.

EL DOMINICO MOÑUDO DE COROMANDEL (1).

*Cuculus melanoleucos*. L.

FACILMENTE se comprenderá que este cuclillo se llama así porque es negro en la parte superior y blanco en la inferior. Su moño, compuesto de muchas plumas largas y estrechas, está caído

(1) Esta especie y su variedad, que ambas son nuevas, fueron remitidas por Sonnerat.

sobre el vértice de su cabeza, y sobresale un poco por atrás; pero á decir verdad, estas especies de moños, mientras que están caídos, solo lo son en la posibilidad; para que merezcan su nombre, es necesario que estén levantados, y es de presumir que el ave de que aquí se trata levanta el suyo cuando está afectada por alguna pasión.

Con respecto á los colores de su plumaje, podría decirse que se ha echado una especie de capa negra sobre una túnica blanca: el blanco de la parte inferior es puro y sin ninguna mezcla; pero el negro de la parte superior está interrumpido en el borde del ala por una mancha blanca inmediata á la parte superior de las coberteras superiores, y por algunas manchas del mismo color en que terminan las pennas de la cola; el pico y los pies son negros.

Esta ave se encuentra en la costa de Coromandel; tiene doce pulgadas y nueve líneas de longitud total; su cola está compuesta de diez pennas cuneiformes, y sobresale á las alas en la mitad de su longitud.

Hay en el Real Gabinete un cuclillo, procedente del cabo de Buena-Esperanza, bastante parecido á este, del que únicamente difiere en que tiene como una pulgada y dos líneas mas de longitud total, en que es enteramente negro tanto en la parte superior como en la inferior,



á escepcion de la mancha blanca del ala, la cual se encuentra exactamente en su lugar, y en que de las diez pennas intermedias de la cola las ocho no son casi nada cuneiformes, por ser únicamente el par esterno veinte y una líneas mas corto que los otros; probablemente será una variedad de clima.

## XV.

### EL PEQUEÑO CUCLILLO DE CABEZA GRIS Y VIENTRE AMARILLO.

*Cuculus flavus*. L.

Esta especie se encuentra en la isla de Panay, y debemos á Sonnerat el conocimiento de ella; esta ave tiene la parte superior de la cabeza y la garganta de un gris claro; la superior del cuello, del dorso y de las alas, de color de tierra de sombras, esto es, pardo claro; el vientre, las piernas, y las coberteras inferiores de la cola, de un amarillo pálido, con una tinta roja; la cola negra y rayada de blanco; los pies de un amarillo pálido lo mismo que el pico, aunque este es negruzco por la punta.

Esta ave es del tamaño de un mirlo, no tan delgada, pero mucho mas prolongada de cuerpo: su longitud total es de nueve pulgadas y algunas líneas; y su cola, que es cuneiforme, hace mas de la mitad de esta longitud.

## XVI.

### LOS CUQUILES.

ENCUENTRO en los ornitologistas tres aves de diferentes tamaños de las que han hecho tres especies distintas; pero me han parecido tan semejantes entre sí por el plumaje, que he creído deber referirlas á la misma especie como variedades de tamaño, tanto mas cuanto que las tres pertenecen á las comarcas orientales del Asia; y por la misma razon me ha parecido poder aplicarles á todas el nombre de *cuquil*, con que es conocida en Bengala la mas pequeña de las tres. Edwards es de parecer, en vista de la semejanza de los nombres, que el grito del cuquil de Bengala debe tener alguna relacion con el del cuclillo de Europa.

El primero y el mayor de estos tres cuquiles



se acerca mucho al tamaño de un palomo. Su plumaje es de un negro brillante con visos verdes y también violados, pero solo debajo de las pennas de la cola; la parte inferior y el lado interior de las remeras son negros; el pico y los pies son de color gris oscuro, y las uñas negruzcas.

El segundo procede de Mindanao, y no es mucho mayor que nuestro cuclillo; ocupa el medio en cuanto al tamaño, entre el precedente y el que sigue. Todo su plumaje es de color negruzco que tira á azul; tiene el pico negro en la base y amarillento en la punta; la primera de las remeras es casi el doble mas corta que la tercera, que es una de las mas largas. Por lo regular siempre lleva esta ave la cola abierta.

El tercero y el mas pequeño de los tres (*cuclulus niger*. L.) es con corta diferencia del tamaño del mirlo. Es enteramente negro como los dos precedentes, sin mezcla de ningun otro color fijo; pero segun los diferentes grados de incidencia de la luz, su plumaje presenta todos los visos y reflejos móviles y fugitivos del arco iris: así es como lo vió Edwards, que es aquí el autor original, y no sé porque no habla Brisson mas que del verde y del violado. Este cuclillo tiene, como el primero, el lado interno y la parte inferior de las remeras de color negro;

el pico de un anaranjado vivo, y es algo mas corto y abultado que el del cuclillo de Europa; el tarso es grueso y corto y de color pardo rojizo, así como los dedos.

Es necesario observar que á esta ave pertenece propiamente el nombre de *cuquil* que le dan en Bengala, y que las consecuencias que se han sacado de la similitud de los nombres con la semejanza de las voces son mas concluyentes con respecto á él que con respecto á los otros dos; los bordes de la mandíbula superior son escotados.

Véanse aquí las dimensiones comparadas de estas tres aves, que todas tienen la cola compuesta de diez pennas cuneiformes.

	PRIMER CUQUIL.		SEGUNDO.		TERCERO.	
	Pulg. lín.		Pulg. lín.		Pulg. lín.	
Longitud total..	18	8	16	4	10	6
Pico. . . . .	18 $\frac{3}{4}$		17 $\frac{1}{2}$		14 $\frac{3}{4}$	
Tarso. . . . .	19 $\frac{4}{5}$				8 $\frac{1}{6}$	
Vuelo. . . . .	26	10	18	8.	8. alas largas.	
Cola. . . . .	9	4	8	2	4	11 $\frac{1}{2}$
Escede á las alas.	4	8	4	1	3	2 $\frac{1}{2}$



## XVII.

EL CUCLILLO VERDE-DORADO  
Y BLANCO.*Cuculus auratus*. L.

Tono lo que nos dicen de esta ave, es que se encuentra en el cabo de Buena-Esperanza, y que lleva la cola abierta en forma de abanico: es una especie nueva.

Tiene toda la parte superior, desde la base del pico, hasta la punta de la cola, de un verde dorado con visos, y cuya uniformidad está amenizada en la cabeza con cinco listas blancas; una en medio del sincipucio, otras dos encima de los ojos en forma de cejas que se prolongan hácia atrás, y en fin otras dos mas estrechas y cortas debajo de los ojos: la mayor parte de las coberteras superiores y de las pennas medias de las alas, todas las pennas de la cola, y sus dos mayores coberteras superiores tienen el extremo blanco; los dos pares mas esternos de las timoneras, y la mas esterna de las alas, están salpicadas de pintas blancas en el lado es-

terior; la garganta es blanca, así como toda la parte inferior del cuerpo, á escepcion de algunas rayas verdes que tiene en los costados y en los vuelos que le caen desde la parte inferior de la pierna sobre el tarso; el pico es verde oscuro, y los pies grises.

Este cuclillo es con corta diferencia del tamaño de un tordo. Su longitud total es de unas ocho pulgadas y dos líneas; el pico tiene de ocho á nueve líneas; el tarso lo mismo, y está guarnecido de plumas blancas hasta cerca de la mitad de su longitud; la cola tiene mas de tres pulgadas y media, consta de diez pennas cuneiformes, las que en su estado natural son divergentes, y únicamente sobresale diez y siete líneas y media á las alas, que son muy largas á proporcion.

## XVIII.

## EL CUCLILLO DE LARGAS HEBRAS.

*Cuculus paradisæus*. L.

Tono en esta ave es verde, y de un verde oscuro la cabeza, el cuerpo, las alas y la cola: no obstante la naturaleza no la ha descuidado;



al contrario, parece que se ha complacido en adornarla con un lujo de plumas poco comun; además de un moño con que ha realzado su cabeza, le ha dado una cola de forma muy notable; pues el par de pennas esternas es cerca de siete pulgadas mas largo que los demas, y estas dos pennas, ó por mejor decir, estas dos hebras, solo tienen barbas hácia su estremo en una longitud de cerca de tres pulgadas y media. Estas dos hebras son las que han autorizado á Lineo para dar á esta ave el nombre de *cuclillo del paraiso*; por la misma razon se le hubiera podido aplicar, así como á los dos siguientes, el nombre genérico de *cuclillo viudo*. Tiene esta ave el iris de un hermoso azul, el pico negruzco, y los pies grises. Encuéntrasela en Siam, donde la observó viva Mr. Poivre: es con corta diferencia del tamaño del grajo.

Su longitud total es de diez y nueve pulgadas y diez líneas; el pico tiene cerca de diez y seis líneas y media; el tarso cerca de una pulgada; y la cola, que es mas bien ahorquillada que cuneiforme, tiene doce pulgadas y seis líneas y media, y es diez pulgadas y media mas larga que las alas recogidas.

## XIX.

## EL CUCLILLO MOÑUDO DE COLLAR.

*Cuculus coromandus*. L.

ESTE cuclillo está adornado tambien con un moño y es notable por lo largo de las dos pennas de su cola; pero en este son las pennas intermedias las que sobresalen á las laterales, como sucede en la cola de algunas especies de viudas.

Tiene esta ave la parte superior negruzca desde la cabeza inclusive hasta la punta de la cola, á escepcion de un collar blanco que abraza el cuello, y dos manchas redondas de un gris claro que tiene detrás de los ojos, una de cada lado, representando dos pendientes: deben esceptuarse tambien las alas, cuyas pennas y coberteras medias están variegadas de rojo y de negruzco, así como las escapulares, y cuyas grandes pennas y coberteras son enteramente rojas; la garganta y las piernas son negruzcas; todo lo restante de la parte inferior del cuerpo es blanco; el iris amarillo, el pico ceniciento-



subido, y los pies cienicientos tambien, pero mas claros. Este cuclillo se encuentra en la costa de Coromandel, y su tamaño es con corta diferencia el del malviz.

Su longitud total es de catorce pulgadas y tres líneas, el pico tiene cerca de una pulgada, el tarso cerca de una pulgada; tiene las alas cortas; la cola siete pulgadas y diez líneas y media, y está compuesta de diez pennas, de las cuales las dos intermedias son mucho mas largas que las laterales, y estas cuneiformes; la cola es seis pulgadas y cinco líneas mas larga que las alas.

XX.

EL SAN-HIA DE LA CHINA.

*Cuculus sinensis*. L.

ESTE cuclillo se parece á la especie precedente, y por consecuencia á las viudas, en cuanto á la longitud de las dos pennas intermedias de la cola. Su plumaje es muy marcado, aunque solo entran en él dos colores principales, cuales son el azul y el blanco. El azul mas ó menos brillante reina en general en la parte superior, y el blanco de nieve en la inferior; pero parece

que la naturaleza, siempre feliz en sus descuidos, ha dejado caer de su paleta algunas gotas de este blanco de nieve sobre el vértice de la cabeza, donde ha formado una placa en la que se abre paso el azul por una infinidad de puntos; en los carrillos, algo hácia atrás, donde representa dos especies de pendientes, semejantes á los de la especie anterior; y en las pennas y coberteras de la cola, en cada una de las cuales forma un ojo blanco cerca de su extremo: además, este color blanco parece perderse entre el cerúleo del obispillo y de la base de las grandes pennas de las alas, cuya tinta hace por lo mismo algo mas clara; todo esto está realzado con el color oscuro y negruzco de la garganta y de los lados de la cabeza; en fin el hermoso color rojo del iris, del pico, y de los pies completa la hermosura de esta ave.

Su longitud total es de quince pulgadas y cuatro líneas; el pico tiene cerca de una pulgada, y algunas barbas al rededor de su base superior; el tarso tiene mas de una pulgada; la cola ocho pulgadas y nueve líneas, y está compuesta de diez pennas muy desiguales, pues las dos intermedias sobresalen tres pulgadas y nueve líneas á las dos laterales que las siguen; seis pulgadas y mas de una líneas á las dos externas, y á las alas en casi toda su longitud.



## XXI.

## EL TAIT-SÚ.

*Cuculus cæruleus. L.*

He conservado tambien á esta ave, segun mi costumbre, su nombre salvaje, que por lo comun es el mejor y el mas característico.

El tait-su, llamado así en Madagascar que es su pais nativo, tiene todo el plumaje de un hermoso azul, y esta bella uniformidad está realzada tambien con algunos matices muy brillantes de violado y de verde, que reflejan las pennas de las alas; y con matices de violado puro, sin la mas leve tinta verde, que reflejan las pennas de la cola; en fin, el color negro de los pies y del pico forma una como sombra á este pequeño cuadro.

Su longitud total es de diez y nueve pulgadas y diez líneas; el pico tiene cerca de diez y nueve líneas; el tarso dos pulgadas y cuatro líneas; el vuelo veinte y tres pulgadas y cuatro líneas; la cola diez pulgadas y media, está compuesta de diez pennas, de las cuales las dos intermedias

son algo mas largas que las laterales, y sobresale siete pulgadas á las alas cerradas.

## XXII.

## EL CUCLILLO INDICADOR.

*Cuculus indicator. L.*

Ex el interior de Africa, y á alguna distancia del cabo de Buena-Esperanza, es donde se encuentra esta ave, conocida por su singular instinto de indicar los nidos de las abejas silvestres. La mañana y la tarde son las dos épocas del dia en que se oye su grito, *chirs, chirs* (1), que es muy agudo, y con el cual parece llamar á los cazadores y otras personas que andan buscando la miel por el desierto; estos le responden con tono grave, á medida que se acercan,

(1) Segun otros viajeros parece que el grito de esta ave es *wieki, wieki*; y esta palabra *wieki* significa miel en la lengua hotentota. Algunas veces ha acontecido que guiándose el cazador por la voz de este cuclillo, ha sido devorado por las fieras, y no ha dejado de decir que el ave se entendia con ellas para entregarles su presa.



y luego que el ave los descubre va á cernerse sobre el árbol hueco donde sabe que hay una colmena; si los cazadores tardan en dirigirse allí, redobla sus gritos, se pone delante de ellos, y vuelve á su árbol, sobre el cual se detiene y revolotea, indicándoselo de una manera muy notable; nada olvida en fin para escitarlos á que se aprovechen del pequeño tesoro que ha descubierto, y del que no puede gozar al parecer sino con la ayuda del hombre, bien sea porque la entrada de la colmena es muy estrecha, ó por otras circunstancias que no nos dice el que hace esta relacion. Mientras que están los hombres ocupados en extraer la miel del árbol, se está el ave posada sobre alguna mata no muy lejos de aquel sitio, observando con interés lo que pasa, y esperando su parte en el botín que nunca olvidan dejarle; pero no en mucha cantidad, como se deja entender, para que no se saque y pierda ó amortigüe con esto su ardor para esta caza.

Este no es un cuento de viajero, es sí, la observacion de un hombre ilustrado que ha asistido á la destruccion de muchas repúblicas de abejas descubiertas por esta pequeña espía, y da cuenta de lo que ha visto á la sociedad real de Lóndres. Véase aquí la descripcion que hace de la hembra, sobre los dos únicos indi-

viduos que pudo proporcionarse, y que mató con grande escándalo de los Hotentotes; porque en todo país la existencia de un sér útil es una existencia preciosa.

Tiene la parte superior de la cabeza de color gris; la garganta, la parte anterior del cuello, y el pecho blanquicosos, con una tinta verde que se va debilitando, de manera que apenas es ya perceptible en el pecho; el vientre es blanco, y los muslos lo mismo, pero están señalados con una mancha negra oblonga; el dorso y el obispillo son de un gris rojizo; las coberteras superiores de las alas de un gris oscuro, y las mas inmediatas al cuerpo están señaladas con una mancha amarilla, que á causa de su situacion se encuentra muchas veces oculta bajo las plumas escapulares; las pennas de las alas son pardas, y las dos pennas intermedias de la cola son mas largas y estrechas que las otras y de un pardo que tira al color de herrumbre; los dos pares que siguen son negruzcos, con el lado interno de blanco sucio; los siguientes son de color blanco, con puntas pardas, y con una mancha negra cerca de su base, escepto el último par en el que esta mancha es apenas perceptible; el iris es gris rojizo; los párpados negros; el pico pardo en la base, y amarillo por la punta, y los pies negros.



Su longitud total es de siete pulgadas y siete líneas; el pico tiene unas siete líneas, y algunas barbas al rededor de la base de la mandíbula inferior; las aberturas de la nariz son oblongas con un borde saliente, están situadas cerca de la base de la mandíbula superior, y separadas únicamente por su arista; tiene los tarsos cortos, las uñas débiles, y la cola cuneiforme, la cual está compuesta de doce pennas, y escede á las alas en los tres cuartos de su longitud.

## XXIII.

## EL VURU DRIÛ.

*Cuculus afer.* L.

Esta especie y la precedente difieren de todas las demas por el número de pennas de la cola, pues son doce, en vez de que las otras no tienen mas que diez. Las diferencias propias del vurú-driú consisten en la forma de su pico, que es mas largo, mas recto, y menos convexo por encima, en la situación de las aberturas de la nariz, que son oblongas y colocadas oblicuamente hácia la mitad de la longitud del pico; y

en otro atributo que le es comun con las aves de rapña, y es que la hembra de esta especie es mayor que su macho, y de plumaje muy diferente. Esta ave se encuentra en Madagascar, y seguramente tambien en la parte correspondiente de Africa.

El macho tiene el vértice de la cabeza negruzco con visos verdes y de color cobrizo; y tambien una raya negra situada oblicuamente entre el pico y el ojo; lo restante de la cabeza, la garganta y el cuello son cenicientos; el pecho y todo lo restante de la parte inferior del cuerpo son de un bonito gris blanco; la parte superior del cuerpo, hasta la punta de la cola, de un verde con visos cobrizos; las pennas medias de las alas son tambien, con corta diferencia, de este mismo color; las grandes son negruzcas tirando á verde; el pico es pardo subido, y los pies rojizos.

La hembra es tan diferente del macho, que los habitantes de Madagascar le han dado un nombre distinto; pues la llaman *cromb* en la lengua del pais. Esta tiene la cabeza, la garganta, y la parte superior del cuello rayadas transversalmente de pardo y de rojo; el dorso, el obispillo, y las coberteras superiores de la cola de un pardo uniforme; las pequeñas coberteras superiores de las alas pardas, con puntas rojas,



y las grandes de un verde oscuro, orladas y terminadas de rojo; las pennas de las alas son parecidas á las del macho, solo que las medias están orladas de rojo; la parte anterior del cuello y todo lo restante de la inferior del cuerpo son de un rojo claro variegado de negruzco; las timoneras son de un pardo lustroso con punta roja, y el pico y los pies son con corta diferencia como en el macho.

Véanse aquí sus dimensiones comparadas:

	EL MACHO.		LA HEMBRA.	
	pulg.	lin.	pulg.	lin.
Longitud total. . . . .	17	6	20	5
Pico. . . . .	2	4	2	9 $\frac{1}{3}$
Tarso. . . . .	4	5 $\frac{1}{2}$	4	5 $\frac{1}{2}$
Vuelo. . . . .	29	11 $\frac{2}{3}$	34	3 $\frac{1}{4}$
Cola. . . . .	8	2	9	$\frac{1}{2}$
La cola escede á las alas en .	2	8 $\frac{1}{6}$	3	$\frac{1}{6}$

## AVES DE AMÉRICA

QUE TIENEN RELACION CON EL CUCLILLO.

### I.

#### EL CUCLILLO LLAMADO EL VIEJO Ó EL AVE PLUVIATIL.

*Cuculus pluvialis*. L.

Se ha dado á esta ave el nombre de *viejo*, porque tiene debajo de la garganta una especie de plumon blanco, ó por mejor decir, de barba blanca, que es el atributo de la vejez. Danle tambien el nombre de *ave pluviatil*, porque nunca hace resonar tanto los bosques con sus gritos como cuando está para llover. Reside todo el año en Jamáica, y no solo en los bosques, sino por todas partes donde hay arbustos; y deja que se le acerquen mucho los cazadores antes de tomar