

y las grandes de un verde oscuro, orladas y terminadas de rojo; las pennas de las alas son parecidas á las del macho, solo que las medias están orladas de rojo; la parte anterior del cuello y todo lo restante de la inferior del cuerpo son de un rojo claro variegado de negruzco; las timoneras son de un pardo lustroso con punta roja, y el pico y los pies son con corta diferencia como en el macho.

Véanse aquí sus dimensiones comparadas:

	EL MACHO.		LA HEMBRA.	
	pulg.	lin.	pulg.	lin.
Longitud total.	17	6	20	5
Pico.	2	4	2	9 $\frac{1}{3}$
Tarso.	4	5 $\frac{1}{2}$	4	5 $\frac{1}{2}$
Vuelo.	29	11 $\frac{2}{3}$	34	3 $\frac{1}{4}$
Cola.	8	2	9	$\frac{1}{2}$
La cola excede á las alas en .	2	8 $\frac{1}{6}$	3	$\frac{1}{6}$

AVES DE AMÉRICA

QUE TIENEN RELACION CON EL CUCLILLO.

I.

EL CUCLILLO LLAMADO EL VIEJO Ó EL AVE PLUVIATIL.

Cuculus pluvialis. L.

Se ha dado á esta ave el nombre de *viejo*, porque tiene debajo de la garganta una especie de plumon blanco, ó por mejor decir, de barba blanca, que es el atributo de la vejez. Danle tambien el nombre de *ave pluviatil*, porque nunca hace resonar tanto los bosques con sus gritos como cuando está para llover. Reside todo el año en Jamáica, y no solo en los bosques, sino por todas partes donde hay arbustos; y deja que se le acerquen mucho los cazadores antes de tomar

el vuelo. Las semillas y gusanillos son su alimento ordinario.

Esta ave tiene la parte superior de la cabeza cubierta de plumitas muy finas y suaves como la seda, de color pardo subido; lo restante de la parte superior del cuerpo, incluidas las alas y las dos intermedias de la cola, son de un ceniciento aceitunado; la garganta es blanca, así como la parte anterior del cuello; el pecho y el resto de la parte inferior del cuerpo rojos; todas las rectrices laterales negras con punta blanca, y la mas esterna orlada de lo mismo; la mandibula superior es negra, la inferior casi blanca, y sus pies de un negro azulado. Es algo mayor que el mirlo.

El estómago del que disecó Mr. Sloane era muy grande proporcionalmente al tamaño del ave, lo que es un punto de conformidad con la especie europea, y estaba provisto de una membrana muy doble; los intestinos estaban enrollados circularmente como el cable de una embarcacion, y cubiertos de grasa amarilla.

Su longitud total es de diez y siete pulgadas y media á diez y nueve y media; el pico tiene una pulgada y dos líneas; el tarso unas quince líneas; tiene tanto de vuelo como de longitud total; la cola es de unas ocho pulgadas y nueve líneas á nueve pulgadas y once líneas; está

compuesta de diez pennas cuneiformes, y escude á las alas en toda su longitud.

Especies afines del viejo ó ave pluviátil.

I.

EL VIEJO DE ALAS RUBIAS.

Cuculus americanus. L.

ESTA ave tiene las mismas tintas en las partes superiores y en la cola, y casi las mismas en el pico; pero el blanco de la parte inferior del cuerpo, que en el ave pluviátil solo se estiende sobre la garganta y el pecho, se dilata en esta por toda la parte inferior; además, las alas están teñidas de rubio, y son mas largas á proporcion. En fin, la cola es mas corta, y tiene otra conformacion, como se verá mas abajo en el artículo de las medidas.

Este cuclillo es solitario, está siempre metido en las selvas mas sombrías; pero al acercarse el invierno, abandona la Carolina para ir en busca de una temperatura mas benigna.

Su longitud total es de quince pulgadas y dos líneas; el pico tiene diez y seis líneas y media; el tarso algo mas de quince líneas; la cola siete

pulgadas, y está compuesta de diez pennas, de las cuales los tres pares intermedios son mas largos, pero iguales con corta diferencia entre sí, y los dos pares laterales cortos, y tanto mas cortos cuanto mas esternos; las mas largas esceden á las alas en cuatro pulgadas y ocho líneas.

II.

EL VIEJECITO.

Cuculus minor. L.

Conocido en Cayena con el nombre de *cuculillo de mangles*.

Esta ave, y especialmente su hembra, tiene tanta semejanza con el viejo, ó ave pluvíatil de Jamáica, tanto por los colores como por la conformacion general, que podria servir la descripcion de la una para la otra, excepto sin embargo en cuanto al tamaño; pues el de Cayena es mas pequeño, por cuya razon le he dado el nombre de *viejecito*. Parece tambien que tiene la cola algo mas corta á proporcion; pero esto no impide que se le pueda considerar como una variedad de clima. Aliméntase de insectos, y especialmente de

las grandes orugas que roen las hojas de los mangles, por lo cual gusta de permanecer sobre estos árboles, donde destruye muchos de aquellos insectos.

Su longitud total es de un pie y dos pulgadas; el pico tiene mas de quince líneas; el tarso catorce; la cola seis pulgadas y cinco líneas, está compuesta de diez pennas cuneiformes, y es unas cuatro pulgadas mas larga que las alas recogidas.

II.

EL TACO (1).

Cuculus vetula. L.

SLOANE asegura que á escepcion del pico, que en esta ave es mas prolongado, mas delgado y blanco, se parece en todo al ave pluvíatil; le atribuye tambien los mismos hábitos, y en con-

(1) En las Antillas le dan el nombre de taco, por su grito; los negros le llaman *craará* y *taará bayó*, sin que se sepa por qué. (*Lefebvre Deshayes*.)

En Santo Domingo le llaman *colivicu*, segun Salerno.

secuencia le da los mismos nombres. Pero Brisson, fundándose al parecer en la notable diferencia de longitud y de conformacion del pico, ha hecho del ave de que aquí se trata una especie distinta; con tanta mayor razon, como que si se la observa de cerca se descubren tambien en ella diferencias de plumaje, y no tiene tampoco esa garganta ó barba blanca que ha dado el nombre de *viejo* á la especie precedente. Por otra parte, el caballero Lefebvre-Deshayes, que ha observado el taco con atencion, no descubrió en él los mismos hábitos que Sloane notó en el viejo.

Taco es el grito habitual, aunque poco frecuente, de este cuclillo; pero, para poderlo expresar como él lo pronuncia, es necesario articular con fuerza la primera sílaba, y bajar de una octava llena á la segunda: nunca lo despide sin haber hecho antes un movimiento con la cola, el cual repite cada vez que quiere cambiar de sitio, cuando se posa sobre una rama, ó ve que alguno se acerca á él. Tiene además otro grito *qua, qua, qua, qua*; pero solo prorrumpe en él cuando se espanta por la presencia de un gato ó de cualquier otro enemigo peligroso.

Dice Sloane, hablando de este cuclillo, que anuncia la lluvia como el ave pluviátil, con

sus repetidos gritos; pero el caballero Deshayes (1) no ha observado nada de esto.

Aunque el taco permanece comunmente en los terrenos cultivados, frecuenta tambien los bosques, porque encuentra igualmente en ellos el alimento que le conviene, el cual consiste en orugas, coleópteros, lombrices y gusanillos, en ratas, en piojos de madera, y en otros insectos, muy comunes por desgracia en las Antillas, tanto en los parajes cultivados como en los que no lo están; da caza tambien á las lagartijas llamadas *anolis*, á las pequeñas culebras, á las ranas, á las ratas pequeñas, y algunas veces tambien, segun dicen, á los pajarillos: sorprende á los lagartos en el momento en que están descuidados sobre las ramas asechando las moscas. Con respecto á las culebras, las traga por la cabeza, y á medida que va digiriendo la parte tragada, va aspirando la que queda pendiente. Por lo tanto es un animal útil, puesto que destruye los animales dañinos; y aun podria serlo mas si se pudiese domesticar, lo que parece posible, en atencion á que es su índole tan poco arisca y desconfiada, que los niños negros lo cogen con la mano, y aunque su pico es bastante recio, no se sirve de él para defenderse.

(1) Todo cuanto digo aquí sobre los hábitos del taco lo debo al caballero Deshayes.

Su vuelo no es nunca elevado; bate las alas cuando parte, y luego, abriendo la cola, se dispara y se cierne mas bien que no vuela; va de mata en mata, salta de rama en rama, y hasta sobre los troncos de los árboles, á los que se agarra como los picos; á veces se posa en el suelo donde anda á saltitos como la urraca, persiguiendo siempre los insectos ó reptiles. Aseguran que esta ave exhala en todos tiempos un olor fuerte, y que su carne no es buena de comer, lo que puede creerse fácilmente si se atiende á las sustancias con que se alimenta.

Estas aves se retiran por el tiempo de la puesta á lo mas hondo de los bosques, y allí saben ocultarse tan bien, que nadie ha visto jamás su nido; casi estaria uno por creer que no lo hacen, y que, á semejanza del cuclillo de Europa, ponen en nidos ajenos; pero diferirian en esto de la mayor parte de los cuclillos de América, que anidan y empollan por sí mismos sus huevos.

Los colores del plumaje del taco no son brillantes; pero siempre conserva un aspecto de limpieza y de aliño que da gusto á la vista. La parte superior de la cabeza y del cuerpo, incluso las coberteras de las alas, son de un gris algo subido con visos verdosos únicamente en las grandes coberteras; la parte anterior del

cuello y del pecho son de un gris ceniciento, y sobre todos estos matices de gris se advierte una leve tinta rojiza; la garganta es de color leonado claro, y lo restante de la parte inferior del cuerpo, los muslos y las coberteras inferiores de las alas, de un leonado mas ó menos subido; las diez primeras pennas de las alas son de un rojo encendido con punta pardo-verdosa, que va extendiéndose en las pennas siguientes sobre el color rojo; las dos pennas intermedias de la cola son del color del dorso con visos verdosos, y las ocho restantes del mismo color en la parte media, de un pardo negruzco con visos azules cerca de la base, con el extremo blanco; el iris es de un amarillo oscuro; los párpados rojos; el pico negruzco por encima, y de un color algo mas claro por debajo, y los pies son azulados. Este cuclillo no es tan grande como el nuestro, pesa algo mas de tres onzas, y se le encuentra en la Jamáica, en Santo Domingo, etc.

Su longitud total es de diez y ocho pulgadas y una línea; pero segun Sloane es de veinte pulgadas y algo mas de tres líneas; el pico tiene veinte y una líneas, segun Sloane; veinte y cuatro y media, segun el caballero Deshayes, y algo mas de veinte y nueve, segun Brisson; la lengua es cartilaginosa, y remata en algunos filamentos; el tarso tiene unas diez y siete líneas y

media, y su vuelo es como la longitud total; la cola tiene nueve pulgadas y cuatro líneas, según Deshayes, y diez pulgadas y diez líneas y media, según Brisson; está compuesta de diez pennas cuneiformes, puestas las intermedias sobre las laterales, y es unas seis pulgadas y cinco líneas mas larga que las alas recogidas.

III.

EL GUIRA-CANTARA.

Cuculus guira. L.

ESTE cuclillo es muy gritador, y habita en las selvas del Brasil, las que hace resonar con su voz, que tiene mas de fuerte que de agradable. Vese sobre la cabeza una especie de moño de plumas pardas con bordes amarillentos; las del cuello y de las alas son al contrario amarillentas y orladas de pardo; la parte superior y la inferior del cuerpo son de un amarillo pálido; las pennas de las alas son pardas, y las de la cola pardas tambien, pero con el extremo blanco; el iris es pardo; el pico amarillo-oscuro, y los pies de color verdemar.

Es del tamaño de la urraca de Europa.

Su longitud total es de unas diez y seis pulgadas y media á diez y siete y media; el pico tiene algo mas de una pulgada, y es algo corvo por la punta; el tarso tiene una pulgada y nueve líneas, y está vestido de plumas; la cola tiene nueve pulgadas y cuatro líneas, y está compuesta de ocho pennas; ¿pero no faltaba alguna? Estas pennas parecen iguales en la figura.

IV.

EL CUAPACTOL, O EL REIDOR.

Cuculus ridibundus. L.

HAN dado á este cuclillo el nombre de *ave reidora*, porque su grito es parecido en efecto á una carcajada; por cuya razon, dice Fernandez, pasaba en Méjico por ave de mal agüero antes que la luz de la verdadera religion hubiese alumbrado aquellas comarcas. Con respecto al nombre mejicano *quapachtototl*, que me ha parecido deber reducir y dulcificar, tiene relacion con el color leonado que reina en toda la parte superior de su cuerpo, y hasta en las pennas de las alas;

las de la cola son leonadas tambien, pero tienen una tinta mas oscura; la garganta es cenicienta, así como la parte anterior del cuello y el pecho; lo restante de la inferior del cuerpo es negro; el iris blanco, y el pico de un negro azulado.

El tamaño de este cuclillo es con corta diferencia como el de la especie europea; tiene siete pulgadas de longitud total, y la cola sola compone la mitad de esta longitud.

V.

EL CUCLILLO CORNUDO O EL ATINGACU DEL BRASIL.

Cuculus cornutus. L.

LA singularidad de este cuclillo del Brasil consiste en tener sobre la cabeza algunas plumas largas que puede levantar á su placer, y con las cuales sabe formar doble moño; motivo porque le dió Brisson el nombre de *cuclillo cornudo*. Tiene esta ave la cabeza abultada y el cuello corto, como se echa de ver en este género de aves; toda la parte superior de la cabeza y del cuerpo es de color de herrumbre; las alas tambien,

y hasta la cola; pero esta presenta una tinta mas oscura, y sus pennas tienen en el extremo una mancha de color blanco rojizo sombreado de negro, que acaba en un blanco puro; la garganta es cenicienta, como toda la parte inferior del cuerpo; el iris es de un rojo sanguineo; el pico de un verde amarillento y los pies cenicientos.

Esta ave es tambien muy notable por la longitud de su cola; porque, si bien no es mas grande que un zorzal ó tordo mayor, y solo tiene su cuerpo tres pulgadas y media de largo, su cola tiene diez y media; esta consta de diez pennas cuneiformes puestas las intermedias sobre las laterales, el pico es algo corvo por la punta, y los tarsos cortos y cubiertos de plumas por delante (1).

(1) Dice Margrave que los dedos de este cuclillo están dispuestos del modo mas comun; pero la figura los presenta dos delante y dos detrás.



VI.

EL CUCLILLO PARDO VARIEGADO DE RUBIO.

Cuculus naevius. L.

ESTE cuclillo de Cayena tiene la parte superior del cuerpo variegada de pardo y diferentes matices de color rubio; la garganta es de rojo claro variegado de pardo, y lo restante de la parte inferior del cuerpo de un blanco rojizo, que toma una tinta de rubio claro marcado en las coberteras inferiores de la cola; las pennas de esta y de las alas son pardas con bordes de un rubio claro y un ojo verdoso, principalmente en las pennas laterales de la cola; el pico es negro por encima, rubio por los lados y rojizo por debajo; los pies son cenicientos. Ha parecido singular que algunas de las coberteras superiores de la cola se extiendan casi hasta los dos tercios de su longitud. Esta ave puede compararse por el tamaño con el malviz.

Su longitud total es de doce pulgadas y algo

mas de cinco líneas; el pico tiene diez líneas y media; el tarso mas de diez y seis líneas; el vuelo mas de un pie y dos pulgadas; la cola unas siete pulgadas, está compuesta de diez pennas cuneiformes, y es cuatro pulgadas y ocho líneas mas larga que las alas recogidas.

El cuclillo, llamado en Cayena *ave de cercados* (1), es con corta diferencia del tamaño del precedente, y se le parece tambien mucho en el plumaje: en general, tiene algo menos de color rubio, y en su lugar se ve el gris; las pennas laterales de la cola tienen el extremo blanco; la garganta de un gris claro, y blanca la parte inferior del cuerpo; tiene además la cola un poco mas larga. Pero, á pesar de estas leves diferencias, no podemos menos de referirle como variedad á la especie precedente, y aun quizás es una simple variedad de sexo. Diósele el nombre de *ave de cercados*, porque se la ve posada muchas veces sobre las palizadas de los ingenios, y cuando se halla en esta situacion menea constantemente la cola.

Estas aves, sin ser muy silvestres, no se reúnen nunca en bandadas, aunque se ven muchas á la vez en el mismo distrito; no frecuentan mucho las selvas, y aseguran que son mas co-

(1) Sonnini tuvo á bien darme esta variedad.

munes que los cuclillos piayas, no solo en Cayena, sino tambien en la Guayana.

VII.

EL CENICIENTO.

Cuculus dominicus. L.

LLAMAN así á esta ave, porque el color dominante de su plumaje es gris ceniciento, el cual es mas subido por encima hasta la cola, incluidas sus cuatro pennas intermedias, y mas claro por debajo, y mezclado de mas ó menos color rojo en las pennas de las alas; los tres pares de las pennas laterales de la cola son negruzcos con el extremo blanco, y el par mas esterno está orlado de este mismo color blanco; el pico y los pies son tambien de un gris oscuro. Esta ave se encuentra en la Luisiana y en Santo Domingo, pero probablemente en diversas estaciones. Dicen que es con corta diferencia del tamaño del pequeño tordo llamado *malviz*.

Yo he visto en el gabinete de Mr. Mauduit una variedad, con el nombre de *pequeño cuclillo gris*, la que solo diferia del ceniciento en

tener toda la parte inferior del cuerpo blanca, en ser algo mayor, y en tener mas corto el pico.

La longitud total del ceniciento es de doce pulgadas y tres líneas á doce pulgadas y diez líneas; el pico tiene diez y seis ó diez y siete líneas, y ambas mandíbulas son corvas; el tarso tiene una pulgada y dos líneas; el vuelo diez y ocho pulgadas y una línea; la cola unas seis pulgadas y tres líneas, está compuesta de diez pennas cuneiformes, y es de dos pulgadas y once líneas á tres pulgadas y media mas larga que las alas plegadas.

VIII.

EL CUCLILLO PIAYA.

Cuculus cayanus. L.

AUNQUE conservo á este cuclillo el nombre de *piaya* que le dan en Cayena, no adopto en manera alguna la supersticion que se lo dió. *Piaya* significa *diablo* en lengua del pais, y entre el pueblo idólatra, *ministro* ó *intérprete del diablo*. Esto indica bastante que dicha ave es tenida por de mal agüero; por esta razon, dicen que

los naturales y hasta los negros repugnan comer su carne; pero ¿no nacerá mas bien esta repugnancia de que su carne es flaca en todas las estaciones?

El piaya es poco arisco, se deja acercar bastante, y no huye hasta que están ya próximos á agarrarle. Comparan su vuelo con el de la arvela; permanece comunmente en las orillas de los rios, posado sobre las ramas bajas de los árboles, desde donde puede al parecer descubrir y coger mejor los insectos de que se alimenta. Cuando está así posado sacude la cola y cambia sin cesar de puesto. Algunas personas que han residido algun tiempo en Cayena, y que han visto varias veces á este cuclillo en el campo, dicen que no han oido nunca su grito. Es con corta diferencia del tamaño del mirlo. La parte superior de la cabeza y del cuerpo es de color castaño purpúreo, inclusas tambien las rectrices, que son negras hácia la punta y con el extremo blanco, y las remeras que lo tienen pardo; la garganta y la parte anterior del cuello son tambien de color castaño purpúreo, pero de una tinta mas clara y variable en diferentes individuos; el pecho y toda la parte inferior del cuerpo son de color ceniciento, y el pico y los pies de un gris oscuro.

Su longitud total es de diez y ocho pulgadas

y cuatro líneas; el pico tiene algo mas de diez y seis líneas; el tarso unas diez y seis líneas; el vuelo diez y siete pulgadas y diez líneas, y la cola once pulgadas y ocho líneas, está compuesta de diez pennas cuneiformes y muy desiguales, y es nueve pulgadas y cuatro líneas mas larga que las alas. El individuo que está en el gabinete de Mr. Mauduit es algo mayor que este.

He visto dos variedades de esta especie: una de ellas es con corta diferencia del mismo tamaño; pero difiere en los colores, pues tiene el pico rojo, la cabeza cenicienta, la garganta y el pecho rojos, y lo restante de la parte inferior del cuerpo de un ceniciento negruzco.

La otra variedad tiene con cortísima diferencia los mismos colores; solo difiere en que el ceniciento de la parte inferior del cuerpo tiene una tinta parda. Los hábitos de esta ave son tambien los mismos, y la única diferencia real que en ella se nota es la del tamaño, que se acerca mucho al del malviz.

Su longitud total es de unas doce pulgadas; el pico tiene cerca de trece líneas; el tarso mas de una pulgada; su vuelo es de trece pulgadas y cinco líneas, y la cola, que tiene cerca de siete pulgadas, está compuesta de diez pennas cuneiformes y es unas cuatro pulgadas y ocho líneas mas larga que las alas.

IX.

EL CUCLILLO NEGRO DE CAYENA.

Cuculus tranquillus. L.

CASI todo es negro en esta ave, excepto el pico y el iris que son rojos, y las coberteras superiores de las alas que están orladas de blanco; pero este negro no es enteramente uniforme, pues es menos subido en la parte inferior del cuerpo que en la superior.

Su longitud total es de unas doce pulgadas y diez líneas; el pico tiene unas veinte líneas; el tarso algo mas de nueve; la cola está compuesta de diez pennas algo cuneiformes, y es unas tres pulgadas y media mas larga que las alas plegadas.

Sonnini me ha asegurado que esta ave tenia cierta escrescencia en la parte anterior del ala. Vive solitaria y tranquila, posada por lo comun en los árboles que se levantan á orillas del agua, y no se mueve ni con mucho tanto como la mayor parte de los cuclillos; de suerte que parece formar gradacion entre estas aves y los barbudos.

X.

EL PEQUEÑO CUCLILLO NEGRO DE CAYENA (1).

Cuculus tenebrosus. L.

ESTE cuclillo se parece á la especie precedente, no solo por el color dominante del plumaje, sino tambien por sus hábitos naturales. Aunque no frecuenta los bosques, no por eso es menos silvestre: pasa todo el dia posado sobre una rama aislada, en paraje descubierto, y sin hacer mas movimiento que el necesario para coger los insectos de que se alimenta. Anida en los huecos de los árboles, y algunas veces tambien hasta en agujeros en el suelo; pero solo cuando los encuentra ya hechos.

Este cuclillo es negro por todas partes, excepto en la posterior del cuerpo que es blanca; y este blanco, que se estiende hasta sobre las

(1) Debemos á Sonnini el conocimiento de esta especie, así como el de sus hábitos.

piernas, está separado del negro de la parte anterior por medio de una especie de ceñidor anaranjado. Por lo demás, en el individuo que he visto en el gabinete de Mr. Mauduit, el blanco no se estendia tanto como parece en la estampa iluminada.

Su longitud total es de nueve pulgadas y siete líneas y media; el pico tiene diez líneas y media; el tarso es muy corto, y la cola, que no llega á tres pulgadas, y es algo cuneiforme, no es mucho mas larga que las alas recogidas.

LOS ANÍES.

Así llaman los naturales del Brasil á esta ave, nombre que conservamos nosotros, á pesar de darle los viajeros franceses y modernos nomencladores el de *bout de petun* ó *bout de tabac*, nombre ridiculo, que no pudo ser imaginado mas que por el color de su plumaje que se parece en lo negruzco á un garrote de tabaco; porque no es verdadero ni probable lo que dice el P. du Tertre, que en su canto pronuncie *petit bout de petun*, por cuanto le han dado los criollos de Cayena una denominacion mas apropiada á su

gorgo ordinario, llamándole *quema de canario*, denotando con esto lo que imita el ruido del agua hirviendo en un puchero; y en efecto es su canto ó gorgo muy variado, segun puede inferirse de las palabras que cita el P. du Tertre. Le han dado asimismo el nombre de *ave diablo*, y algunos han llamado á una de sus especies *diablo de las sábanas*, y á la otra *diablo de los mangles*, por morar constantemente los unos en las sábanas, y frecuentar los otros las orillas del mar y las lagunas salobres donde crecen los mangles.

Sus caracteres genéricos consisten en tener dos dedos hácia delante y dos hácia atrás, el pico corto y corvo, mas grueso que ancho, cuya mandíbula inferior es recta, elevándose la superior en semicírculo hácia su origen. Se estiende esta notable curvatura sobre toda la parte superior del pico hasta poca distancia de su estremidad retorcida; comprímese sobre los lados, y forma una especie de arista que casi corta lo largo del remate de la mandíbula superior, sobre la cual y al rededor se elevan pequeñas plumas adelgazadas, tiesas como cerdas de lechon, largas poco mas de media pulgada, y todas dirigidas hácia adelante. Tan singular conformacion del pico basta para conocer estas aves, y parece exigir que se haga de ellas un género

particular, el que sin embargo no se compone mas que de dos especies.

.....

EL ANÍ DE LAS SABANAS.


PRIMERA ESPECIE.

Crotophaga aní. L.

ESTE aní es del tamaño de un mirlo; pero su grande cola prolonga su figura, pues tiene ocho pulgadas y dos líneas, lo que escede á la mitad de la longitud total del ave, que solo tiene quince pulgadas y nueve líneas. El pico, largo de quince líneas, tiene mas de once de altura, y es negro como los pies, que tienen unas veinte líneas de alto. La descripcion de los colores será corta: redúcense á un negro apenas matizado de visos violados sobre todo el cuerpo, si se exceptua una pequeña orilla de un verde subido y luciente que orla las plumas del dorso y las coberteras de las alas, pero que no se percibe á cierta distancia, pues estas aves parecen enteramente negras. Las hembras no se distinguen de los machos. Véseles constantemente en bandadas, y son de índole tan social que se reúnen muchos

en un mismo nido, el cual construyen con ramitas secas sin cuidar del abrigo, y lo hacen tan estremadamente ancho, que tiene muchas veces catorce pulgadas de diámetro: pretenden algunos que ellos proporcionan su capacidad al número de camaradas que quieren admitir. Las hembras empollan en sociedad, y muchas veces se ha visto á cinco ó seis en un mismo nido. Este instinto, cuyo efecto les seria útil en un clima frio, parece por lo menos supérfluo en un país meridional, donde no pueden temer que no se conserve en calor el nido: es pues únicamente un impulso de su índole social, porque ellos van juntos ya vuelen, ya descansan, y aun cuando están posados sobre las ramas de los árboles, procuran acercarse lo mas que pueden unos á otros. De este modo gorgean juntos casi todas las horas del día, reunidos en tropas, que no bajan de ocho á diez, y que algunas veces suben hasta veinte y cinco ó treinta. Su vuelo es corto y poco elevado, motivo por el cual reposan mas frecuentemente sobre los zarzales y malezas que sobre los grandes árboles. Ni son temerosos ni montaraces, y jamás huyen muy lejos. No les amedrenta el ruido de las armas de fuego, y es cosa fácil dispararles repetidas veces; pero nadie los busca, porque su carne no es buena de comer, y aun cuando vivos ex-

halan muy mal olor. Aliméntanse de semillas, y tambien de pequeñas serpientes, lagartos y otros reptiles; pónsanse tambien sobre los bueyes y vacas para comer los garrapatos, gusanos y otros insectos que anidan en su piel.



EL ANÍ DE LOS MANGLES (1).

SEGUNDA ESPECIE.

Crotophaga major. L.

ESTE es mayor que el otro, y á corta diferencia del tamaño de un grajo; su longitud, comprendiendo la de la cola, que se lleva mas de la mitad, es de veinte y una pulgadas; el color de su plumaje difiere muy poco en lo negruzco del primero; solo es mas variado por la orla de un brillante verde que termina las plumas del dorso y las coberteras de las alas; de

(1) Aní, *Suplem. de la Enciclopedia*. t. 1, art. Aní, por Adanson. Debemos observar que el sabio autor de este artículo parece dudar que los anies ponen y empollan juntos en un mismo nido: sin embargo, tantos testigos oculares nos lo han asegurado, que ya no es posible negarlo.

suerte, que si juzgamos por estas diferencias de tamaño y colores, tomaremos estas dos aves por variedades de la misma especie. Pero la prueba de que forman dos distintas especies es que nunca se mezclan; las primeras habitan constantemente las sábanas descubiertas, y las segundas solo se encuentran en los mangles: tienen estas con todo los mismos hábitos naturales que aquellas, se reunen en bandadas, descansan en las orillas de las aguas salobres, ponen y empollan muchas en un mismo nido, y parecen constituir una raza diferente, acostumbrada á habitar en terreno mas húmedo, donde hay sustento mas abundante por la grande cantidad de pequeños reptiles é insectos que produce.

Al acabar este artículo he recibido una carta del caballero Lefebvre-Deshayes, relativa á las aves de Santo Domingo, de la que doy en extracto lo que él nota sobre la presente.

«Esta ave es de las mas comunes en la isla de Santo Domingo... Nómbranla los Negros diferentemente, llamándola *bout de tabac*, *aman-gona*, *papagayo negro*, etc. Atendida la estructura de sus alas, su vuelo corto y lo liviano de su peso á proporcion de su volúmen, conoceráse fácilmente ser ave indígena de estos climas del nuevo Mundo. ¿Como, con tan corto vuelo y