

neas la cola, comprendiendo las dos pennas intermedias que exceden á las laterales.

IV.

EL IBIJAU.

Caprimulgus brasiliensis. GMEL.

ENCUÉNTRANSE en esta ave del Brasil todos los atributos del papavientos: cabeza ancha y comprimida, grandes ojos, pequeño pico, ancho garnate, pies cortos, uña del dedo medio dentellada en el borde interno, etc. Un hábito tiene propio, cual es el de desplegar su cola de cuando en cuando. Tiene la cabeza y la parte superior del cuerpo de color negruzco, salpicado de manchitas, blancas la mayor parte y algunas de tinta amarilla; la inferior blanca, variegada de negro como el gavilan; sus pies blancos.

Su tamaño es á corta diferencia igual al de la golondrina; tiene muy pequeña la lengua y descubiertas las ventanas de la nariz; su tarso, siete líneas; y dos pulgadas y cuatro líneas su cola, que no excede á las alas.

VARIEDADES DEL IBIJAU.

I.

EL PEQUEÑO PAPAVENTOS MANCHADO DE CAYENA.

Caprimulgus semitorquatus. GMEL.

TIENE muchas conformidades con el ibijaú, ya por su pequeñez, aunque menor, ya por la longitud relativa de sus alas y demas proporciones, como tambien por su plumaje negruzco, manchado de un color mas claro. Pero este es rojo ó gris en todo su plumaje, si se exceptua el cuello, en cuya parte anterior aparece una especie de collar blanco que constituye el carácter distintivo de esta especie, y del cual no habló Maregrave en la descripcion del ibijaú. Tiene tambien la parte inferior del cuerpo mas oscura.

Longitud total, nueve pulgadas y cuatro líneas; pico, diez y siete líneas y media, negro

y con pequeños bigotes; cola, dos pulgadas y once líneas.

II.

EL GRANDE IBIJAÚ.

Es una variedad procedente solo del tamaño, y en verdad que es harto considerable la diferencia bajo este punto de vista.

Es grande como una miloca, y en la abertura de su pico podria meterse el puño: por lo demás, tiene los mismos colores y proporciones. Marcgrave no se toma el trabajo de decirnos que acostumbre desplegar su cola como el pequeño ibijaú, ni que tenga en la parte anterior de la cabeza un cuerno y detrás de él un pequeño moño, como podria persuadirse cualquiera por su estampa; pero sábese ya cuan inexactas son las figuras de Marcgrave, y cuanto más seguro es recurrir el texto. Léese en este que el grande ibijaú no difiere del pequeño más que por el tamaño; por lo que, no dando él á este ni cuerno ni moño, puédese afirmar á mi entender otro tanto de aquel.

Refiérese á esta especie el gran papavientos

de Cayena, ya por su gran tamaño, ya por su plumaje manchado de negro, leonado y blanco, particularmente en el dorso, alas y cola. La parte superior de su cabeza y cuello, así tambien la inferior de su cuerpo, están rayadas trasversalmente de diversas tintas de los referidos colores; pero la tinta general del pecho es mas parda y forma una especie de cinta. Mr. de Sonnini vió uno cuyo plumaje era mas pardo; encontráronle en lo hueco de un árbol corpulento, abrigo ordinario de su especie, aunque prefiere los árboles que crecen cerca del agua. Es á la vez la mayor y mas solitaria entre las aves de este género conocidas en Cayena.

Longitud total, veinte y cuatro pulgadas y media; pico, tres y media de largo y otro tanto de ancho; la mandíbula superior está escotada por ambos lados cerca de la punta; la inferior se encaja entre las dos escotaduras y tiene los bordes vueltos hácia fuera; sus ventanas de la nariz no son salientes, y se ven cubiertas por las plumas de la base del pico que se vuelven hácia delante; tarso, muy cerca de trece líneas, con plumas casi hasta los dedos; uñas, retorcidas, ahuecadas por el lado inferior en forma de canal, dividida en dos por una arista longitudinal; la uña del dedo medio no dentellada; este dedo es muy grande y parece mas ancho de lo que es

en realidad; por una orilla membranosa que tiene á cada lado; cola, diez pulgadas y media, algo cuneiforme, las alas la exceden en algunas líneas.

EL PAPAVENTOS, Ó CHOTACABRAS DE ANTEOJOS, Ó EL HALOR.

Caprimulgus americanus. L.

HASE observado alguna semejanza entre sus ventanas de la nariz que son salientes, y unos anteojos, y de ahí su nombre. Por lo que toca al de *halor*, espresa su grito.

Vive de insectos como los demas de su género, y parécese al guira de Sloane si miramos sus partes internas: encuéntrase como él en la Jamaica y aun mas en la Guayana, y se les ve juntos. Su plumaje está variegado de gris, negro y de color de hoja seca; pero son mas claras sus tintas en la cola y alas; tiene el pico negro, los pies pardos, y la cabeza y garganta pobladas de plumas.

Su longitud, segun Sloane, es de ocho pulgadas y dos líneas; pico pequeño con grande abertura; la mandibula superior algo corva, larga de tres líneas y media (contando sin duda desde el nacimiento de las plumas de la frente), con bigotes negros; tarso con el pie, veinte y una líneas; vuelo, once pulgadas y ocho líneas, siendo de notar, primero, que se han tomado estas medidas con el pie inglés algo mas corto que el francés; segundo, que Brisson señala otras medidas, aunque parece las sacó de la estampa dada por el mismo Sloane, la cual es mucho mayor de lo que supone su texto tomado á la letra; y tercero, que en tal hipótesis, que no carece de verosimilitud, la longitud del ave, fijada por Sloane á ocho pulgadas y dos líneas, parece deber tomarse desde la base del pico al principio de la cola, lo que conformaria las dimensiones de la estampa con las que anuncia su texto. No debo con todo callar que Ray, sin pararse en la estampa dada por Sloane, y sin atender que rara vez se dan semejantes estampas con mayores dimensiones, se atiene en un todo al texto y mira á este papavientos como muy pequeño.

VI.

EL PAPAVIENTOS VARIEGADO DE
CAYENA.*Caprimulgus cayennensis.* GMEL.

TODAS las aves de este género son variegadas, pero esta más que otra alguna. Es la especie mas comun en la isla de Cayena. Encuéntrase en los plantíos, caminos y otros sitios descubiertos. Cuando reposa en el suelo despide un grito débil acompañado siempre de un movimiento de trepidacion en las alas. Este grito se parece al del sapo; y si el del papavientos europeo se le pareciese, fundada hubiera sido su denominacion de sapo-volante. Aun tiene otro grito no muy diferente del ladrido de un perro. Es poco medroso, y solo huye al acercársele mucho; y aun no va muy lejos sin descansar.

Su cabeza está rayada primorosamente de negro en campo gris con algunos matices de rojo, lo mismo que la parte superior del cuello, aunque no con tanta limpieza. A cada lado de su cabeza se ven cinco fajas paralelas rayadas de

negro en campo rojo; la garganta y la parte anterior del cuello son blancas; el dorso rayado transversalmente de negruzco en campo rojo, así como el pecho y vientre, aunque con menos regularidad, y salpicados de algunas manchas blancas; el abdómen y piernas blanquizas con manchas negras; las pequeñas y medias coberteras de las alas variegadas de negro y rojo en términos que el rojo es el color dominante en las pequeñas y el negro en las medias; las grandes tienen el extremo blanco, resultando de ahí una faja trasversal de este color; las pennas de las alas, negras; las cinco primeras, en sus dos tercios ó tres cuartos, marcadas de blanco: las coberteras superiores y las dos pennas intermedias de la cola listadas trasversalmente de negruzco en campo gris mezclado de negro; las pennas laterales negras orladas de blanco, tanto mas cuanto es mas esterna la penna; el iris amarillo, el pico negro, y los pies de un pardo amarillento.

Longitud total, unas ocho pulgadas y nueve líneas; pico, mas de once líneas y media, con bigotes; tarso, muy cerca de seis líneas; cola, cuatro pulgadas y una línea, y escude á las alas en una pulgada y dos líneas.

VII.

EL PAPAVENTOS ACUTIPENNE DE
LA GUAYANA.*Caprimulgus acutus.* GMEL.

DIERE del precedente, no solo por sus dimensiones relativas, sino tambien por la conformacion de las pennas de su cola que son puntiagudas. Algo difiere tambien por sus colores. Tiene la parte superior de la cabeza y cuello rayada transversalmente, aunque con poca limpieza, de negro y rojo pardo; los lados de la cabeza variegados de los mismos colores, siendo sin embargo el rojo el dominante; el dorso rayado de negro en campo gris, y la parte inferior del cuerpo en campo rojo; las alas casi como las del precedente; las pennas de la cola rayadas transversalmente de pardo en campo rojo-pálido y turbio, terminando en negro, precedido de un poco de blanco; el pico y los pies negros.

Dícese que se mezcla alguna vez con los murciélagos, lo que no fuera muy extraño si se considera que salen á unas mismas horas y persi-

guen una misma caza. Probablemente deberá atribuirse á este papavientos lo que dice Mr. de La Borde de una pequeña especie de la Guayana que pone, como las palomas silvestres, las tórtolas, etc., en los meses de octubre y noviembre, es decir, dos ó tres meses antes de las lluvias. Es sabido que la estacion de las lluvias, que empieza en la Guayana hácia el 15 de diciembre, es allí mismo la de la cria para la mayor parte de las aves.

Longitud total, unas ocho pulgadas y nueve líneas; pico, ochó líneas; cola, tres pulgadas y media, compuesta de diez pennas iguales, y las alas la esceden en algunas líneas.

VIII.

EL PAPAVENTOS GRIS.

Caprimulgus griseus. GMEL.

VI en el gabinete de Mr. Mauduit un papavientos de Cayena mucho mayor que el precedente. Tenia tambien mas gris en el plumaje, eran algo diversas sus proporciones, y no te-

nia afiladas las pennas de la cola. Por lo que mira á los colores, diferenciábase del otro en tener menos negras las pennas de las alas, que se veian rayadas trasversalmente de gris claro; las de la cola rayadas de pardo en campo gris variegado tambien de pardo, sin ninguna mancha blanca ni en unas ni en otras; el pico pardo en la parte superior, y amarillento en la inferior.

Longitud total, quince pulgadas y dos líneas; pico, poco mas de veinte y tres líneas; cola, seis pulgadas y una línea, y escede algo á las alas.

IX.

EL MONVOYÓ DE LA GUAYANA.

Caprimulgus guianensis. GMEL.

Monvoyó es su grito, cuyas tres sílabas pronuncia distintamente y repite con bastante frecuencia por las tardes desde los zarzales: no debe pues estrañarse que sea este su nombre. Parece á nuestro papavientos por la mancha blanca que tiene en las cinco ó seis primeras

pennas del ala, cuyo campo es negro, asi como por otra mancha ó faja blanca que sale del ángulo de la abertura del pico, prolóngase hácia atrás, y estiéndose, lo que no puede ser en la especie europea, hasta debajo la garganta. Tiene en general mas leonado y rojo en el plumaje, casi todo variegado de estos dos colores; empero toman diferentes tintas y se ven diversamente dispuestas, ya por rayas trasversales en la parte inferior del cuerpo y pennas medias de las alas, ya por fajas longitudinales en la superior de la cabeza y cuello, ya por oblicuas en lo alto del dorso, ya en fin por manchas irregulares en lo restante de la superior del cuerpo, donde adquiere el leonado una mezcla de gris.

Longitud total, diez pulgadas y media; pico, once líneas, ceñido de bigotes; tarso, desnudo; uña del dedo medio, dentellada en el borde esterno; cola, tres pulgadas y media, y escede á las alas en una pulgada y dos líneas.

X.

EL PAPAVENTOS RUBIO DE CAYENA.

Caprimulgus rufus. GMEL.

Un rojo con mezcla de negruzco compone casi todo el campo de su plumaje, y un negro mas ó menos subido constituye todo su adorno. Corre este negro por listas longitudinales, oblicuas é irregulares en la cabeza y la parte superior del cuerpo; forma en la garganta un rayado trasversal, primoroso y regular, algo mas ancho en la parte anterior del cuello y en la inferior del cuerpo, como igualmente en las piernas, aun mas sobre las coberteras superiores y borde interno de las alas, cerca de su estremidad, y mucho mas, en fin, en las penas de la cola. Todo su cuerpo está punteado sin uniformidad de algunas manchas blancas. En general, domina el negruzco en la parte superior del vientre, y el rojo en la inferior del mismo, y aun mas en las coberteras inferiores de

la cola. La parte media de las grandes pennas de las alas presenta un conjunto de pequeños cuadros alternativamente rojos y negros, que casi ofrecen la regularidad de las casillas de un tablero; el iris amarillo; el pico pardo-claro, y los pies de color de herrumbre.

Longitud total, doce pulgadas y tres líneas; pico, veinte y cuatro líneas y media; cola, cuatro pulgadas y algo mas de cinco líneas, y escede á las alas en siete líneas.

Ví en el gabinete de Mr. Mauduit un papavientos de la Lusiana que tenia el tamaño de este y se le parecia mucho; solamente las rayas trasversales estaban mas espaciadas en el cuello, y el rojo era allí mas claro, de suerte que figuraba una especie de collar; lo restante de la parte inferior de su cuerpo estaba rayado como en el precedente; tenia el pico negro en la punta y amarillento en la base.

Longitud total, doce pulgadas y diez líneas; pico, dos pulgadas y cuatro líneas, con ocho ó diez bigotes recios vueltos hácia delante; cola, cinco pulgadas y diez líneas, escediendo muy poco á las alas.