

## PAJAROS

DEL NUEVO CONTINENTE

QUE TIENEN RELACION CON EL PICO VERDE.

## EL PICO RAYADO DE SANTO DOMINGO.

PRIMERA ESPECIE.

*Picus striatus*. LATH.

BRISSON le describe dos veces, primero bajo el nombre de *pico rayado de Santo Domingo*, y en seguida bajo el de *pequeño pico rayado de Santo Domingo*, diciendo ser mas pequeño á pesar de ser igual el pormenor de las dimensiones que da, y dividiéndolos en dos diferentes especies, sin embargo de observar que el segundo podria muy bien ser la hembra del primero. Basta empero mirar las estampas iluminadas,

para convencerse de que las variedades que se figuran solo muestran diferencias que pueden provenir de la edad ó del sexo. En el primero, la parte superior de la cabeza es negra, parda la garganta, mas clara la tinta aceitunada de su cuerpo, y menos anchas las rayas negras del dorso, que no en el segundo, el cual tiene roja la parte superior de su cabeza, y bastante pálida la anterior del cuerpo, con la garganta blanca. Por lo demás, seméjanse los dos perfectamente por la forma y plumaje.

Es del tamaño de nuestro pico variegado; todo su manto se ve trasversalmente cortado por fajas negras y aceitunadas; nótese una tinta verde sobre el gris del vientre, y mas aun en el obispillo, cuya estremidad es roja; la cola es negra.

## EL PEQUEÑO PICO ACEITUNADO DE SANTO DOMINGO.

SEGUNDA ESPECIE.

*Picus passerinus*. LATH.

ESTE pequeño pico tiene siete pulgadas de longitud, y es á corta diferencia del tamaño de



una alondra. Tiene la parte superior de la cabeza roja, y costados gris-rojizos. Todo su manto es aceitunado-amarillento; la inferior del cuerpo está rayada trasversalmente de pardo y blanquizco; las remeras, aceitunadas como el dorso por lo exterior, pues son pardas por lo interior y dentelladas de manchas blanquizcas que entran bastante, por cuyo carácter se asemeja mas aun al pico verde; las plumas de la cola son de un gris mezclado de pardo. Sin embargo de su pequeñez, es ese pico de los mas valientes y horada durísimos árboles. De él habla esta noticia estraida de la *Historia de los aventureros forbantes ó sibustieres*. «El carpintero es un pájaro no mayor que una alondra; tiene el pico largo, de una pulgada y dos líneas, y tan recio que horada en un día un palmista hasta el corazon. Es de advertir que es tan dura la madera del palmista, que no pueden con ella los mejores instrumentos de hierro.»

EL GRAN PICO RAYADO DE CAYENA.

TERCERA ESPECIE.

*Picus melanochlorus*. GMEL.

No dudamos ser este pico el mismo que el *variegado moñudo de América*, incompletamente descrito por Brisson en vista de un pasaje de Gessner. Su moño es de un dorado leonado, ó mejor de un rojo aurora; su mancha de color de púrpura en el ángulo del pico y plumas negras y amarillas de que se ve alternativamente variegado todo su cuerpo, son suficientes caracteres para reconocerle; su tamaño, que es el del pico verde, conviene tambien á ese gran pico rayado de Cayena. Vese ricamente esmaltado su plumaje por el leonado amarillento y el bello negro, entreverados en undulaciones, manchas y festones; un claro blanco en que brilla el ojo, y un tupé negro en la frente, caracterizan su fisonomía, á la cual parecen dar mayor realce su moño rojo y purpurino bigote.



EL PEQUEÑO PICO RAYADO DE  
CAYENA.

CUARTA ESPECIE.

*Picus cayennensis.* GMEL.

MUCHOS de entre los picos rayados que describe Brisson despues del variegado pertenecen ciertamente al pico. Mas que en ningun otro, aparece esto en los picos rayados de Santo Domingo y de Cayena que acabamos de describir, como tambien en este. Muestran en efecto los tres una sombra mas ó menos oscura del verde amarillento que caracteriza al pico verde; y las undulosas rayas que se estienden por su plumaje parecen prolongadas segun el modelo de aquellas que se notan en las alas de este.

El pequeño pico rayado de Cayena es de ocho pulgadas y ocho líneas de longitud; sus colores tienen mucha relacion con los del pico rayado de Santo Domingo; pero es menor que él. Estiéndense undulosas fajas negras sobre el campo gris-pardo aceitunado de su plumaje; el gris dentellado de negro cubre aun en sus dos ori-

llas las dos plumas esternas de la cola; las seis restantes, negras; colodrillo, rojo; frente y garganta, negras; únicamente es cortado ese negro por una mancha blanca trazada debajo del ojo y prolongada hácia atrás.

EL PICO AMARILLO DE CAYENA.

QUINTA ESPECIE.

*Picus flavicans.* LATH.

VENSE multiplicadas en las inmensas selvas del nuevo Mundo aquellas especies de pájaros que buscan la soledad y solo pueden vivir en los desiertos, por cuanto aun no tomó el hombre entera posesion de esos antiguos dominios de la naturaleza. Contamos en nuestro poder hasta diez especies de picos procedentes de los bosques de la Guayana, y los amarillos parecen tambien propios y particulares de aquella region. La mayor parte de estas especies son poco conocidas de los naturalistas, y solo Barrera indicó algunas. El primero de estos picos, que describió Brisson bajo el nombre de *pico blanco*, tiene el plumaje de su cuerpo de color amarillo



fresco; es negra su cola; amarillas sus grandes remeras, y rubias y no negras las medias, como por descuido se figuraron en la estampa iluminada; las coberteras de las alas, de un gris pardo y franjeadas de blanco amarillento. El moño de su cabeza empieza ya sobre el cuello; y con el amarillo pálido que le adorna, igualmente que á la cabeza, resalta vivamente el rojo de sus bigotes. Estos dos pinceles rojos con su bello copepe le dan notable fisonomía; y lo agradable de sus colores le constituye en su género un pájaro hermosísimo. Los criollos de Cayena le llaman el *carpintero amarillo*. Es menor que nuestro pico verde, y menos grueso sobre todo; su longitud es de diez pulgadas y media. Construye su nido en los árboles corpulentos cuyo corazon es carcomido, y eso despues de horadarlos horizontalmente hasta dar con la cavidad, continuando su escavacion bajando hasta un pie y nueve pulgadas de la abertura. En el fondo de tan oscura cueva pone la hembra tres huevos blancos y casi redondos. Nacen los pollos á principios de abril. Ayuda el macho á la hembra en sus afanes; y en ausencia de ella no deja un instante la embocadura de su horizontal galería. Su grito es un chiflido en seis tiempos, siendo monótonos sus primeros acentos, y mas graves los dos ó tres últimos. No brilla en

los lados de la cabeza de la hembra esa faja de rojo vivo que adorna al macho.

Encuétrase en esta especie una variedad cuyos individuos tienen teñidas de un bello amarillo las pequeñas coberteras de las alas, y orladas tambien las grandes por el mismo color. En algunos otros individuos, tales al parecer como el descrito por Brisson, no ofrecen su descolorido plumaje y débil tinta mas que un blanco sucio y amarillento.

---

### EL PICO ROJIZO.

SIXTA ESPECIE.

*Picus cinnamoneus*. LATH.

UN rojo vivísimo, brillante y dorado le da un soberbio plumaje. Es casi del tamaño del pico verde, aunque menos robusto; un moño largo y amarillo cubre su cabeza con plumas adelgazadas y pendientes, que se dejan caer hácia atrás. De los ángulos de su pico salen dos bigotes bien dirigidos entre el ojo y la garganta, siendo su color un bello rojo claro; algunas gotas blancas y cetrinas varían y hacen



mas vistoso el campo rojo de la mitad de su manto; obispillo amarillo, y cola negra. En esta especie, como en la del pico amarillo de las mismas comarcas, no tiene la hembra nada de rojo en los carrillos. Un individuo remitido de Cayena y colocado en el Gabinete Real con el nombre de *pico rojo manchado de Cayena* nos parece ser la hembra.

### EL PICO DE CORBATA NEGRA.

#### SÉPTIMA ESPECIE.

*Picus multicolor.* GMEL.

ESTE es otro de esos carpinteros amarillos así llamados por los criollos de Cayena. Vistele bella coraza negra, que le coge el cuello por atrás, y le cubre la parte anterior como una corbata, cayéndole sobre el pecho. Lo restante de la parte inferior del cuerpo es de un leonado rojizo, como también la garganta con toda la cabeza, cuyo moño empieza ya en el cuello; el dorso es de un rojo vivo; alas, del mismo color, aunque entreverado en las pennas por rasgos

negros bastante distantes entre sí; estiéndense algunos de ellos hasta la cola, cuya punta es negra y la cual figura algo corta la estampa iluminada. Su tamaño es el del pico amarillo y aun el del pico rojizo de sus comarcas; los tres son igualmente delgados y moñudos, de suerte que tienen al parecer entre sí grande afinidad. Los naturales de la Guayana les dan en lengua garipona el nombre común de *tucumari*. Parece que todos son incansables como los demás picos, y que se encuentran también en Santo Domingo; asegurando el P. Charlevoix que con frecuencia son inservibles, á causa de verse acribilladas por los agujeros de esos carpinteros salvajes, muchas maderas que se emplean en los edificios.

### EL PICO RUBIO.

#### OCTAVA ESPECIE.

*Picus rufus.* GMEL.

ENCUENTRASE una singularidad en el plumaje de ese pequeño pico, y es que la tinta de la parte inferior de su cuerpo es mas viva que la de la superior, cosa que no sucede en ningun



otro pájaro. Un rubio mas ó menos claro ó subido compone todo el fondo; es mas oscuro sobre las alas, mas claro en el obispillo y dorso, mas cargado en el pecho y vientre, y mezclado en todo el cuerpo de ondas negras y cerradas que figuran bellissimo esmalte. Su cabeza es de un rubio mas claro, y se ve entreverada de onditas negras. Encuéntrase en Cayena y no es mayor, aunque mas grueso, que un torcecuello. Su plumaje, aunque compuesto de dos tintas oscuras, es sin embargo de los mas bellos, y agradablemente variegado.

### EL PEQUEÑO PICO DE GARGANTA AMARILLA.

NONA ESPECIE.

*Picus icterocephalus.* GMEL.

TAMPOCO es este mayor que el torcecuello. El fondo de su plumaje es pardo con tinta acitunada y con pequeñas manchas blancas en figura de escamas en la parte anterior de su cuerpo hasta la garganta, ceñida de un bello amarillo, que pasa por debajo del ojo y sobre el cuello. Cubre la parte superior de su cabeza un cas-

quete rojo; y un bigote de color mas débil sale de los ángulos del pico. Encuéntrase, como los precedentes, en la Guayana.

### EL PICO PEQUEÑITO DE CAYENA.

DÉCIMA ESPECIE.

*Yunx minutissima.* CUV.

PEQUEÑO como nuestro reyezuelo, es este pájaro el enano de la numerosa familia de los picos. No es un trepador, mas sí un verdadero carpintero con pico recto y cuadrado. Su cuello y pecho están distintamente variegados de fajitas blancas y negras; el dorso es pardo y salpicado de gotas blancas sombreadas de negro; esas mismas manchas, mas finas y cerradas sobre el bello negro que cubre la parte superior de su cuello, y una pequeña cabeza en fin dorada como la del reyezuelo, le constituyen un bellissimo pájaro. No es puro todo el blanco de su plumaje, y sí sombreado de un amarillo mas notable en la cola y en el pardo del dorso y alas. Es mas ligero y alegre que los demas picos si hemos de juzgar por su pellejo; parece que la naturaleza le ha indemnizado de su pequeñez



dándole mas vivacidad, ligereza y los demas recursos que presta á todo sér débil. Se junta con los trepadores, y como ellos trepa por el tronco de los árboles colgándose de las ramas.

### EL PICO DE ALAS DORADAS.

#### UNDÉCIMA ESPECIE.

*Picus auratus.* GMEL.

COLOCANDO este bello pájaro despues de la familia del pico verde, notaremos ante todo que parece alejarse y salir del género de los picos por sus hábitos, como tambien por algunos rasgos de conformacion. En efecto, Catesby que le observó en la Carolina, dice que descansa casi siempre en el suelo, ni trepa por los troncos de los árboles, sino que posa en sus ramas como los demas pájaros. Tiene con todo dos dedos hácia delante y dos hácia atrás como los picos, ásperas como ellos y tiesas las plumas de la cola, aunque por una singularidad solo á él propia, la orilla de cada cual remata en dos pequeños filamentos. Aléjase, con todo, su pico de la ordinaria forma de los carpinteros; no es cuadrado, mas redondo y algo arqueado, no rematando en

cincel ni en punta. Parece pues que si su especie entra en el género de los picos por sus pies y cola, apártase de él sin embargo por la configuracion de su pico y por sus hábitos naturales necesariamente diferentes, como que dependen de la diversa configuracion de aquel órgano.

Forma al parecer una especie media entre el pico negro y el cuclillo, con el cual le juntaron los naturalistas; y nos ofrecerá otro ejemplo de las gradaciones que mezcló la naturaleza en todas sus obras. Ese pico semi-cuclillo es casi del tamaño del pico verde, y son de notar su bella figura y la vistosa y elegante disposicion de sus colores. Unas manchas negras en figura de corazón y media luna aparecen en el estómago y vientre en campo blanco sombreado de rubio; la parte anterior del cuello es de un ceniciento vinoso ó color de lila; en medio del pecho vese una ancha faja negra figurando una media luna; obispillo, blanco; cola, negra en el lado superior, y en la inferiorde un bello amarillo de hoja seca; la parte superior de la cabeza, con lo mas alto del cuello, de un gris aplomado; compone el colodrillo una bella mancha de escarlata; brotan de los ángulos del pico en el macho únicamente dos grandes bigotes negros que bajan por los lados del cuello; su dorso está salpicado de negruzco en campo pardo; igual



color muestran las grandes remeras, mas las realza y bastaria solo para distinguir este pájaro el ver adornadas sus orillas con un vivo color de oro. Encuéntrase en el Canadá y en la Virginia, así como tambien en la Carolina.

.....

### EL PICO NEGRO (1).

*Picus martius.* GMEL.

ESTA es la segunda especie de picos que se encuentra en Europa, pareciendo confinada á particulares comarcas y á la Alemania especialmente. Los Griegos conocian con todo, lo mismo que nosotros, tres especies de picos, como los indica Aristóteles. La una, dice, es menor que el mirlo, será el pico variegado; otro, mayor que el mirlo, y le llama *colios*, y este es nuestro pico verde; el tercero en fin, que dice ser poco menor que una gallina, lo que como se notó debe entenderse de su longitud y no del volúmen de su cuerpo, y será este sin duda nuestro pico negro, el mayor entre todos los picos del an-

(1) En italiano, *picchio-sgiaia*; en inglés, *great black wood-pecker*; en aleman, *koltz-krae*, *krae-specht*, etc.

tigo continente. Tiene diez y ocho pulgadas y ocho líneas de longitud desde la punta del pico hasta la estremidad de la cola; su pico, largo de dos pulgadas y once líneas, es de color de hasta; un casquete de luciente rojo cubre la parte superior de su cabeza; el negro reina en el plumaje de todo su cuerpo. Los nombres de *pico corneja*, *corneja de bosque* (*krae specht*, *holtz krae*) que le dan los Alemanes, señalan á un tiempo su color y su tamaño.

Se le encuentra en los bosques, en las montañas de Alemania, en Suiza y en los Vosges. No es conocido en la mayor parte de las provincias de Francia, y no sale nunca de los países montañosos. Willughby nos asegura no encontrarsele en Inglaterra. Ese pájaro de las selvas debe haber abandonado sin duda una comarca harto descubierta y de pocos bosques, siendo esta la causa de haber huído de Inglaterra como huyera de Holanda, donde se dice no verse ninguno. Ello es que se encuentra en climas mas septentrionales, y aun en Suecia; y no podemos atinar porque habitaria la Italia, donde dice Aldrovando que no le vió jamás.

En unas mismas comarcas prefiere los sitios mas solitarios y agrestes. Da noticia Frisch de una selva de Franconia, famosa por los muchos



picos que la habitan (1). No son tan comunes en lo restante de Alemania. En general parece poco numerosa la especie, de modo que es raro encontrar mas de una pareja en la estension de media legua. Permanecen en un círculo que no abandonan un momento y donde es seguro encontrarles.

Da contra los árboles tan enormes picotazos, que segun Frisch resuenan á lo lejos como golpes de hacha. Ahuécalos profundamente para anidar en su corazon, donde se coloca á sus anchas. Vese con frecuencia al pie de un árbol, bajo de su nido, casi una fanega de polvo y pequeñas virutas. Ahueca y escava alguna vez lo interior de los árboles en términos, que pronto los rompe el viento: seria pues dañosa para las selvas su multiplicacion. Prefiere los árboles carcomidos, pero á pesar de esto son muy perseguidos por los guardabosques, pues no deja de horadar tambien muchos árboles sanos. Mr. Deslandes, en su *Ensayo sobre la marina de los antiguos*, quéjase porque se encontraban pocos árboles propios para remos de cuarenta y seis pies de largo sin verse horadados por los picos (2).

(1) La selva de Spessert.

(2) Mas se engaña mucho Mr. Deslandes en el mismo paraje, cuando dice que se sirve el pico de

Este pico pone en el fondo de su agujero dos ó tres huevos blancos como los de todos los demas picos, insiguiendo á Willughby. Descansa rara vez en tierra; y segun los antiguos, nunca. Cuando trepan por los árboles, su largo dedo posterior mira ya á los lados ya hácia delante; es móvil en su articulacion con el pie, y puede prestarse á todas las posiciones necesarias al punto de apoyo ó favorables al equilibrio. Es comun á todos los picos esta facultad.

Quando horadó el pico negro su agujero y se abrió la entrada del hueco de algun árbol, da entonces un grito, ó mejor un agudo y prolongado chillido, que resuena á lo lejos; despide tambien por intervalos un crujido ó como un frotamiento que hace con su pico dando ó rozando rápidamente contra las paredes de su agujero.

Difiere del macho la hembra por su color negro menos sombrío, y por no tener rojo mas que el colodrillo, y aun alguna vez nada. Obsérvase que baja mas el rojo sobre la nuca del cuello en algunos individuos, y estos son los machos viejos. Desaparece durante el invierno. Agrícola es de sentir que permanece oculto en los agujeros de los árboles; mas segun Frisch la lengua como de barrena para horadar los mas fuertes árboles.



huye la estacion rigurosa, durante la cual le es negada toda subsistencia; porque, dice, penetran entonces en lo mas interior los gusanos de la madera, quedando al propio tiempo los hormigueros sepultados bajo el hielo y la nieve.

No conocemos ningun pájaro en Asia ni Africa ni en todo el antiguo continente que tenga relacion con el pico negro de Europa; y parece que haya procedido del nuevo Mundo, donde se encuentran muchísimas especies que atañen casi inmediatamente á esta. La enumeracion de estas especies es como sigue.

## PAJAROS

DEL NUEVO CONTINENTE

QUE TIENEN RELACION CON EL PICO NEGRO.

### EL CARPINTERO ó GRAN PICO NEGRO.

PRIMERA ESPECIE.

*Picus principalis.* GMEL.

ENCUÉNTRASE en la Carolina y es mayor que el de Europa, y aun que todos los de su género: iguala ó escede á la corneja (1). Su pico, de un blanco de marfil, tiene tres pulgadas y media de largo, y vese estriado en toda su longitud. Es cortante y tan recio, dice Catesby, que en

(1) Brisson debió medir, segun visos, uno muy pequeño, no dándole mas que diez y ocho pulgadas y ocho líneas: el del Gabinete Real, figurado en las estampas iluminadas, tiene veinte y una pulgadas.



una ó dos horas corta con él el pájaro como una fanega de virutas : por eso le llaman los Españoles carpintero.

Vese adornada su cabeza en la parte posterior por un gran moño de color de grana , dividido como en dos copetes , alzado el uno y caido el otro sobre el cuello. El primero de los dos se ve cubierto por largos filetes negros , que salen del vértice de la cabeza cubriéndola enteramente ; pues las plumas de color de grana arrancan de la parte posterior. Una raya blanca que baja del lado del cuello y forma un ángulo sobre el dorso , va á unirse al blanco que cubre la inferior del dorso y las remeras medias. Lo restante de su plumaje es de un negro puro.

Ahueca su nido en robustísimos árboles , y hace su cria por la estacion de las lluvias. Encuéntrase en los climas mas cálidos aun que el de la Carolina , pues no podemos menos de reconocerle en el *picus imbrifætus* de Nieremberg , y en el *quatatomomi* de Fernandez , aunque mal designado por estos autores por lo que hace á su tamaño , y á pesar de algunas diferencias que indican al parecer una variedad de especie. Caracterízala sin embargo lo bastante su blanco pico , largo de tres pulgadas y media. Habita , dice Fernandez , las playas mas cercanas al mar del Sur. Los Americanos de las comarcas sep-

tentrionales hacen de los picos del carpintero coronas para sus guerreros ; y como no se encuentra este pájaro en su pais , lo compran á los habitantes del Sur , y dan hasta tres pieles de corzo por un pico de carpintero.

## EL PICO NEGRO DE MOÑO BERMEJO.

SEGUNDA ESPECIE.

*Picus pileatus.* LATH.

BASTANTE comun en la Luisiana , encuéntrase igualmente en la Carolina y en la Virginia. Parécese mucho al anterior , pero no tiene blanco el pico , y es menor , aunque en verdad algo mayor que el pico negro de Europa. El vértice de su cabeza hasta los ojos se ve adornado por un gran moño de color de grana , formando un solo copete caido atrás en figura de llama. Debajo de él reina una faja negra , en que está sentado el ojo. Sale de la raiz del pico un bigote bermejo que resalta sobre los negros lados de la cabeza ; garganta , blanca ; una fajita del mismo color entre el ojo y el bigote , que se estiende so-



bre el cuello hasta los brazos; lo restante del cuerpo, negro con leves señales de blanco en el ala, y una gran mancha del mismo color en medio del dorso. En la parte inferior del cuerpo es menos sombrío el negro, y se ve mezclado de ondas grises. En la hembra es parda la parte anterior de la cabeza, y solo se ven plumas bermejas en la posterior.

Segun Catesby, no contentos esos pájaros con los insectos que estraen de los árboles apollillados en que anidan ordinariamente, persiguen aun los maizales destruyendo muchísimos, porque la humedad que penetra por los agujeros que hacen en la cubierta echa á perder el grano que contiene. Sin embargo, podría muy bien creerse que solo persiguen el maiz yendo en busca de alguna especie de gusanos que en su cubierta se ocultan; pues ningún pájaro de este género se alimenta de granos.

A ninguna otra especie mejor que á esta podemos referir un pico de que nos dió noticia Commerson, quien le encontró en las tierras Magallánicas. Es igual su tamaño, y muy parecidos sus demas caracteres; solo que este no presenta color bermejo sino en lo carrillos y parte anterior de la cabeza, y en su colodrillo aparece un moño de plumas negras. De esto resulta que se encuentra una especie igual ó muy pare-

cida en las latitudes correspondientes á las dos estremidades del gran continente de América. Nota Commerson que tenia este pájaro muy fuerte voz y dura vida, propio de todos los picos robustecidos por su trabajosa existencia.

### EL UANTÚ, ó PICO NEGRO MOÑUDO DE CAYENA.

TERCERA ESPECIE.

*Picus lineatus.* GMEL.

BARRERA da á este pájaro la pronunciacion errónea de *vantú*, pues los Americanos le llaman *uantu*. Comparándole con el *hipecú* de Marcgrave, tendrémolugar de rectificar dos descuidos de nuestros nomencladores. Tiene la longitud del pico verde, sin ser tan grueso su cuerpo. Es enteramente negro en la parte superior, quitando una línea blanca que sale de la mandíbula superior, va bajando á modo de faja sobre el cuello, y deja algunas plumas blancas en las coberteras del ala. El estómago y vientre están entreverados de fajas negras y grises; la garganta está ondeada de parduzco; sale un bigote bermejo de la mandíbula inferior del pico; cu-



bre su cabeza cayendo hácia atrás un bello moño del mismo color, bajo cuyos largos filamentos se perciben pequeñas plumas tambien bermejas, que adornan lo alto del cuello.

Barrera junta este pico con el hipecú de Marcgrave con mayor fundamento que Brisson lo refiere al gran pico de la Carolina de Catesby. Este es mayor que una corneja, cuando el hipecú no es mayor que un palomo. Por otra parte, la descripción de Marcgrave se adapta tanto al uantú como se aparta del gran pico de la Carolina, en el cual no aparece variegada de blanco y negro la parte inferior del cuerpo como en el uantú é hipecú, cuyo pico es además largo de tres pulgadas y media, y no de siete líneas. Estos caracteres, sin embargo, no convienen en mayor grado al pico negro de la Luisiana; y parece que Brisson se ha engañado otra vez uniendo á esta especie el uantú, el cual, como hemos visto, no es otra cosa que el hipecú; y hubiera obrado mas acertadamente si le colocara en su undécima especie, á la que convienen los caracteres del hipecú como los del uantú.

El uantú de Cayena es igualmente el *tlauhguichultototl* de nueva España de Fernandez. Reconocimosle por un rasgo singular: «Es, dice Fernandez, un pico que horada los árboles. Apa-

recen plumas bermejas en su cabeza y parte superior del cuello. Aplicadas, ó por mejor decir, pegadas sus plumas, segun es fama, á la cabeza de un enfermo, mitigan el dolor, ya sea ello probado por esperiencia, ya se haya imaginado viéndolas pegadas á la cabeza del pájaro.» Es á este, entre todos los picos, á quien mas conviene tal carácter de tener como pegadas contra la piel las bermejas plumitas que adornan su colodrillo y la parte superior del cuello.



