

GARZAS

DEL NUEVO CONTINENTE.

LA GRAN GARZOTA.

PRIMERA ESPECIE.

Ardea egretta. L.

Todas las especies precedentes de garzas son del antiguo continente; todas las que siguen pertenecen al nuevo: estas son muy numerosas en individuos en aquellas regiones donde las aguas que no tienen dique se derraman por vastos espacios, y donde todas las tierras bajas están anegadas. La gran garzota es sin contradicción la mas hermosa de estas especies, y no se encuentra en Europa; pero se parece á nuestra garzota en el hermoso blanco de su plumaje, sin mezcla de ningun otro color; es el doble mayor que ella, y por lo mismo su magnífico adorno de plumas finas es otro tanto mas rico y volu-

minoso; tiene tambien, como la garzota de Europa, el pico y los pies negros. Esta ave anida en Cayena en los islotes que se encuentran en las grandes sábanas anegadas; no frecuenta las orillas del mar ni las aguas salobres, sino que permanece habitualmente al lado de las aguas estancadas y de los rios, donde busca un abrigo entre los juncos. Su especie es bastante comun en la Guayana, pero estas grandes y hermosas aves no van en bandadas como las pequeñas garzotas; son tambien mas ariscas, se dejan acercar menos, y se posan rara vez. Véselas igualmente en Santo Domingo, donde en la época de la sequía frecuentan las lagunas y los estanques; y en fin, parece que esta especie no está confinada á los climas mas cálidos de América, pues hemos recibido algunos individuos que nos fueron remitidos de la Luisiana.

LA GARZOTA RUBIA.

SEGUNDA ESPECIE.

Ardea rufescens. L.

Esta garzota tiene el cuerpo de color gris negruzco, y los penachos del dorso y las plu-

mas adelgazadas del cuello de un rojo de herumbre. Encuéntrase en la Luisiana, y su longitud es de unos dos pies y cuatro pulgadas.

LA SEMI-GARZOTA.

TERCERA ESPECIE.

Ardea leucogaster. L.

DAMOS este nombre á la garza azulada de vientre blanco de Cayena de las estampas iluminadas, para designar un carácter que parece formar el tránsito entre las garzotas y las garzas. En efecto, esta no tiene como las garzotas el penacho del dorso tan estendido ni espeso, sino solo un hacecillo de hebras adelgazadas, mas largo que la cola, y que representa en pequeño los hacecillos de la de la garzota; y estas hebras, de que carecen las demas garzas, son de color rubio. La longitud de esta ave no llega á dos pies y cuatro pulgadas; la parte superior del cuerpo, el cuello y la cabeza son de color azulado subido, y la inferior del cuerpo es blanca.

EL SOCO.

CUARTA ESPECIE.

Ardea cocoi. L. GMEL.

La palabra *soco* que, segun Pison, es el nombre genérico que llevan las garzas en el Brasil, es el mismo que aplicamos á esta grande y hermosa especie, de la que hace Marcgrave su segunda garza; y encuéntrase igualmente en la Guayana y en las Antillas, lo mismo que en el Brasil. Esta ave es igual en tamaño á nuestra garza gris; es moñuda, y las plumas finas y caídas que forman su moño, y entre las que hay algunas que tienen hasta siete pulgadas de largo, son de un bonito color ceniciento; pero segun du Tertre, solo los machos viejos tienen este ramillete de plumas. Las que penden por la parte inferior del cuello son blancas, delicadas, suaves y flexibles; por lo que sirven tambien para penachos: y las de los brazos y del manto son de un gris-ceniciento apizarrado. Al paso que Pison observa que esta ave está por lo comun bastante flaca, asegura no obstante que

engorda en la estacion de las lluvias. Du Ter-
tre, que la llama *cangrejero* segun el uso de las
islas donde se da este nombre á las garzas, dice
que no es tan comun como las otras, però que
su carne es tan buena, esto es, que no es peor.

LA GARZA BLANCA DE CAS-
QUETE NEGRO.

QUINTA ESPECIE.

Ardea egretoides. L. *Ardea alba* (var., &c.) Gmel.

Esta garza, que se encuentra en Cayena,
tiene todo el plumaje blanco, á escepcion de
un casquete negro sobre el vértice de la cabeza,
donde se ve un penacho de cinco ó seis hebras
blancas. No tiene mas allá de dos pies y cuatro
pulgadas de longitud; habita en la Guayana en
la parte superior de los rios, y no deja de ser
bastante rara. Juntaremos esta ave con la garza
blanca del Brasil, pues la diferencia de tamaño
puede no ser mas que una diferencia individual,
así como la placa negra y el moño, que quizás
no pertenecen mas que al macho y forman su
atributo distintivo, como hemos ya observado

en cuanto al moño en la mayor parte de las
otras especies de garzas.

LA GARZA PARDA (*).

SEXTA ESPECIE.

ESTA ave es mayor que la precedente, y natu-
ral asimismo de la Guayana. Toda la parte
superior de su cuerpo es de color pardo-ne-
gruzco; pero esta tinta es mas subida sobre la
cabeza, y parece sombreada de azulado sobre
las alas; la parte anterior del cuello es blanca,
salpicada de manchas á modo de pincelitos par-
duzcos; y la parte inferior del cuerpo es de co-
lor blanco puro.

(*) Este es un individuo jóven de una especie de
ardea no conocida. (A. R.)

LA GARZA AGAMÍ.

SÉPTIMA ESPECIE.

Ardea agami. L.

IGNORAMOS cual puede ser la analogía del nombre de *garza agami*, con el cual nos enviaron de Cayena esta especie, á no ser por la relacion que tienen las largas plumas que cubren la cola del agami y que sobresalen á las penas, con las largas plumas caídas que cubren y esceden del mismo modo la cola de esta garza, en lo cual tiene relacion con las garzotas. Estas plumas son de un azul claro, y las de las alas y dorso de color azul subido; la parte inferior del cuerpo es roja, y el cuello es de este mismo color por delante, pero azulado en la parte inferior, y de un azul subido en la superior; la cabeza es negra, con el colodrillo azulado, del cual penden unas largas hebras negras.

EL HOCTI.

OCTAVA ESPECIE.

Ardea hoactli. GMEL.

NIEREMBERG interpreta el nombre mejicano de esta ave *hoactli* ó *toloactli*, por *avis sicca*, ave seca ó flaca; lo que conviene perfectamente á una garza. Esta ave es de la mitad del tamaño de la garza comun. Su cabeza está cubierta de plumas negras que se prolongan sobre la nuca en forma de penacho; la parte superior de las alas y cola son de color gris; tiene sobre el dorso algunas plumas de un negro con lustre verde, y todo lo restante del plumaje es blanco. La hembra lleva nombre diferente del macho (*hoacton fœmina*); y en efecto, difiere de él por algunos colores del plumaje, que es pardo sobre el cuerpo, mezclado de algunas plumas blancas, y el cuello blanco mezclado de plumas pardas.

Encuentrase esta ave en el lago de Méjico, anida entre los juncos, y tiene la voz fuerte y grave: circunstancias que la acercan al esparavan. Los Españoles le dan impropriamente el

nombre *martinete pescador*, pues es muy diferente de la arvela.

EL HOHÚ.

NONA ESPECIE.

Ardea hohu. GMEL.

HEMOS formado el nombre de esta ave por contraccion de la palabra *xoxuqui-hoactli*, que se pronuncia *hohuquihoactli*, con tanta mas razon quanto que su grito es *hohu*. Fernandez, que es quien nos da esta indicacion, añade que es una garza de especie bastante pequeña: no obstante, tiene dos codos de longitud. El vientre y cuello son cenicientos, y la frente blanca y negra; el vértice de la cabeza y la garzota que tiene en el colodrillo son de color purpúreo, y las alas variegadas de gris y de azulado. Esta garza es bastante rara; suele vérsela de cuando en cuando en el lago de Méjico, yendo allí segun parece de regiones mas septentrionales.

LA GARZA REAL DE AMÉRICA.

DÉCIMA ESPECIE.

Ardea herodias. L.

TODAS las especies mayores, así como las mas numerosas, en el género de las aves de pantanos pertenecen al nuevo Mundo. Catesby encontró en la Virginia la de la *garza real*, nombre que la caracteriza bastante, pues es la mayor de todas las garzas conocidas: tiene cerca de cinco pies y tres pulgadas de alto cuando está en pie, y casi cinco pies y diez pulgadas desde el pico á las uñas; su pico tiene ocho ó nueve pulgadas de longitud. Todo su plumaje es pardo, escepto las grandes pennas de las alas que son negras, y tiene un moño de plumas pardas adelgazadas. Aliméntase no solo de peces y ranas, sino tambien de lagartos y lagartijas.

LA GARZA DE LA BAHÍA DE HUD-
SON.

UNDÉCIMA ESPECIE.

Ardea hudsoniana. L.

ESTA garza es tambien muy grande, pues cuenta cerca de cuatro pies y ocho pulgadas desde el pico á las uñas. Sombrea su cabeza un hermoso moño de color pardo-negro, que tiene caido hácia atrás; su plumaje es de un pardo claro sobre el cuello, mas subido sobre el dorso, y mas oscuro todavía sobre las alas; los brazos y los muslos son de un pardo rojizo, y el estómago es blanco, así como las grandes plumas que penden de la parte anterior del cuello, las cuales están cubiertas de manchitas en forma de pinceles pardos.

Estas son todas las especies de garzas que nos son conocidas; pues no admitimos en este número la octava especie descrita por Brisson, en vista de lo que sobre ella dice Aldrovando, porque esta descripción está hecha sobre un ave que llevaba todavía la librea de la primera edad, según lo advierte el mismo Aldrovando. Tam-

bien escluiremos del género de las garzas la cuarta y la vigésimasegunda especies de Brisson, separadas á nuestro entender de este género por caracteres harto visibles, pues la primera tiene el pico arqueado y las piernas guarnecidas de plumas hasta sobre las rodillas, y la segunda un pico cortó que la acerca mas bien al género de las grullas. En fin, tampoco contamos la nona especie de garzas del mismo autor, porque hemos visto que es la hembra de la garza-iris.

LOS CANGREJEROS.

ESTAS aves son garzas todavía mas pequeñas que la garzota de Europa; y se les ha dado el nombre de cangrejeros porque entre ellas hay algunas especies que se alimentan de langostas y cangrejos de mar, y cogen asimismo los cangrejos de agua dulce que encuentran en los rios. Dampier y Wafer las vieron en el Brasil, en Timor y en la nueva Holanda: por lo tanto, se hallan diseminadas en ambos hemisferios. Dice Barrera que, aunque los cangrejeros de las islas de la América cogen cangrejos, comen tambien peces, y que van á pescar á orillas de

las aguas dulces, lo mismo que las garzas. Nosotros conocemos nueve especies en el antiguo continente, y trece en el nuevo.

CANGREJEROS

DEL ANTIGUO CONTINENTE.

EL CANGREJERO-CAYOT.

PRIMERA ESPECIE.

Ardea squajotta. L. (var., 6.)

Dice Aldrovando que en Italia, en el territorio de Bolonia, llaman á esta ave *guaiot*, *guaiotta*, seguramente por tener esta palabra alguna relacion con su grito. El pico de este cangrejero es amarillo y los pies verdes, y tiene sobre la cabeza un hermoso haz de plumas adelgazadas, blancas en el centro, y negras por las dos orillas; la parte alta del cuerpo está cubierta de hebrillas de estas largas plumas delgadas y caídas, que forman sobre el dorso de

la mayor parte de estas aves cangrejeras como un segundo manto, y en esta especie son estas plumas de hermoso color rubio.

EL CANGREJERO ROJO.

SEGUNDA ESPECIE.

Ardea badia. GMEL.

SEGUN Schwenckfeld, este cangrejero es rojo (*ardea rubra*); lo que quiere decir, de un rojo vivo y no castaño, como traduce Brisson. Es del tamaño de una corneja, y su dorso es rojo (*dorso rubicundo*); su vientre, blanquizeo; las alas con tinta tambien blanquiza, y las grandes pennas negras. Este cangrejero es conocido en la Silesia, donde le dan el nombre de *garza roja* (*rodter reger*), y anida sobre los grandes árboles.

EL CANGREJERO CASTAÑO.

TERCERA ESPECIE.

Ardea erythropus. L.

DESPUES de haber quitado á la especie precedente este nombre que equivocadamente le da Mr. Brisson, aplicámoslo á la que el mismo naturalista llama roja, aunque Aldrovando la nombra de color uniforme, pasando del amarillento al castaño (*ex croceo ad colorem castaneæ vergens*). Pero si no hay error en las espresiones, están distribuidos estos colores contra lo ordinario, por ser mas subidos en la parte inferior del cuerpo, y mas claros en el dorso y alas; las plumas largas y estrechas que cubren la cabeza y flotan sobre el cuello están variegadas de amarillo y de negro; y el ojo, que es amarillo, está rodeado de un círculo rojo; el pico es negro por la punta, y verde-azulado cerca de la cabeza; y los pies son de un rojo subido. Este cangrejero es muy pequeño, pues Aldrovando, que cuenta á todos los cangrejeros por garzas, dice: *Cæteris ardeis ferè omnibus minor est*. Parece que este mismo naturalista da

como simple variedad el cangrejero que forma la trigésimasexta especie de Brisson. Este tiene los pies amarillos y algunas manchas mas que el otro á los lados del cuello: por lo demás, es exactamente semejante (*per omnia similis*); y así no vacilamos en referirlos á una sola y misma especie. Pero Aldrovando aplica al parecer con muy poco fundamento la palabra *ciris* á esta especie. Escalígero prueba bastante bien que el *ciris* de Virgilio no es en manera alguna la alondra (*galerita*), como lo interpretan comunmente, sino alguna especie de ave de ribera, de *pies rojos* y *cabeza moñuda*, y de que hace presa el águila de mar (*halicætus*); mas esto no indica que el *ciris* sea una especie de garza, y menos aun esta especie particular de cangrejero, que no es mas moñudo que otros; y el mismo Escalígero aplica á la garzota cuanto dice del *ciris*, aunque con no mas certeza. Así es como estas discusiones eruditas, hechas sin estudio de la naturaleza, lejos de ilustrarla, solo sirvieron para oscurecerla.

EL GUACO.

CUARTA ESPECIE.

Ardea comata. L.

ESTA ave es tambien un pequeño cangrejero conocido en Italia, en los valles de Bologna, con el nombre de *squacco*. Tiene el dorso de un amarillo oscuro (*ex luteo ferrugineus*); las plumas de las piernas, amarillas; las del vientre, blanquizas; y las plumas delgadas y caídas de la cabeza y del cuello están variegadas de amarillo, de blanco, y de negro. Este cangrejero es mas atrevido y animoso que las demas garzas; sus pies son verdosos; y el iris del ojo amarillo y rodeado de un circulo negro.

EL CANGREJERO DE MAHON.

QUINTA ESPECIE.

Ardea amata. GMEL.

ESTA ave, llamada en las estampas iluminadas *garza moñuda de Mahon*, es un cangrejero, y hasta de los pequeños, pues no llega á veinte y una pulgadas de longitud. Tiene las alas blancas, el dorso rojizo, la parte superior del cuello de un rojo amarillento, y la anterior de color grisblanco; y su cabeza está coronada con un hermoso moño, bastante largo, formado de hebras grises, blancas y rojizas.

EL CANGREJERO DE COROMANDEL.

SEXTA ESPECIE.

Ardea comata. L.

ESTE cangrejero guarda alguna relacion con el precedente; pues, así como él, tiene el dorso rojo; sobre la cabeza y en la parte baja y an-

terior del cuello se ve tambien una tinta rojo-amarilla y dorada; y lo restante del plumaje es blanco, pero carece de moño. Esta diferencia, que podria atribuirse al sexo, no seria obstáculo paraque lo refiriésemos á la especie precedente, si por otra parte no fuese esta unas tres pulgadas y media mayor.

.....

EL CANGREJERO BLANCO Y PARDO.

SÉPTIMA ESPECIE.

Ardea malaccensis. GMEL.

El dorso pardo ó color de tierra de sombras, todo el cuello y la cabeza sembrados de rayitas largas de este mismo color en campo amarillento, y las alas y la parte superior del cuerpo blancas: tal es el plumaje de este cangrejero, que hemos recibido de Malaca, y que tiene mas de veinte y dos pulgadas de longitud.

.....

EL CANGREJERO NEGRO.

OCTAVA ESPECIE.

Ardea novæ Guineæ. L.

SONNERAT encontró este cangrejero en la nueva Guinea; es enteramente negro, y tiene once pulgadas y ocho líneas de longitud. Dampier coloca en la nueva Guinea unos pequeños pescadores de cangrejos de plumaje blanco de leche: estos formarían, pues, otra especie de cangrejeros, de la que no tenemos hasta ahora mas conocimiento que el que nos da esta noticia.

.....

EL PEQUEÑO CANGREJERO.

NONA ESPECIE.

Ardea philippensis. L.

ESTA ave está suficientemente caracterizada con el nombre de *pequeño cangrejero*, porque en efecto es mas pequeña que todos los cangrejeros, y mas todavía que el *blongios*, res-

pecto de que no llega á trece pulgadas de longitud. Es natural de las Filipinas, y tiene la parte superior de la cabeza, del cuello y del dorso, de un rojo pardo, el cual se manifiesta sobre el dorso en pequeñas líneas trasversales y undulantes en campo pardo: la parte superior de las alas es negruzca, orlada de festoncitos desiguales de color blanco-rojizo, y las pennas de las alas y de la cola son negras.

EL BLONGIOS.

DÉCIMA ESPECIE.

Ardea minuta. L.

El blongios es, en orden de grandor, la última de estas numerosas especies que ha multiplicado la naturaleza repitiendo la misma forma sobre todos los módulos, desde la talla de la grande garza que es igual en tamaño á la cigüeña, hasta la del cangrejero mas pequeño y del blongios que no es mayor que un rascon; porque el blongios no difiere de los cangrejeros sino en tener las piernas algo mas cortas, y el cuello mas largo todavía á proporcion: por

esto los Arabes de Berberia, segun el Dr. Shaw, le dan el nombre de *boo-onk*, cuello largo, ó traducido literalmente *padre del cuello*. Cuando anda ó busca su alimento lo alarga y lo echa hácia adelante, como por medio de un resorte. Tiene la parte superior de la cabeza y del dorso de un negro con visos verdosos, así como las pennas de las alas y de la cola; el cuello, el vientre y la parte superior de las alas, de un rojo castaño mezclado de blanco y de amarillo; y el pico y los pies, verdosos.

Parece que el blongios se encuentra frecuentemente en Suiza, así como tambien en las costas de Levante y de Berberia; pero apenas se le conoce en las provincias de Francia, donde si se llega á ver alguno es porque anda perdido por efecto seguramente de un gran temporal, ó por venir huyendo de alguna ave de rapiña. Edwards da la descripción de uno que le enviaron de Alepo, el cual difiere del que acabamos de describir en que los colores no son tan subidos, y en que las plumas del dorso tienen bordes rojizos, y las de la parte anterior del cuello y del cuerpo están sembradas de rayitas pardas; diferencias que son al parecer de edad ó de sexo. Así pues, el blongios de Levante, del que Brisson forma su segunda especie, y el de Berberia, ó *boo-onk* del Dr. Shaw, son á nues-

tro entender los mismos que nuestro blongios de Suiza.

Todas las especies precedentes de cangrejeros pertenecen al antiguo continente : ahora vamos á ver las que se encuentran en el nuevo, y observaremos con respecto á los cangrejeros la misma distribucion que hemos seguido en las diferentes especies de garzas.

CANGREJEROS

DEL NUEVO CONTINENTE.

EL CANGREJERO AZUL.

PRIMERA ESPECIE.

Ardea carulea. L.

Este cangrejero es muy singular, porque tiene el pico y todo el plumaje azul, de manera que sin sus pies, que son verdes, seria enteramente azul; las plumas del cuello y de la cabeza son

de un hermoso viso violado en campo azul; las de la parte inferior del cuello, las de detrás de la cabeza, y las de la parte baja del dorso, son delgadas y caidas; y estas últimas, que tienen un pie y dos pulgadas de longitud, cubren la cola y la esceden en cuatro dedos. Esta ave es algo menor que la corneja, y pesa unas quince onzas. Vense algunas en la Carolina, pero solo por la primavera: no obstante, Catesby parece se inclina á creer que no anidan en este punto, y dice que se ignora de donde vienen. Esta hermosa especie se encuentra tambien en la Jamaica, y hasta parece que está dividida en aquella isla en dos razas ó variedades.

EL CANGREJERO AZUL DE PESCOZUELO PARDO.

SEGUNDA ESPECIE.

Ardea carulea. L. (Var. 2.)

Todo el cuerpo de este cangrejero es de un azul oscuro; pero á pesar de esta tinta tan subida, no hubiéramos hecho de él mas que una especie con el precedente, si la cabeza y cuello de