

Fig. 33.—Stevens. Tamaño natural.



Fig. 35.—Arbol de Tangierina en la huerta de A. S. Chapman, en San Gabriel.

interesante á causa de su color; corteza más gruesa que en otras variedades.

DUNCAN.—Nueva variedad introducida recientemente en el Estado. Mucho más grande que una naranja pero más pequeña que una naranja Shaddock; fruto delicioso, que muchos prefieren á la naranja. Corteza lisa, de un amarillo pálido, subácida. La membrana que divide la pulpa es amarga y debe quitarse antes de que se coma ésta.

THURSBY.

NARANJA SIN SEMILLA DE MARZO.

LEONDARDY.

LA NARANJA OTAHEITE.

Citrus aurantium, var. *Pumilum*, Galesio.

Esa especie enana se cultiva mucho en Florida, para injertar y reducir la altura de las variedades del naranjo dulce. Es un arbusto que nunca crece más de seis á ocho pies de alto. Fruto muy pequeño; flores de color rojizo: es un hermoso arbusto ornamental.

NARANJO ANUAL.

Citrus aurantium, var. *Trifoliata*, Linn.

Especie anual resistente al frío, del Japón. A principios del otoño, el árbol pierde sus hojas y queda en un estado latente, condición en la cual pasa el invierno. Es un árbol enano, que tiene generalmente la forma de un matorral, y es muy propio para formar setos, así como disminuir, mediante el injerto, la altura de las diferentes variedades de naranjas y limones. Fruta de color amarillo anaranjado, esférica, de 33 á 44 mm. de diámetro. Hojas trifoliadas, hojitas sésiles, elípticas, obtusas, sobre un peciolo alado. Ramas robustas, más ó menos aplastadas y muy espinosas.

ESPECIES Y VARIEDADES.

Las siguientes variedades de especies diferentes se han importado de varias partes del mundo: muchas se encuentran designadas con diferentes nombres. A consecuencia del cambio de situación, de condiciones climáticas, etc., no han llenado las esperanzas que prometían. Las que en la lista siguiente van marcadas con un (*) poseen algún mérito; las otras no han dado resultado ninguno, aunque es dudoso que alguna de ellas se cultive ahora en el Estado.

Selecta.	Catania.	China.	Oval.
Candian.*	Loretto.	Chio.	Española temprana.
Paros.	Sabina.	Archipiélago.	Parramatta.
Mitilena.*	Poure Hombre.	Tenedos.	Real.*
Samos.	Oval China.	Scio.	Belearica ó Malorea.*
Parakila.	Imperial.*	Kau.	
Accaway.*	Hoja de plata (ornamental).	Belady.*	Naranja de Niza.
Shamanty.		Bisry.	Jamaicana.
Tarsus (dulce).	Flor violeta (ornamental).	Vanigila.	Compaída [ornamental].
Jugo colorado.		Flor doble.	
Redonda.	Portugal.	Siciliana.	Lisboa.
Habana.			

Muchas variedades se han introducido en Florida y otras muchas se originaron allí. En estos últimos años, cierto número de variedades se introdujeron de ese Estado á California, las más de las cuales, al dar fruta, resultaron ser variedades duplicadas bajo diferentes nombres. Algunas se cultivan todavía, pero en cantidad limitada. La Botelka se cultiva mucho en San Gabriel por el Sr. A. Scott Chapman, quien la considera como provechosa á causa de su resistencia al transporte. También se cultiva en diferentes secciones de la parte septentrional del Estado. La siguiente lista es solamente parcial: las variedades marcadas con (**) son originarias de Florida.

Oblonga temprana.**	Omblico Imperial Doble.	Cunningham.**	Mejorada de Dann.
Huevo.**	Tony.**	Navel Premio de Bótrom.**	Osceola.**
Botelka.**	Piña.	Oce.**	Prater ó Plata.**
Dulcissima.	Navel de Richardson.	Spratts'Harmon.	
Frata.			
Exquisita.	China [Tangierina con hojas de sauce].	Bell.**	Beach n° 5.**
Vina Vieja.**		Sangre de Pierce.**	Foster.**
Arcadia.			Rfo Indio.
Prolífica.	Abigarrada de oro (Mandarina).	Sangre Dulce redonda.**	Milkensis.
Estrella Cáliz.	Mejorada de Markham.	Sangre de Armory.**	Marquis.
Acis.	Tardía de Higley.		Navel de Sanford.
Centenial.**	Wilder.	Sangre de Sall.**	Reina.
Mejorada del Dr. May.			
Non pareil.**	Dixon.**	Sangre Mediterránea.	Orange Lake.**
Pernambuco.	Krause.**	Sin espinas.**	Reina de Halifax.
Mediterráneo [de Sanford].	Orgullo de Malta.	Foundling.**	
Navel de Parson.**		Cría de Barry.**	Navel Sustain.
Navel Italiano.	Fruta perpetua.**	Mejorada del Dr. Stark.**	Cáscara de ras (ornamental).
Rfo Indio dulce.**		Cría de Mellwood.	
Sin Igual.	Madame Vinous.**		Whitaker.**




Fig. 34.—Mandarina de hoja de sauce. Tamaño natural.




Fig. 36.—Satsuma: Unshiu Mikan. Tamaño natural.




Fig. 37.—Mandarina de hoja ancha. Tamaño natural.




Fig. 38.—Bushiu-Kan, la cidra en forma de dedos, del Japón. Se usa en medicina.




Fig. 39.—Kumquat en forma de aceituna. Tamaño natural




Fig. 40.—Kumquat redondo. Tamaño natural.




Fig. 41.—Naranja agria.



Fig. 42.—Ramo frutal de Shaddock (reducido).





Fig. 43.—Tipo modificado de Citrus Decumana.