

378 ALIÆ PLANTÆ NOVÆ HISP.

HIVCA seu MIZMAITL.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

HIVCA seu MIZMAITL.

Planta hæc haud parua, vt in margine folij ipsius imaginis notatum est. Oritur in territorijs Ocopeli Yuca, vocata Mitzmaitl. Calida, sicca, aromaticæ est cortice præsertim & fructu: curat vlerca. Folium Palmaris mensura. Ut verò ex icone ipsa depræhendetur, caulis nitidus ad colorem tendit castaneum: folium septifarium partitum habet. Vua ex albo ad flavum tendit; admodum similiis est maiori Serpentaria: si baccæ essent rubrae. Vide Monard, cap. 53. qui vocat Cazaui, & alios omnes noui Orbis Historicos, præcipue Ouiendum. Nullus tamen eorum quidquam de fructu scripsit.

HOATZIN QVAXVITL.

In geniculis internodia sibi inseruntur, ibi quinque vel terni rami enascuntur.

HOITZITZIT TENTLI

Caulis rubet; baccæ in summo nigrae. Folia ut Salicis incisa & bina.

HOATZIN QVAXVITL.



379 NARDIANT RECCHI.

HOITZILZILTEXOCHITL.

379

HVAPAHVIZPATLI.



NOTATIONES.

HVAPAHVIZPATLI ALTERA.

HOITZILZILTEXOCHITL.

Ranunculi quædā species videtur. Foliū magnum, flavis venis compositum. Flos luteus, staminibus rubris.

HVAPAHVIZPATLI.

Caulis coloris castanei, ab imo usque foliatus: folia Ocimo similia.

HVAPAHVIZPATLI ALTERA.

Caules omnino foliati. Flores lutei, videnturque hiare instar leguminis alicuius.



HVA-



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

HVAPA QVILTC

Caulis hirsutus ex nigro rubet, foliū fere Sonchi. Flos albus integer inferius, superius diuisus in sex partes: calicis radij longitudine sua florem longè superant.

H V A Z I V M

Radix Ochræ luteæ colore: ramuli Galegæ similes. Folia ad Ciceris nostri folia accedere potius videtur.

I T Z C C V N P A T L I

Radix crassa, caules videntur scandere. Folium quodus duabus incisionibus, ferè ut in Gossypio diuisum; vnde inter Clematides forte numerari poterit.

A V H



H V A Z I V M

381

IZTACPATLI QVIZASEPIN.



N O T A T I O N E S.

IZTACTLATLAVQVI.

ITZTICAPITLI.

Radix fulua, crassa & oblonga. Folia Chamænerij alterna, & subluteis venis conspicua.

IZTACPATLI QVIZASEPIN.

Radicem habet Aristolochiæ longæ, & folia Pistolochiæ similia: nisi quod hæc rectis magis venulis ornantur. Videtur planta serpere potius, quam recta adolescere.

IZTACTLATLAVQVI.

Radix crassa & carnosa valde, intus rubra, extra rufa; caules etiam rubescunt, folia ad flavedinē quandam accedunt. Aspectu tota plantula iucunda est.



TZ-DAM

LO-

IOANNIS TERRENTII LYNCEI
MACPALXOCHITL

LOQVILTI.

Radix longa colore castaneo: calices in iuba parum rubent.

MACAYXTL.

Est spina quadam leguminosa & elegans; flores eius rubri mixta flavidine: Ipsæ siliquæ ex viridi nigricant, latæ 1. longæ 12. digitos: grana intus tria, vnde ad Anagyrum referri potest.

MACPALXOCHITL.

Plantæ huius radix ex albo subrubet. Folia sunt Maluz rosea, sed luteis venis pulchrè subducta.



MAC-

NOTATIONES.
MATLAL XOCITL.

MACPALXOCHI QVAHVITL.

Arbor est. Flor comomo ab Hispanis vocata. Folia Mori sunt. Flos undevis in ramis nascitur habetq; figuram quasi Tulipæ, colore maluaceo; & pro stamine exit quasi manus, vel potius pes auis, coloris sanguinei: cui à latere luteum, quid coniunctum est. Flos admidu magnus est, pro ratione arboris.

MAMAZTLACOTL.

Caulis foliosus & alatus. Flos Chrysanthemi luteus. Folia minutim incisa: Radix verò subnigricans.

MATLAL XOCITL.

Folia ve Valerianæ græcæ, & flos ex luteo ruber, quinque vt mihi videtur, foliolis constans. Stamina lutea sunt.

MA-





MATLALXOCHITL ALIA.

Folia Vrticæ. Flos ex céruleo viridis
cum staminibus. Calyx qualis ni
Scarea .

MAZAXOCHOTLI.

Arbor videtur. Rami alati omnes ple-
ni fructu rubro Berberis , qui lon-
gus, & latus dimidium digitum.

MEMEYA DE TEPOZTLAN.

Caulis virole diluto pediculos longos
habet , quibus folium adnatum ex
tribus constat . Siliqua Viciæ simi-
lis. Flos quasi Periclymeni constans
tribus magnis albis foliolis: reliqua
verò sunt stamina.



MEMEYA DE TEPOZTLAN.



MEM.



NOTATIONES.

MIA XIHVITL.



MEMEYA DE TEPOZTLAN. ALTERA.

Caulis totus rubet; Folia Helxines , ex
alii flosculi rubri enascuntur .

MATLAL XIHVITL DE XALATLACO.

Truncus videtur parum spinosus & vi-
ridis; ramuli Lentisco sunt similes ,
nouenis binorum foliorum oppo-
sitorum constantes ordinibus : vlti-
mum tamen solum vni ferè adnatū,
folia etiā adhærent latitudine qua-
dam vt in Lentisco : Vascula sunt
coloris carnei, flosculi cærulei colo-
ris, qualis in Gentianis conspicitur.

MIA XIHVITL.

Rami flavi, flos colore Keiri , foliolis
constans quinque: flocci rubent, fe-
men verò Clematidi simile . Folia
Cinerariam referunt, ex viridi albi-
cantia.

MICATLACH PAHOAZTLI.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI
MICAXIHVITL.

Caulis flauet, folia omnia versus vnam
partem torquentur. Flores ex luteo
rubri, figura Hyacinthi: petioli:
lutei. Aspectu mira planta.

MICATLACH PAHOAZTLI.

Rami coloris castanei & folia minuta
instar Acaciae. Radix fibrosa cum
cauliculis rubet.

MICA XOXO COYOLLIN.

Radix bulbacea & rubens ex albo vt
& caules: flos rubet matronali Viola
similis, constatque quinque foliolis.
Calyx integer superiore cui parte in
quinque radios divisus. Folia stel-
lata pulchre referunt.



MI-



MOLON CAPATLI.



NARDI ANT. RECCHI.

MIMIYCA HVATZIN.

387



NOTATIONES.

MIMIYCA HVATZIN.

Radix crassa & nigra: flos violaceus
quidem, sed non explicatus depin-
gitur.

MOHVITLI.

Radix tota fibrosa, oblonga, flauescens.
Caulis & ipse flauens, in binos & bi-
nos diuiditur oblongos rectosque
ramulos. Folia directe sibi opposi-
ta. Rubicundos oblongos & pul-
cherrimos, siue flores haud explicata-
tos, siue filiquas (discernere enim
hoc difficile est) ex uno pediculo
duos semper emergentes habet,
vnum altero dimidio longiorem.

MOLON CAPATLI.

In ramis sunt folia bina sibi opposita
Origanum similia. Radix flauet: fo-
liorum venæ albant.

Kk 2 MY-

MYHVIYTTILMOYOYC CVITLATONPIT
ZOCHTL.IOANNIS TERRENTII LYNCEI
MYHVIYTTILMOYOYC CVITLATONPIT
ZOCHTL.

Planta hæc, ex radice tuberosa flauescens sine folijs caulinis glabros protrudit, ex quibus ramuli floridi prorumpunt. Flores rubelli ex calyce viridalbicante, vel in foliola distincti sex, ex uno calyce integræ quasi & in summitate crenati emergunt, in quibus stamna subtilia rubescens conspicuntur.

MOYOTLI AYACATLI.

Folium simile ipsi Lilach; in summitate plantæ flores rubri ex longis & rubris petiolis enascuntur, quinque foliolis cum staminibus suis intermediis distincti.

MACAZPIPILLOLI.

Color radicis tuberosæ est subnigricans. Cauliculi repentes, ex quibus longo fatis intervallo, viridit, folia saturati coloris cum venis albicantibus exente. In summitate congesta plurima foliola, à iam dictis maximè differentia rubicunda videntur. Et quod minus, ex horum medio foliorum hinc inde flores enascuntur mirabiliter Peruviana similes, sed rari; ex quorum medio eiusdem coloris stamna eriguntur.



NANA HVAPATLI.

NANAVH QVILTIC.



NOTATIONES.

NANAHOA QVAHOITL.

NANA HVAPATLI.



Caulis luteus punctis rubris conspersus & venæ rubræ in folijs. Vrticæ folium longum 4. latum 3. digitos. Planta videtur repere: Radice Aristolochiam rotundam imitatur.

NANAVH QVILTIC.

Radix Pæoniæ similis; lobii Phaseoli modo: terna tantum in quoquis ramo folia, & ad latera radicum cauliniculi enascuntur.

NANAHOA QV-AHOITL.

Radix rubet, stipes recta surgit, ex quo iularum simile quid floridum dependet. Folia bina & Galega non dissimilia.

398 ALIA PLANTÆ IN VIE HISP.
NENEXTON. NEX.
NETLAXOCHITL.



ЗИОИТАОИ
ЛІОНА ОДОННАД

IOANNIS TERRENTII LYNCEI.
NENEXTON.

Caulis rubicundus. Folium longum
9. latum 3. digitos, figura Citri.
Radix oblonga ex rubro albicans
& trifida.

NETLAXOCHITL.

Videtur species Amaranthi. Folium
habet Atriplicis: pediculi sunt ru-
bri; stipes ipse satis crassus & pro-
sum rubicundus.

NEXPAYAN.

Fructus ex quauis ala enascitur flauus,
figura Mercurialis; quamvis gemi-
nus non appareat, videturque his-
sus esse vel asper. Folij color est
ex viridi luteus.



399 NARDI ANT. RECCHI.
NEX XIHVITL.
NEYCOTLAPATLI.



NOTATIONES.
NEYCOTLAPATLI ALTERA.

NEX XIHVITL.

Folia fibi opposita Costo hortorum
similia, ferrata, sublutea.

NEYCOTLAPATLI.

Radix cui figura fibrata; in caulinis
tenuibus lena folia ex eodem loco
exoriuntur: ex quauis ala exit pe-
tiolus breuis, baccam flauam Ana-
gallidi similem sustinens.

NEYCOTLAPATLI ALTERA.

Folia serrata & oblonga saturati viro-
ris. Radix lutea, fibrosa.



NO-



IOANNIS TERRENTII LYNCEI
NOCHEZTIC.

Capitulum Scabiosæ simile florum
rubrorum. Folia cordis figura su-
pra virentia, subitus albicantia &
bina ac rara.

NONOCHTO.

Folia Portulacæ similia. Flos carni-
coloris Matronali Viola similis,
in calyce satis crasso. Caulis etiā in-
star Portulacæ crassus & carnosus.

NOPALXOCH CVEZ ALTICQVIZI.

Planta hæc similis est ferè Sedo Port-
landico apud Lobelium depicto :
pronenit ut Tunæ vel Aloe. Flos eius
obscure rubet, figura Caryophylli
maximi pleno flore, stamina ipsa
lutea, apices crassiusculi. Calyx au-
tem floris squamosus ex rubro lu-
teus. Elegantissima planta.



NOPALXOCH CVEZ ALTICQVIZI



OAT.



NOTATIONES.
OCO QVILTIC.



OCO

Folium ita serratum, vt spinosum vi-
deatur. Spicas videtur Veronicae ere-
ctæ similes gerere ex viridi flau-
scentes, qui color & in folijs conspi-
citur.

OCOPETLAL.

Rami alati folijs Gelsimini. Ex ala or-
tur spica longa instar Piperis longi
vel Plantaginis, coloris subfuscæ;
cuius coloris & radix appetit.

OCO QVILTIC.

Radix Napo similis colore carneo.
Folia Pomi aurei, sed multò te-
nuiora.