



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

OCO XOCHITL Y HVALAPE.

Folia bina sibi opposita Lysimachia  
similia, in exortu rubent obscure.  
Radix in longas fibras diffusa.

OCVILPATLI.

Folia ferrata Pseudodictamno familia,  
cum ipsi cauli adnascantur. Radix  
copiosissimis fibris fuscis onusta.

OCVILPATLI ALTERA.

Caulis coloris castanei. Folia Salici si-  
milis subtrus flava. Radix longis fi-  
bris rubet.



OLOM.



NOTATIONES.

PALAN CAPATLI.

OLOMPATLI.

Inter folia exit flos luteus vt in Acana-  
ceis. Radix pulchrè rubet.

OLOXIHVITL.

Rami vestiti folijs Lauri in sumo. Flo-  
res Scorpionis caudam efficiunt vt  
in Heliotropio, colore rubro.

PALAN CAPATLI.

Folium viride nigricans, figura Pomi  
aurei in ramo nodoso.



PA.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

PATLA HOACXIHVITL.

Folij longitudo nouem, latitudo quinque digitorum, figura Coccygræ.

PERPENA.

Tota herba similis Trachelio, sed folia videntur esse bina sibi opposita, & ex quavis ala oritur flos Campanæ ceruleæ figura.

PHACANI.

Phaseolus. Radix contorta: caules diluti viroris. Folium superiore superficie arrorubente, inferiore virore albicante tingitur, eiusque longitudo 4. latitudo totidem ferè digitorum, figura cordis.



PIL-



NOTATIONES.

PAXAVAC, vel POXAVAC.

PITZIN TEVHXOCHITL.

Flores rubri. Bellidi minori similes.

POPOYAVH QVILITL.

Folia Sanguisorbæ similia: siliquæ sex grana continent. Flos luteus Cassiæ similis.

PAXAVAC, vel POXAVAC.

Radix coloris carnei figuræ ovalis. Caulis inferior plenus fibris totusque ruber. Folium Atriplicis cum venis rubris.



PAYS

LI PO-



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

POCAYO.

POZAHVALIZPATLI.

Radix tota rubra. Caulis scandit: folia cordis eiusq. venæ longæ; capreoli ex eadem qua folium, ala enascuntur. Habes in prima imagine folia & caules, in secunda radicem.

POZAHVALIZPATLI.

Vesicula Lychnidi similis, florem continet flavum quatuor foliorum.



PYAZ



NOTATIONES.

QVAQVAVTHZONTIC ALIA.

PYAZTLACOTL.

Folia Alchimilla: familia: in summo herbæ spicæ lutea, sicut in Lagopo.

QVAVH CHIAN.

Caulis coloris castanei nigricantis; fructus ut in Absinthio coloris castanei.

QVAQVAVTHZONTIC ALIA.

Radix subfusca, ex qua omnes cauliculi, & ex his nulli ramuli erumpunt. Folia atrorubentis coloris, eiusdem & seminum capsula rutaceis planè similes.



L I 2 QVA-

QVAVH COYOLI CHIETLA.

QVAVH CHICHIC PATLI.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

QVAVH COYOLI CHIETLA.

Folia quasi bina opposita vt in Lentisco: bacca virides sunt a lentiscinis non abludentes.

QVAVH CHICHIC PATLI.

Folium longum quinque, latum tres digitos figura Iuglandis. Radix lutea & longa.

QVAVH CHILPAN.

Radix crassa: caulis ruber & folia quasi Lapathi intorta sine pediculo adnata. Flos in summo ruber, figura Nicotiana.

QVAVH CHIEPAN.



QVAVCHOLOTL, vel GVACIMO.

QVAVHCOYOLLI.



NOTATIONES.

QVAVCHOLOTL, vel GVACIMO.

Folium diluti viroris, & circa extremitates albidum. Frutex viderur, cuius fructus adeo Asinini Cucumeris dicti, fructum asperitate figura & viriditate æmulatur, vt nec ovo ouum sit similis. Stipes & radix nigricant.

QVAVHCOYOLLI.

Ex Palmarum genere esse non est dubium. Radicis ad arborem hanc vix est proportio. Multiplex quidem hæc, sed nec crassa nec longa admodum, est cinerei coloris; subfusci verò stipes, in quo præter manifesta abscissorum ramorum vestigia, adsunt plurimi etiam ijq; subtiles sursum tendentes adherent. Foliarum, quam in Palma quam nos colimus, multò teneriora & subtiliora & pennata cernuntur. Fructus varum rubellarum & albicantium racemis planè similes.

QVAVH CVETZ PLACVITLAPILLI.

QVAVCZICTLI.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

QVAVH CVETZ PLACVITLAPILLI.

Radix ex nigro pallida: Reliquum totum ex hac emergens vnum corpus est, ex compactis quasi folijs constans, fissuris in longum diductis distinctum; que striæ viridis saturati sunt coloris; dilutioris verò foliorum dorsum quod vndiq. tuberculis spinosis horret. Flos ex conglobatis tuberculis, ex quibus spinæ lenes exeunt eiusdem coloris, qui in Cynaræ flore conspicitur, constat. Calyces sunt virides aculei sulci.

QVAVCZICTLI.

Radix Napi forma. Caulis Amethysti colore scandens: folij figura ovalis longitudo quatuor, latitudo duorum digitorum.

QVAVHCHILPA CVITLATONPIZIXOCHITL.

Radix albicat & crassiuscula est; Caulis erecti, ex quibus ramuli directi sibi oppositi. Flores carnosiores quales in Hyacintho, integri & caui ex caruleo dilutiore colore.



QVAVH ELOXOCHITL.

QVAVH HOCHPAHVATZTLI.



NOTATIONES.

QVAVHYETL.

QVAVH ELOXOCHITL.

Folia laurina subtus flava sunt; in summo ex calyce exiguo prodit quid lutei coloris Auenæ figura.

QVAVH HOCHPAHVATZTLI.

Rami bini & folia bina sibi opposita figura Pyri. An cum Auellanis catharticis illi sit aliqua affinitas, suspicari licet.

QVAVHYETL.

Est Nicotianæ species alia.



QVAVH TLAYE KOCHITL.



QVAHVIZ QVITZTLI.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

QVAVH TLAYE KOCHITL.

Folia Hederae arborea similia.

QVAHVIZ QVITZTLI.

Caulis rubent: Folia Teucrij adnata.

QVAVH YTZAPOLI.

Folia rara: pediculi longi ex quavis ala  
exeunt. Bacca Solano sunt similes,  
flores verò lutei. Herba est valde  
mucilaginosâ.



QVA-

QVAVH TEZHOATL.



QVAVH TLAC PAVATZTLI.



NOTATIONES.

QVETZALYZTIC.



AVO

QVAVH TEZHOATL.

Rami castanei coloris. Folia Lauri fer-  
rata. Flos Nerij carnei coloris, in  
medio cuius quid lutei: Purgat su-  
periora & inferiora, drachmarum  
duarum dosi exhibitâ planta.

QVAVH TLAC PAVATZTLI.

Bacca sparsim in ramis breui pedicu-  
lo exoriuntur, primùm virides: ma-  
tura coccinea: maiores Pifo.

QVETZALYZTIC.

Radix ad Filipendulae speciem acce-  
dit, annexis globulis ex quibus alia  
radiculae sulci coloris: planta Pole-  
monij æmula, vt Lychnidis spe-  
cies esse videatur. Flos in flore palli-  
dus, qui in duas partes hiare conspi-  
citur.

QVA-



IOANNIS TERRENTII LYNCEI QVAVXIOTL. QVIL POZOLLI.

*Handwritten notes in red ink:*  
 2. e. Horda...  
 Plus inferum...  
 Thea...  
 2.

Huius arboris stipes rubes ramosus est admodum: foliū figura Coccygriz & color rubeus. Fructus totū ramum occupat, quaterni decussatim ex eodem loco prodeunt. Figura cuiusvis fructus renem refert rubrum ex viridi: folium est venis rubris perfusum, vt merito hæc planta inter Lentiscos referri debeat.

Capitulum Cañabinæ aquaticæ simile & colore & flore.

Folia inferiora rubent vt in Beta, venis tamen flauis percurrentibus; superiora folia virent, sed in aduersa parte albicant: vnde videtur ad Arriplices referri posse.



QVA-



INNOTIATIONES. TLATECOMAXOHVITL. Seu TEALTECOMAXOCHITL. TANCAPAZ. TAREPENI.

Caulis coloris castanei: rami obscure virent inspersis rubris punctis. Planta tota similis Adiantho nigro Lobellij.

Folia Teucris maiori similia; flos ruber, sed inexplicitus.

TLATECOMAXOHVITL. Seu TEALTECOMAXOCHITL.

Radix Pyriformis & folium Saniculæ. Fortè ferulaceis adnumeranda.



TE-



IOANNIS TERRENTII LYNCEI  
TECECEQVI. TECOMAXOCHITL.

Radix crassa coloris castanei. Rami re-  
prantes, & in quavis ala quid album  
capillorum instar. In summo flos  
Ranunculi: colorem non addidit  
Pictor.

TECAMILIN.

Radices luteæ ex rubro, & folia Lauri.  
Discutit hæc herba tumores præter  
naturam.

TECOMAXOCHITL.

Flos longus & luteus: figura Mirabilis  
Peruvianæ, superius in quinque oras  
diuisus: interna superficies ex rubro  
cærulea; folium verò plantæ est Ci-  
tro simile. Radix lignosa & nigri-  
cans.



TECO.



NOTATIONES.  
TEPEAMATL.

TECOMAXOCHITL ALIA.

Videtur arbor. Folia Circeæ ex viridi  
lutea; flos similis Ori leonis dicto,  
totus luteus.

TEHOAXIN.

Apparet esse arbor leguminosa: folio-  
la Acaciæ similia, siliquæ Pisi: qua-  
rum longitudo duodecim, latitudo  
duorum digitorum.

TEPEAMATL.

Folia cordis, quarum nervi rubent: in  
summo quid rubrum, sed conuolu-  
tum conspicitur.

