



IOANNIS TERRENTII LYNCEI  
TEMEICAXIHWITL.  
Tepenexcomitl.

Hæc planta videatur scandere: folia nigricantur.

TEPEHOAXIN.

Flos huius leguminis ruber. Fructus ex aliis exit siliculosus  
Pili modo, sed pendens; grana intima duo.

TEPENEXCOMITL.

Quæ a Penna olim & Lobelio, tum à Clusio in Exoticis  
iñis diligenter descripta planta Echinomelocactus dicta  
fuit: videatur ea esse que hic representatur. El rameo  
differencia non leuis, quam iam aſsignabo. Videram vii  
illi doctissimi ex America tantum allatas; nec domi illas  
sue alueram, quæ res exculare eos poterat. Verum cele-  
berrimus Efferens Horrus (qui liber regis plane  
sumptibus exculsus & affabro elegansissime depictus ma-  
nu, apud Ioannem Fabrum Lynceum Bambergensem)  
Horri Ponificij Praefidem, Illustrissimorum Dominorum  
Fuccarorum domum exiit: hanc ipsam plantam in fistulis  
per annum colligere memorat, & cum viris doctissimis  
jam dictis plane concordat. Hæc igitur nostra, radice  
& fructu plurimi differt: cutis plures fibrae in radice  
vnicam, crassam facti ac lignosam coalefcunt: ex qua fo-  
lia Opuntia similia, sed arctè cohærentia sphaeram quo-  
dammodo constituant frequentibus spinosis (stellulae hor-  
ridam, quam Penna pro fructu quadam Cucumeraceo,  
& tomentum pro flore descripsit). Tonimentum hoc quod  
omnes in supraemæ sphera huius parte aſsignare, in no-  
stra nullum conficitur, ex quo Clusius folliculos seu  
vaginulas angustas emerget scribit floridas: que  
Lobelio Capitio, iñ Indiæ dicti piperis fructus emul-  
tantur. Qui autem in nostra fructus reperiatur ex foliis  
enaeſcitur & non alter ac in Opuntia seu Tuna ficus  
conficitur in quo eodem proritis modo floe superfiſiat.  
Flos hic & ipſe rubet, & rubescens ac maculis quibusdam  
virescentibus ornato fructui pulchre infidet. Folia  
planta crassa illa Opuntia amula (nam alia fructu que-  
rit folia Clusius) ex colore viridi alblicant mixto, ac lu-  
teis aculeatusstellulæ conficitur: quoniam Clusius no-  
men ante deferratur ex errore Lechori liberent com-  
municamus, TEPENEXCOMITL.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI  
TEPEHOAXIN.

Hæc planta videatur scandere: folia nigricantur.

TEPENEXCOMITL.

Flos huius leguminis ruber. Fructus ex aliis exit siliculosus  
Pili modo, sed pendens; grana intima duo.

TEPENEXCOMITL.

Quæ a Penna olim & Lobelio, tum à Clusio in Exoticis  
iñis diligenter descripta planta Echinomelocactus dicta

fuit: videatur ea esse que hic representatur. El rameo

differencia non leuis, quam iam aſsignabo. Videram vii

illi doctissimi ex America tantum allatas; nec domi illas

sue alueram, quæ res exculare eos poterat. Verum cele-

berrimus Efferens Horrus (qui liber regis plane

sumptibus exculsus & affabro elegansissime depictus ma-

nu, apud Ioannem Fabrum Lynceum Bambergensem)

Horri Ponificij Praefidem, Illustrissimorum Dominorum

Fuccarorum domum exiit: hanc ipsam plantam in fistulis

per annum colligere memorat, & cum viris doctissimis

jam dictis plane concordat. Hæc igitur nostra, radice

& fructu plurimi differt: cutis plures fibrae in radice

vnicam, crassam facti ac lignosam coalefcunt: ex qua fo-

lia Opuntia similia, sed arctè cohærentia sphaeram quo-

dammodo constituant frequentibus spinosis (stellulae hor-

ridam, quam Penna pro fructu quadam Cucumeraceo,

& tomentum pro flore descripsit). Tonimentum hoc quod

omnes in supraemæ sphera huius parte aſsignare, in no-

stra nullum conficitur, ex quo Clusius folliculos seu

vaginulas angustas emerget scribit floridas: que

Lobelio Capitio, iñ Indiæ dicti piperis fructus emul-

tantur. Qui autem in nostra fructus reperiatur ex foliis

enaeſcitur & non alter ac in Opuntia seu Tuna ficus

conficitur in quo eodem proritis modo floe superfiſiat.

Flos hic & ipſe rubet, & rubescens ac maculis quibusdam

virescentibus ornato fructui pulchre infidet. Folia

planta crassa illa Opuntia amula (nam alia fructu que-

rit folia Clusius) ex colore viridi alblicant mixto, ac lu-

teis aculeatusstellulæ conficitur: quoniam Clusius no-

men ante deferratur ex errore Lechori liberent com-

municamus, TEPENEXCOMITL.



NOTATIONES.  
TEQVA NIYTZONCAL.

TEOCOPALLI.

Caulis geniculatus albus; folia ad in-  
ternodia semper bina. Nasturtio  
aquatico non abſimilia. Flores la-  
nuginosi comantes.

TEPEYZQVIXOCHITL.

Radix crassa & lignea: Rami spadicei  
ſine caſtanei; folia verò Pyri. Pe-  
dicularis non longus.

TEQVA NIYTZONCAL.

Radix transuersim poſta, massam quâ-  
dam conſtituit; folia longa Cypero  
ſimilia, ad cuius ſpeciem videntur  
accedere.

412 ALIÆ PLANTÆ NOVÆ HISP.  
TEQVAN MECATL.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI  
TEQVAN MECATL.

Folia una tantum parte incisionem  
habent. Flos ex rubro est luteus;  
fortè inter erectas Clematides nu-  
merari potest.

TERIPETI, vel TZIPALITZITI.

An Cacalia aliqua? Flos enim similis &  
carneus. Folium tamen ad maluacea  
accedit.

TEXCALXIHVITL.

Rami viroris obscuri, flos albus. Fo-  
lia quodammodo Filipendulæ crenu-  
lae.

TERIPETI, vel TZIPALITZITI.

TEXIOQVAHOITL.

DAMAJT

TEZCAPATLI.

TEXIOQVAHOITL.

DAMAJT



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

TLACAMAZATCAZQVI Y PAPAN.

Radices longæ, tenuæ. Caulis scandit, folium figuræ a cordis longum quinque & dimidium, latum vero quatuor & dimidium digitos, serratum Vrticæ instar.

TLAMACAZQVI Y PAPAN vel COAPATL.

Caulis teretes condensis vestiti folijs vt in Esula Myrtite, Flores comantes ex albo lutei.

TLAC CECEC vel TLALIZTIC.

Radix crassa Napi formis; ramus Cardamines.



TLA.

NOTATIONES.  
TLACOCHILTON.

TLACHINOL XOCHITL.

Flos similis Linariæ aureæ Tragi. Fo-  
lia minuta. Exilis planta

TLACOCAVHZTLI.

Radix flava; flos omnino erodus,  
oblongus, non diuisus. Folia infe-  
rius tria magna; ex his ramuscules,  
in cuius summitate foliola adeo  
subtilia, vt videantur Limonijs ma-  
ritimæ planta flores amulari, nisi  
quod bene viridis sint coloris.

TLACOCHILTON.

Folia situm & figuram Rutæ obtinent:  
in summo calyculi rubri Lychnidi  
similes.




TLA.

AIT

MM

TLA.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

TLACOXIHVITL

Tota planta cinerei coloris, folia Artemisiae marinae, seu Camerariae similia. Caulis nodosus: radix magna & flava.


TLACOTEQVIZPATL

Ramus arboris videtur si Ceterum nihil, nisi quod folia Oleam quodammodo representent. *Ant. v. s. 1590. lib. 1. t. 1. f. 1. 1590. lib. 1. t. 1. f. 1. 1590. lib. 1. t. 1. f. 1.*

TLACOTL

Multi rami ex eodem nascentur principio. Folia Gossipio similia.

*Ant. v. s. 1590. lib. 1. t. 1. f. 1. 1590. lib. 1. t. 1. f. 1. 1590. lib. 1. t. 1. f. 1.*



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

TLACOXOCHITL.

Radix flavescit, caules rubri & folia  
Teucrij. Flos Armerij rubri: folio  
la semper sunt quatuor parua inter  
duo magna.

TLACOXOCHITL ALIA.

Herbula caules habet rubros: vasculū  
in calyce rubrum rotundum, sed in  
summo habet foliola flava, ita ut  
fructus sit figura similis Malo pu-  
nico.

TLACOZAZALIC.

Caules rubent. Folia bina sibi opposi-  
ta Pyro similia: ex quauis ala vascu-  
lum, vel ba ccula emergens appa-  
ret Anagallidis instar.



TLACOZAZALIC.



TLA.

NOTATIONES.  
TLALACHOYATL.

TLALLAALA.

Folia Betonicæ; caulis purpureus. Flos  
Medio similis ex quauis ala enasci-  
tur, sed coloris ex rubro albicantis.

TLALLAALA ALIA.

Folia Ricino Americano similia: in  
summo spica quasi glandium viri-  
dium, ex quibus exit flosculus ru-  
ber albedini permixtus, folijs con-  
stans quatuor, longoquè insistens  
pediculo.



TLALACHOYATL.

Radix longa, quæ inferiori parte fit  
maior: ramuli admodum foliati ut  
in Esulis.

TLA.

## 420 ALIE PLANTÆ NOVÆ HISP.

TLALAMATL.



IOANNIS TERENTII LYNCEI

TLALAMATL.

Radix surculosa, crassiuscula, flava, vnde scandentes caules. Folia bina ad internodia eaque cordis figurâ apice ferre recurvo, inferius subalbida in summo tria. Fructus inuersæ fucus figura apice deorsum viridi, superiore ventre crocco, exiguo calyce appenditur, petiolo ad alam, breui sustinente. Flos comparet nullus.

TLALAHOCATL.

Flores habet luteos Senecionis instar. Folia Anethi; Radix lutea est & fibrosa.

TLALCHAMALLIN.

Radix longa, crassa & quasi squamosa lutea. Folia sinuosa: in summo quid rubri conspicitur, vt in Trifolio pratensi.

TLALAHOCATL.



TLALCHAMALLIN.

AIT



TLA-

## NARDI ANT. RECCHI.

TLALCHICHPATL.



421

TLALCVITLAPILLI.



INNOVIATIONE ISNAOI

TLALHVAPATL.

AIT



AIT

TLALCHICHPATL.

Longissima radix Glycyrrhiza similis; folia parua Galega; flos luteus. Silique longæ tres, late verò digiti octauam partem, cui grana insunt vnum supra viginti.

TLALCVITLAPILLI.

Pediculi & foliorum venæ rubent: caulinulus, qui repere videtur rubris guttis conspersus est.

TLALHVAPATL.

Caulis rubet; folium longum quatuor, latum sesquidigitos. Ramus in fine habet capreolum.

TLA-

AIT



IOANNIS TERRENTII LYNCEI

TLALIZTA PATZIN.  
TLALIZTA QVILITL.

Radix Filipendulæ. Caulis cinereus nodosus, vnde forte arbórfuerit. Foliū longum quatuor, latum duos cum dimidio digitos figuræ ovalis, eiusque venæ rubent.

TLALIZTA QVILITL.

Cauliculi rubri, cuius folia Vermiculari similia. Flosculi albi sex foliolis constantes, cū Ocamastri vitriculo. Conglomerata radicū, ad Hashula regia effigiem fermē congeries.

TLALOCLOXOCHITL.

Caulis sanguineus videtur repere. Folia bina cū nodis ut in Ocymo. Foliū venæ rubræ, in summo flos Alte-ris, cuius centrum obscure rubet; radij flavi sunt, binatim vero folia calycem attingunt; vnde non iniuria siue Lychnis siue Bellis iudi- cari potest.



TLALOCLOXOCHITL.

TLALIZTA QVILITL.

TLALIZ

424 ALIÆ PLANTÆ NOVÆ HISP.  
TLALZITZICAZTLI, vel TLALZITZAZLI.



IOANNIS TERRENTII LYNCEI  
TLALZITZICAZTLI, vel TLALZITZAZLI.

Caulis plures nudi, qui circa summum  
cauliculos multis siue potius pedi-  
cules prælongos sustinent, e quo-  
rum summo apice foliū emergit fi-  
gura cordis, ferratum ad instar Vr-  
tice Romane. Spectabilis certe  
planta.

TLANATOAHVIZPATLI.

Folia bina ex breui petiolo ne quis lu-  
teis : longo pediculo insidet flos  
Caltha luteus.

TLANCA CAHOATLI.

Radix tota lucea ; folia verò Crassulæ  
familia, non tamen ferrata ; qua lati-  
tudine sua multū caulis ambiunt.

TLANATOAHVIZPATLI



TLA.

425 NARDIANT. RECCHI. IA  
TLALHOAXINAIT



NOTATIONES.  
TLANCVIPATLI.



TLA.



TLALHOAXIN.

Legumen folijs Galegæ. Flores colore  
Vicie, siliqua vero longa & tenuis  
Astragaloidi similis. Huius duas ha-  
bes icones, in quarum prima flores  
& siliquas, posteriore vero folia me-  
lius dispicies.

TLANCVIPATLI.

Radix longa & nodosa: folia vero cau-  
lem ambiunt, vnum tamen reliquis  
longius.

TLANCVIPATLI.

TLANCVIPATLI.

Nn 3 TLAN-