

férieurement et contenu dans un sac dépourvu d'ailes, osselet dorsal nul ou fort petit.

Bouche terminale, entourée de huit bras égaux, munis de ventouses sessiles et sans griffes.

*Sepia octopus*. Linn. Encycl. pl. 76. fig. 1 et 2.

Lernée. *Lernæa*. Corps oblong, cylindracé, renflé au milieu ou vers sa base; bouche en trompe rétractile; deux ou trois bras tentaculiformes à l'extrémité antérieure du corps; deux paquets d'ovaires ou d'intestins pendans à son extrémité postérieure.

*Lernæa branchialis*. Linn. Muller, Zool. Danica. 5. tab. 118. fig. 4.

Firole. *Pterotrachea*. Corps libre oblong, gélatineux, avec une nageoire mobile et gélatineuse, soit sous l'abdomen, soit sous la queue; deux yeux apparens sur la tête.

*Pterotrachea coronata*. Forskal. Encyclop. tab. 88. fig. 1.

Clio. *Clio*. Corps contenu dans un sac oblong, turbiné, muni supérieurement de deux ailes branchiales, membraneuses, opposées

l'une à l'autre. Tête saillante entre les ailes, séparée du corps par un étranglement, et formée de deux tubercules entre lesquels est la bouche; deux tentacules courtes, insérées sous la tête.

*Clio borealis*. Linn. Pallas. Spic. Zool. tab. 1. fig. 18, 19. Encycl. tab. 75. fig. 3, 4.

Seconde sous-division. — Ceux qui se traînent ou rampent sur le ventre.

#### Les Limaciers.

Laplisie. *Laplisia*. Corps rampant, oblong, convexe, bordé de chaque côté d'une large membrane qui se recourbe sur le dos; la tête garnie de quatre tentacules; le dos pourvu d'un écusson recouvrant les branchies et contenant une pièce cornée; l'anus au-dessus de l'extrémité du dos.

*Laplisia depilans*. Linn. Boadsch. Mar. 5. tab. 1, 2, 3. Encyclop. tab. 83. fig. 1, 2.

Dolabelle. *Dolabella*. Corps rampant, contenant intérieurement (dans son dos ou dans un écusson dorsal) une pièce testacée, plannusculaire, un peu convexe en dehors, taillée

en cône oblique, élargie et amincie vers sa base, à sommet épaissi, calleux et obscurément en spirale.

*Dolabella callosa.* Rumph. Mus. tab. 60. fig. 12.

Bullée. *Bullea.* Corps rampant ovale-oblong, convexe, bordé de membranes qui l'enveloppent; tête nue, sans tentacules: partie postérieure du corps pourvue d'un écusson large, embrassant, recouvrant les branchies et contenant un corps conchyloforme.

Le *Bulla aperta* de Linnæus se trouve dans son écusson. Planch. tab. 11. fig. D. E. F. G.

Tethis. *Tethis.* Corps oblong, charnu, rampant, bordé d'un manteau qui s'épanouit antérieurement et s'étend, au-dessus de la tête, en un voile large, arrondi et fragile. Bouche s'allongeant en trompé, et située sous le voile qui couvre la tête; deux ouvertures au côté droit du col, pour la génération et la respiration.

*Thetis fimbria.* Linn. Boadsch. Mar. tab. 45. fig. 1, 2. Encyclop. tab. 81. fig. 3, 4.

Limace. *Limax.* Corps oblong, rampant,

ayant le dos pourvu d'un écusson coriace, contenant un osselet libre; tête munie de quatre tentacules, dont les deux plus longues portent chacune un œil à leur extrémité, une ouverture au côté droit du cou, donnant issue aux parties de la génération et aux excréments.

*Limax rufus.* Linn. Lister Conch. tab. 101. fig. 123. A.

#### Les Phyllidiens.

Sigaret. *Sigaretus.* Corps rampant, ovale, convexe, couvert d'un manteau lisse, intérieurement conchylifère; et qui le déborde tout autour; bords du manteau vasculieux en-dessous. Tête aplatie, située sous la partie antérieure du manteau et munie de deux tentacules courtes. Coquille univalve, déprimée, subauriforme, à spire courte et peu élevée; l'ouverture entière très évasée, plus longue que large.

*Helix haliotoidea.* Linn. Sigaret, Adans. pl. 2. fig. 2. Mart. Conch. 1. tab. 16. fig. 151, 154.

Onchide. *Onchidium.* Corps oblong, ram-

pant; tête munie de deux appendices auri-formes et de deux tentacules; manteau débordant également de tous côtés; bouche antérieure; anus à l'extrémité postérieure et en dessous.

*Onchidium tiphæ.* Soc. Linn. de Londres, 5, pag. 152.

Tritonie. *Tritonia.* Corps oblong, rampant, pointu postérieurement, convexe en dessus, applati ou canaliculé en dessous, ayant la bouche à une extrémité environnée de quelques tentacules : branchies saillantes disposées le long du dos en écailles, ou en tubercules, ou en panaches vasculaires.

*Doris clavigera.* Linn. Encycl. tab. 82. fig. 79. Muller, Zool. Dan. 1. tab. 17. fig. 1, 5.

*Doris.* Corps oblong, rampant, applati, bordé tout autour d'une membrane qui s'étend jusqu'au-dessus de la tête; bouche en dessous vers une extrémité; anus au bas du dos, découpé, frangé ou ailé sur les bords par les branchies qui l'entourent.

*Doris argo.* Linn. Boadsch. Mar. tab. 5. fig. 4, 5, Encyclop. tab. 82. fig. 18, 19.

Phyllidie. *Phyllidia.* Corps ovale, oblong, rampant, convexe en dessus, et couvert d'un écusson ou manteau coriace, variqueux, tuberculeux, qui le déborde partout; branchies disposées en feuillets membraneux, placés à la file les uns des autres autour du corps, sous le rebord du manteau.

Oscabrion. *Chiton.* Corps ovale-oblong, rampant, convexe en dessus, et couvert d'un manteau qui débord de tous côtés, et qui est garni dans son milieu d'une suite longitudinale de pièces testacées, imbriquées, transverses, enchâssées dans son épaisseur, et plus ou moins apparentes au-dehors; les branchies placées sur le rebord du manteau tout autour du corps, forment une suite de petits feuillets vasculaires rangés à la file les uns des autres.

*Chiton gigas.* Linn. Chemn. Conch. tab. 96. fig. 819. Encyclop. tab. 161. fig. 5.

DEUXIÈME SECTION. — Mollusques céphalés extérieurement conchylifères.

Ces mollusques sont ceux qui sont constamment recouverts par une véritable coquille, ou qui se trouvent contenus plus ou moins complètement dans une coquille bien apparente à l'extérieur. Dans l'un ou l'autre cas, l'animal est attaché à sa coquille par un ou plusieurs muscles, et ces coquilles sont d'une seule pièce.

*Première sous-division.* — Coquille recouvrante; coquille univalve, non spirale, recouvrant simplement l'animal.

Patelle. *Patella*. Coquille univalve, non spirale, ovale ou sub-orbulaire, en bouclier ou en bonnet, concave, et simple en dessous, entière à son sommet et sans fissure à son bord.

Patellier. Gastéropode à tête tronquée obliquement, munie de deux tentacules pointues; les yeux à la base extérieure des tentacules; les branchies placées autour du corps sous le rebord du manteau.

*Patella testudinaria*. Linn. Dargenv. pl. 2. fig. P. Lister. tab. 551. fig. 9.

Fissurelle. *Fissurella*. Coquille en bouclier sans spire quelconque, concave en dessous et percée au sommet d'un trou ovale ou oblong.

Fissurellier. Gastéropode ayant la tête, les yeux et les tentacules comme le patellier; ayant en outre le disque ventral frangé, la frange du bord du manteau composé de filets rameux.

*Patella nimbose*. Linn. Mart. Conch. 1. tab. 11. fig. 90. Favanne, pl. 3. fig. A. 4.

Emarginule. *Emarginula*. Coquille en bouclier conique, à sommet incliné, concave en dessous et à bord postérieur fendu ou échancré.

*Patella fissura*. Linn. Mart. Conch. 1. tab. 12. fig. 109 et 110. Dacosta Brit. Zool. tab. 1. fig. 4.

Concholepas. *Concholepas*. Coquille univalve, ovale, convexe en-dessus, à sommet obliquement incliné sur le bord gauche; la

cavité intérieure simple; deux dents et un sinus à la base du bord droit.

Concholepadié. Gastéropode portant un opercule corné.

Dargenville pl. 6. fig. 2. *Buccinum concholepas*. Brug. Encycl.

Crepidule. *Crepidula*. Coquille ovale ou oblongue, convexe en dessus, à sommet incliné sur le bord; la cavité interrompue partiellement par un diaphragme simple.

Crépidulier. (Voyez Sulin. Adanson, page 40.)

*Patella porcellana*. Linn. Mart. Conch. 1. tab. 13. fig. 127 à 130. Lister. tab. 545. fig. 34. vulg. la Sandale.

Calyptrée. *Calyptrea*. Coquille conoïde, à sommet vertical, entier et en pointe. La cavité intérieure munie d'une languette en cornet, tantôt isolée, et tantôt s'épanouissant d'un côté en une lame décurrente en spirale.

Calyptrier...

*Patella equestris*. Linn? Martin. Conch. 1.

tab. 13. fig. 117, 118. Rumph. Mus. tab. 40. fig. P. Q. Dargenv. pl. 2. fig. K.

Seconde sous-division. — Coquille univalve, uniloculaire, spirivalve, engainant ou contenant l'animal.

Ouverture échancrée ou canaliculée à sa base.

Cône. *Conus*. Coquille turbinée (en cône renversé), roulée sur elle-même; ouverture longitudinale, étroite, non dentée, versante à sa base.

Conilier. Gastéropode à tête munie de deux tentacules qui portent les yeux près de leur pointe; manteau étroit; un tube au-dessus de la tête pour la respiration; un pied muni d'un opercule petit, arrondi et corné.

*Conus marmoreus*. Linn. Lister. tab. 787. fig. 39. Gualt. tab. 22. fig. D. Encycl. tab. 317. fig. 5.

Porcelaine. *Cypræa*. Coquille ovale, convexe, à bords roulés en dedans; ouverture longitudinale, étroite, dentée des deux côtés.

Cyprinier. Gastéropode à tête munie de

deux tentacules qui portent des yeux à leur bord extérieur; manteau formant deux grandes ailes que l'animal replie à volonté sur le dos de sa coquille, la recouvrant en entier: point d'opercule.

*Cypræa exanthema*. Linn. Lister. tab. 699. fig. 46. Martini. Conch. 1. tab. 28. fig. 289. et tab. 29. fig. 298 à 300. Encycl. tab. 349. fig. A. B. C. D. E.

Ovule. *Ovula*. Coquille bombée, plus ou moins allongée en pointe aux deux bouts, à bords roulés en dedans: ouverture longitudinale non dentée sur le bord gauche.

Ovulier....

*Bulla ovum*. Linn. Lister. Conch. tab. 711. fig. 65. Dargenv. pl. 18. fig. A. Rumph. Mus. tab. 38. fig. Q. Mart. Conch. 1. tab. 22. fig. 205 et 206. Encyclop. tab. 358. fig. 1.

Tarrière. *Terebellum*. Coquille subcylindrique, pointue au sommet; ouverture longitudinale, étroite supérieurement, échancrée à sa base; columelle tronquée.

Terebellier...

*Bulla terebellum*. Linn. Lister. tab. 736.

fig. 30, 31. Mart. Conch. 2. tab. 51. fig. 568, 569. Encycl. tab. 360. fig. 1.

Olive. *Oliwa*. Coquille subcylindrique, échancrée à sa base; les tours de spire séparés par un canal; columelle striée obliquement.

Olivetier. Gastéropode à tête munie de deux tentacules longues, aiguës; les yeux situés vers le milieu des tentacules; un tube au-dessus de la tête pour la respiration: point d'opercule.

*Voluta porphyria*. Lin. Dargenv. pl. 15. fig. K. Gualt. tab. 24. fig. P. Encyclop. tab. 361. fig. 4, A. B.

Ancille. *Ancilla*. Coquille oblongue, à spire courte, non canaliculée: base de l'ouverture à peine échancrée, versante; un renflement ou un bourrelet oblique et calleux au bas de la columelle.

Ancillier.....

*Voluta*. Mart. tab. 65. fig. 731.

Volute. *Voluta*. Corps ovale, plus ou moins ventru, à sommet obtus ou en mamelon, à

base échancrée et sans canal; columelle chargée de pli, dont les inférieurs sont les plus gros et les plus longs.

Volutier. Gastéropode à tête munie de deux tentacules pointues; les yeux à base extérieure; bouche en trompe alongée, cylindrique et rétractile, garnie de petites dents crochues; un tube pour la respiration, saillant obliquement derrière la tête; pied fort ample: point d'opercule.

*Voluta musica*. Linn. Dargenv. pl. 14. fig. F. Lister. tab. 805. fig. 14. Gualt. tab. 28. fig. X. Encycl. tab. 580.

Mitre. *Mitra*. Coquille turriculée ou subfusiforme, à spire pointue au sommet, à base échancrée et sans canal; columelle chargée de plis, dont les inférieurs sont les plus petits.

Mitrier.....

*Voluta episcopalis*. Linn. Dargenv. pl. 9. fig. C. Gualt. tab. 55. fig. G. Encyclop. tab. 569. fig. 2.

Colombelle. *Columbella*. Coquille ovale, à

spire courte, à base de l'ouverture plus ou moins échancrée et sans canal; un renflement à la partie interne du bras droit; des plis et des dents à la columelle.

Colombellier. Gastéropode à tête munie de deux tentacules portant les yeux au-dessous de leur partie moyenne; manteau formant un tube au-dessus de la tête pour la respiration; le pied muni d'un petit opercule fort mince.

*Voluta mercatoria*. Linn. Lister. Conch. tab. 824. fig. 45. Marti Conch. tab. 44. fig. 452 à 458.

Marginelle. *Marginella*. Coquille ovale-oblongue, lisse, à spire courte et à bord droit reborbé en dehors; base de l'ouverture plus ou moins échancrée; des plis à la columelle.

Marginellier. Gastéropode à deux tentacules pointues, portant les yeux près de leur base extérieure; bouche en trompe rétractile; un tube se prolongeant au-dessus de la tête pour la respiration; le disque ventral dépassant postérieurement la coquille: point d'opercule.

*Voluta glabella*. Linn. Adans. pl. 4. fig. 1.

Lister. Conch. 2. tab. 818. fig. 29 et 31.  
Mart. Conch. tab. 42. fig. 429.

Cancellaire. *Cancellaria*. Coquille ovale ou subturriculée à bord droit, sillonnée intérieurement; base de l'ouverture presque entière et un peu en canal; quelques plis comprimés ou tranchans sur la columelle.

Cancellier.....

*Voluta cancellata*. Linn. Lister. tab. 830. fig. 52. Martini. Conch. 3 tab. 121. fig. 1107. à 1109.

Nasse. *Nassa*. Coquille ovale, ouverture se terminant inférieurement par une échancrure oblique, qui remonte postérieurement; bord gauche calleux, formant sur la columelle, qu'il recouvre, une base ou un pli transverse dans sa partie supérieure, et ayant sa base obliquement tronquée.

Nassier. Gastéropode à disque ventral, élargi et tronqué antérieurement, et se prolongeant au-delà de la tête, formé par le manteau.

*Buccinum arcularia*. Linn. Lister. Conch.

tab. 970. fig. 24 et 25. Mar. Conch. 2. tab. 41. fig. 409. à 412.

Pourpre. *Purpura*. Coquille ovale, le plus souvent tuberculeuse ou épineuse; ouverture se terminant inférieurement en un canal très court, oblique, échancré à l'extrémité; columelle nue, aplatie surtout inférieurement et finissant en pointe à sa base.

Pourprier. Gastéropode à disque ventral elliptique plus court que la coquille; deux tentacules pointues, portant les yeux dans leur partie moyenne extérieure; manteau formant pour la respiration, un tube qui passe obliquement au-dessus de la tête; un opercule cartilagineux et semi-lunaire.

*Buccinum persicum* Linn. Lister Conch. tab. 987. fig. 46. Dargenv. pl. 17. fig. E. Martin. Conch. 3. tab. 69. fig. 560.

Buccin. *Buccinum*. Coquille ovale ou alongée; ouverture oblongue, échancrée inférieurement et sans canal; échancrure découverte antérieurement; columelle pleine, sans aplatissement à sa base.

Buccinier. Gastéropode à pied elliptique,



plus court que la coquille; deux tentacules coniques, portant des yeux à leur base extérieure; manteau formant, pour la respiration, un tube qui passe par l'échancrure de la base de la coquille et se prolonge au-dessus de la tête de l'animal; un opercule cartilagineux.

*Buccinum undatum*. Linn. Lister. Conch. tab. 962. fig. 14. Mart. Conch. 4 tab. 126. fig. 1206 à 1209.

Eburne. *Eburna*. Coquille ovale ou allongée, lisse, à bord droit très-entier; ouverture oblongue, échancrée inférieurement; columelle ombiliquée, subcanaliculée à sa base.

Eburnier.....

*Buccinum glabratum*. Linn. Lister. tab. 974. fig. 9. Gualteri. tab. 43. fig. T. Martini, Conch. 4. tab. 122. fig. 1117. Vulg. Fivoire.

Vis. *Terrebra*. Coquille turriculée; ouverture échancrée inférieurement et au moins deux fois plus courte que la coquille; base de la columelle torse ou oblique.

Vissier. Gastéropode rampant sur un disque ventral beaucoup plus court que la coquille; deux tentacules pointues, portant les

yeux à leur base extérieure; manteau formant un tube qui sort par l'échancrure de la coquille, et se dirige obliquement au-dessus de la tête de l'animal: point d'opercule.

*Buccinum maculatum*. Linn. Gualt. tab. 56. fig. I. Dargenv. tab. 11. fig. A. Martin. Conch. 4. tab. 153. fig. 1440.

Tonne. *Dolium*. Coquille ventrue, subglobuleuse, cerclée transversalement, à bord droit denté ou crénelé dans toute sa longueur; ouverture oblongue, très-ample, échancrée inférieurement.

Tonnier....

*Buccinum galea*. Linn. Lister. Conch. tab. 898. fig. 18. Gualteri. tab. 42. fig. A. A. Mart. Conch. 3. tab. 116. fig. 1070.

Harpe. *Harpa*. Coquille ovale ou bombée, munie de côtes longitudinales parallèles ou tranchantes; ouverture oblongue, ample, échancrée inférieurement et sans canal; columelle lisse, à base terminée en pointe.

Harpier....

*Buccinum harpa*. Linn. Lister. Conch. tab.

992. fig. 55. Martini. Conch. 3 tab. 119. fig. 1090.

Casque. *Cassis*. Coquille bombée; ouverture plus longue que large, terminée à sa base par un canal court, recourbée vers le dos de la coquille; un bourrelet au bord droit; columelle plissée inférieurement.

Cassidier. Gastéropode à tête munie de deux tentacules qui portent les yeux à leur base extérieure; manteau formant, pour la respiration, un tube qui sort par l'échancrure canaliculée de la coquille; un opercule cartilagineux attaché au pied de l'animal.

*Buccinum cornutum*. Linn. Lister. Conch. tab. 1006. fig. 70 et 1008. fig. 71. B. Gualteri, tab. 40. fig. D.

Strombe. *Strombus*. Coquille ventrue, terminée à sa base par un canal court, échancré ou tronqué; bord droit se dilatant avec l'âge en aile simple, entière ou à un seul lobe, et ayant inférieurement un sinus distinct de l'échancrure de sa base.

Strombier.....

*Strombus pugilis*. Linn. Lister. Conch. tab. 863. fig. 18. Gualt. tab. 52. fig. B. Dargenv. pl. 15. fig. A. Martini. Conch. 3 tab. 81. fig. 850, 851.

Pterocère. *Pterocera*. Coquille ventrue, terminée inférieurement par un canal alongé; bord droit, se dilatant avec l'âge en aile digitée, et ayant un sinus vers sa base.

Pterocerier.....

*Strombus lambis*. Linn. Rumph. Mus. tab. fig. E. F. H. Gualt. tab. 35. fig. C. et tab. 36. fig. A. B. Martini. Conch. 3 tab. 86. fig. 855. et tab. 87. fig. 857 et 858.

Rostellaire. *Rostellaria*. Coquille fusiforme, terminée inférieurement par un canal en bec pointu; bord droit, entier ou dilaté, plus ou moins édenté en aile avec l'âge, et ayant un sinus contigu au canal.

Rostellier.....

Rocher. *Murex*. Coquille ovale ou oblongue, canaliculée à sa base, et ayant constamment à l'extérieur des bourrelets longitudinaux, persistants, le plus souvent tuberculeux, épineux ou frangés.

Muricier. Gastéropode rampant sur un disque ventral, muni d'un petit opercule corné; tête à deux tentacules pointues, ayant les yeux situés à la base extérieure: bouche en trompe rétractile, manteau terminé antérieurement par un prolongement tubuleux.

*Murex austellum*. Linn. List. Conch. tab. 903. fig. 23. Dargenv. pl. 16. fig. B. Martin. Conch. 3. tab. 115. fig. 1066. vulg. la Bécasse.

Fuseau. *Fusus*. Coquille subfusiforme, canaliculée à sa base, ventrue dans sa partie moyenne ou inférieurement, ayant la spire allongée et dépourvue de bourrelets persistans à l'extérieur; columelle lisse: bord droit sans échancrure.

*Murex colus*. Linn. Rumph. Mus. tab. 29. fig. F. Lister. Conch. tab. 918. fig. 11. A. Gualt. tab. 52. fig. L. Mart. Conch. 4. tab. 144. fig. 1342.

Pyrule. *Pyruca*. Coquille subpiriforme, canaliculée à sa base, ventrue dans sa partie supérieure, à spire courte et sans bourrelets

constans à l'extérieur; columelle lisse; bord droit sans échancrure.

Pyruquier....

*Bulla ficus*. Linn. Gualt. tab. 26. fig. I. M. Dargenv. tab. 17. fig. O. Mart. Conch. tab. 66. fig. 735 à 735. vulg. la Figue.

Fasciolaire. *Fasciolaria*. Coquille subfusiforme, canaliculée à sa base, sans bourrelets persistans, et ayant sur la columelle deux à trois plis très obliques.

Fasciolier....

*Murex tulipa*. Linn. Lister. Conch. tab. 910. fig. 1 et 911. fig. 2. Gualt. 46. fig. A. Mart. Conch. 4. tab. 136. fig. 1286 et 1287, et tab. 137.

Turbinelle. *Turbinellus*. Coquille turbinée ou subfusiforme, canaliculée à sa base, et ayant sur la columelle trois à cinq plis comprimés et transverses.

Turbinellier. Gastéropode à tête munie de deux tentacules obtuses, et en massue, ayant les yeux à leur base extérieure, et saillans; manteau terminé par un prolongement plié

en tube; un petit opercule corné et suborbiculaire attaché au pied de l'animal.

*Voluta pyrum*. Linn. Lister. Conch. tab. 815. fig. 25. Gualt. tab. 46. fig. C. Mart. Conch. 3. tab. 95. fig. 917, 918. Chemn. 9. tab. 104. fig. 884 et 885, et 11. tab. 176. fig. 1697, 1698.

Pleurotome. *Pleurotoma*. Coquille fusiforme, ayant l'ouverture terminée inférieurement par un canal allongé, une entaille, ou une échancrure au bord droit, près de son sommet.

Pleurotomier. Gastéropode rampant sur un disque allongé et élevé au-dessus de ce disque sur un pédicule court, épais et cylindrique, tête à deux tentacules pointues, ayant les yeux à leur base extérieure; manteau débordant sur les côtés, et terminé antérieurement par un prolongement plié en tube; un petit opercule corné, attaché au pied ou disque de l'animal.

*Murex babylonicus*. Linn. List. Conch. tab. 917. fig. 11. Dargenv. tab. 19. fig. M. Mart. Conch. 4. tab. 145. fig. 1331 et 1332.

Clavatule. *Clavatula*. Coquille subturriculée, scabre, avant l'ouverture terminée inférieurement par un canal court ou par une échancrure; un sinus au bord droit près de son sommet.

Clavatulier...

Chem. Conch. 11. tab. 190. fig. 1831 et 1832.

Cerite. *Cerithium*. Coquille turriculée; l'ouverture oblique, terminée à sa base par un canal court, tronqué ou recourbé; une gouttière à l'extrémité supérieure du bord droit.

Ceritier. Gastéropode rampant sur un disque suborbiculaire, petit, bordé du côté de la tête par un sillon; tête tronquée en dessous, bordée d'un bourrelet frangé, et munie de deux tentacules aiguës, ayant les yeux près de leur base externe; un petit opercule orbiculaire et corné, attaché au pied de l'animal.

*Murex aluco*. Linn. List. Conch. tab. 1025. fig. 87. Gualt. tab. 57. fig. G. Mart. Conch. 4. tab. 156. fig. 1473 et 1474.