

*Ouverture entière et sans canal à sa base.*

Toupie. *Trochus*. Coquille conique, l'ouverture presque quadrangulaire, déprimée transversalement; axe oblique sur le plan de la base.

Trochier. Gastéropode à disque ventral, bordé ou frangé dans son contour, et muni d'un petit opercule orbiculaire, mince et corné, qui se plie en rentrant dans l'ouverture de la coquille; deux tentacules émoussées à leur sommet, pourtant les yeux à leur base extérieure.

*Trochus niloticus*. Linn. Rumph. Mus. tab. 21. fig. A. Gualt. tab. 59. fig. B. C. Favanne. tab. 12. fig. B. 1. vulg. le Cul-de-lampe.

Cadran. *Solarium*. Coquille en cône déprimé, ayant dans sa base un ombilic ouvert, crénelé sur le bord interne des tours de spire: ouverture presque quadrangulaire.

Cadranier....

*Trochus perspectivus*. Linn. Lister. Conch. tab. 636. fig. 24. Dargenv. pl. 8. fig. M. Chemn. 5. tab. 179. fig. 1691. à 1694.

Sabot. *Turbo*. Coquille conoïde ou turriculée; l'ouverture arrondie, entière et sans dents à la columelle; les deux bords désunis dans leur partie supérieure.

Sabotier. Gastéropode rampant sur un disque ventral obtus aux deux bouts, et plus courts que la coquille; deux tentacules ayant les yeux à leur base extérieure; un opercule semi-lunaire, mince et corné, attaché au pied de l'animal.

*Turbo marmoratus*. Linn. List. Conch. tab. 587. fig. 46. Gualt. tab. 64. fig. A. Favanne. pl. 8. fig. K. Chemn. 5. tab. 179. fig. 1675, 1776. vulg. le Burgau.

Monodonte. *Monodonta*. Coquille ovale ou conoïde; l'ouverture arrondie, entière, mais munie d'une dent formée par la base saillante et tronquée ou raccourcie de la columelle: les deux bords désunis supérieurement.

Monodontier. Gastéropode rampant sur un disque ventral, elliptique, court, cilié, et accompagné latéralement de quelques filets extensibles, pareillement ciliés. Deux tentacules longues, aiguës, couvertes de filets pilifor-

mes; et ayant à leur base extérieure les yeux élevés sur des pédicules courts. Un opercule orbiculaire, mince et corné, attaché au pied de l'animal.

*Trochus labio*. Linn. Adanson. pl. 12. fig. 2. Born. Mus. cæs. vind. tab. 12. fig. 7, 8. Chemn. 5. tab. 166. fig. 1979.

Cyclostome. *Cyclostoma*. Coquille subdiscoïde ou conique, sans côtes longitudinales, et dont le dernier tour est beaucoup plus grand que les autres; ouverture ronde ou presque ronde; les deux bords réunis circulairement.

Cyclostomier....

*Turbo delphinus*. Linn. Dargenville, tab. 6. fig. H. Gualt. tab. 68. fig. C. Chemn. Conch. 5. tab. 175. fig. 1733. à 1735.

Scalaire. *Scalaria*. Coquille subturriculée, garnie de côtes longitudinales, élevées, tranchantes, décurrentes un peu obliquement dans toute la longueur de la spire; ouverture arrondie; les deux bords réunis circulairement et réfléchis.

Scalairier. Gastéropode à tête munie de deux tentacules, qui se terminent chacune

par un filet, et qui soutiennent les yeux à la naissance du filet, c'est-à-dire, à peu près dans leur partie moyenne; une trompe rétractile, en forme de languette; un petit opercule en spirale discoïde.

*Turbo scalaris*. Linn. Rumph. Mus. tab. 49. fig. A. Dargenville, pl. 11. fig. V. Mart. Conch. 4. tab. 152. fig. 1426, 1427, et tab. 153. fig. 1432, 1433. vulg. la Scalata.

Maillot. *Pupa*. Coquille cylindracée, à spire allongée, et dont le premier tour n'est pas plus grand que le pénultième; ouverture irrégulière, arrondie ou ovale; les deux bords réunis circulairement.

Maillotier.

*Turbo uva*. Linn. Pétiv. Gaz. tab. 27. fig. 2. Gualt. tab. 58. fig. D. Born. Mus. cæs. vind. page. 340. Vign. fig. E.

Turritelle. *Turritella*. Coquille turriculée; l'ouverture arrondie, et ayant les deux bords désunis supérieurement: bord droit, muni d'un sinus.

Turritellier....

*Turbo terebra*. Linn. Gualt. tab. 58. fig. A. Dargenv. pl. 11. fig. D. Mart. Conch. 4. tab. 151. fig. 1415, 1416.

Janthine. *Janthina*. Coquille subglobuleuse, diaphane; l'ouverture triangulaire; un sinus anguleux au bord droit.

Janthinier. Gastéropode nageant, ayant quatre tentacules subulées, et une espèce de trompe. Au lieu d'un disque ventral, il a, à la partie antérieure de son corps, une masse membraneuse transparente, qu'il enfle à son gré, et transforme en un amas de vésicules bulleuses qui l'aide à nager.

*Helix janthina*. Linn. Lister, Conch. tab. 572. fig. 24. Brown. Jam. tab. 59. fig. 2. Chemn. Conch. 5. tab. 166, fig. 1577 et 1578.

Bulle. *Bula*. Coquille bombée, à spire non saillante et à bord droit, tranchant. Ouverture aussi longue que la coquille: point d'ombilic inférieurement.

Bullier... (*Voyez ci-devant le genre Bullee.*)

*Bulla ampulla*. Linn. Lister, Conch. 715. fig. 69. Gualt. tab. 12. fig. E. Mart. Conch. 1. tab. 21. fig. 188, 189 et 190, vulg. la Muscade.

Bulime. *Bulimus*. Coquille ovale ou oblongue, ayant le dernier tour de la spire plus grand que le pénultième. Ouverture entière, plus longue que large: columelle lisse, sans troncation et sans évasement à sa base.

Bulimier. Gastéropode à quatre tentacules, dont les deux plus grandes sont terminées par les yeux. Bouche courte avec deux mâchoires; point d'opercule.

*Bulimus hæmastomus*. Scop. Deliciæ insubricæ, tab. 25. fig. 1, 2. B. Born. Mus. cæs. vind. tab. 15. fig. 21, 22. Mart. Conch. 9. tab. 119. fig. 1022, 1023. vulg. la fausse Oreille de Midas.

Agathine. *Achatina*. Coquille ovale ou oblongue: l'ouverture entière, plus longue que large; columelle lisse, tronquée à sa base.

Agathinier. Gastéropode à quatre tentacules.

*Bulla achatina*. Linn. Lister, Conch. tab. 579. fig. 54. Gualt. tab. 45. fig. B. Chemn. 9. tab. 118. fig. 1012 et 1013. vulg. la Perdrix.

Lymnée. *Lymnæa*. Coquille oblongue sub-turriculée; l'ouverture entière, plus longue que large. Partie inférieure du bord droit, remontant en rentrant dans l'ouverture, et formant sur la columelle un pli très-oblique.

Lymnier. Gastéropode fluviatile à tête munie de deux tentacules aplatis; les yeux à la base intérieure des tentacules.

*Helix stagnalis*. Linn. Lister, Conch. tab. 125. fig. 21. Chemn. Conch. 9. tab. 135. fig. 1257, 1258. Le grand Buccin, Geoff. Coquilles, pages 73.

Mélanie. *Melania*. Coquille turriculée : l'ouverture entière, plus longue que large, évasée à la base de la columelle; aucun pli sur la columelle.

Mélanier....

*Helix amarula*. Linn. Rumph. Mus. tab.

35. fig. F. F. Born. Mus. tab. 16. fig. 21. Chemn. 9. tab. 154. fig. 1218, 1219.

Pyramidelle. *Pyramidella*. Coquille turriculée : l'ouverture entière, demi-ovale; columelle saillante, munie de trois plis transverses, et perforée à sa base.

Pyramidellier...

*Trochus dolabratus*. Linn. Dargenv. pl. 11. fig. L. Mart. Conch. tab. 167. fig. 1603, 1604.

Auricule. *Auricula*. Coquille ovale ou oblongue, à spires saillante : l'ouverture entière, plus longue que large, rétrécie supérieurement. Un ou plusieurs plis sur la columelle, indépendans de la décurrence du bord droit sur la base du bord gauche.

Auriculier....

*Voluta auris Midae* Linn. List. Conch. tab. 1058. fig. 6. Rumph. Mus. tab. 33. fig. H. H. Dargenv. pl. 10. fig. G. Favanne, pl. 65. fig. H. 2. Mart. Conch. 2. tab. 43. fig. 436, 438. vulg. l'Oreille de Midas.

Volvaire. *Volvaria*. Coquille cylindrique

roulée sur elle-même, sans spire saillante. Ouverture étroite, aussi longue que la coquille. Un ou plusieurs plis sur la base de la columelle.

Volvaier...

Pennant, Brit. Zool. 4. tab. 70. fig. 85. et Dacosta, Conch. Brit. tab. 2. fig. 7.

Ampullaire. *Ampullaria*. Coquille globuleuse, ventrue, ombiliquée à sa base, sans callosités au bord gauche. Ouverture entière, plus longue que large.

Ampullairier. Gastéropode fluviatile, muni d'un opercule corné.

*Helix ampullaria*, variet. B. Linn. List. Conch. 1. tab. 125. fig. 25. Favanne, pl. 61. fig. D. 10. Martin. 9 tab. 128. fig. 1136. vulg. l'Idole.

Planorbe. *Planorbis*. Coquille discoïde, à spire non saillante, aplatie ou enfoncée : l'ouverture entière plus longue que large, échancrée latéralement par la saillie convexe de l'avant-dernier tour.

Planorbier. Gastéropode fluviatile, ayant

deux tentacules cylindriques subulées, et les yeux à la base interne des tentacules.

*Helix cornu arietis*. Linn. List. Conch. tab. 136. fig. 40. Chem. Conch. 9. tab. 112. fig. 952 et 953.

Hélice. *Helix*. Coquille globuleuse ou orbiculaire, à spire convexe ou conoïde. Ouverture entière, plus large que longue, échancrée supérieurement par la saillie convexe de l'avant-dernier tour.

Hélicier. Gastéropode à tête munie de quatre tentacules inégales; les yeux au sommet des deux plus grandes. Bouche courte, à deux mâchoires. Point de tube pour la respiration; point d'opercule adhérent au pied.

*Helix pomatia*. Linn. Lister, Conch. tab. 48. fig. 46. Dargenv. Conch. tab. 28; fig. 1. vulg. l'Escargot ou le Limaçon des vignes.

Hélicine. *Helicina*. Coquille sub-globuleuse, non ombiliquée. Ouverture entière, demi-ovale; columelle calleuse, comprimée inférieurement : un opercule.

Hélicinier...

*Helicina neritella*. List. Conch. tab. 61. fig. 59.

Nérite. *Nerita*. Coquille semi-globuleuse, aplatie en dessous, non ombiliquée. Ouverture entière, demi-ronde : columelle sub-transverse, tranchante, souvent dentée.

Néritier. Gastéropode à tête rétuse, munie de chaque côté de deux tentacules pointues : les yeux à la base extérieure des tentacules, élevés chacun sur un mamelon. Pied large, plus court que la coquille : un opercule taillé en demi-lune.

*Nerita cauvia*. Linn. Favanne, pl. 11. fig. M. Chemn. Conch. 5. tab. 191. fig. 1972, 1973. et tab. 190. fig. 1944, 1945. vulg. la Grive.

Natrice. *Natica*. Coquille sub-globuleuse, ombiliquée, à bord gauche calleux vers l'ombilic. Ouverture entière, demi-ronde, la columelle oblique, non dentée.

Naticier. Gastéropode à tête cylindrique, échancrée par un sillon, portant deux tentacules longues et pointues : les yeux sessiles à

la base extérieure des tentacules. Pied plus court que la coquille : un opercule en demi-lune.

*Nerita carena*. Linn. Lister, Conch. tab. 560. fig. 4. Gualteri, tab. 67. fig. V et X. Dargenville, pl. 7. fig. A. Chemn. Conch. 5. tab. 186. fig. 1860 et 1861.

Testacelle. *Testacella*. Coquille univalve, en cône oblique, à sommet un peu en spirale. Ouverture ovale, à bord gauche roulé en dedans.

Testacellier. Gastéropode allongé, à tête munie de quatre tentacules inégales, et portant, près de son extrémité postérieure, une coquille trop petite pour la contenir en entier.

Favanne, pl. 76. Limace à coquille.

Stomate. *Stomatia*. Coquille ovale, auriforme, à spire proéminente. Ouverture ample, entière, plus longue que large ; disque imperforé.

Stomatier...

*Haliotis imperforata*. Chemn. Conch. 10. tab. 166, fig. 1600 et 1601.

Haliotide. *Haliotis*. Coquille aplatie, auriforme, à spire très-basse, presque latérale. Ouverture très ample, plus longue que large, entière : disque percé de trous disposés sur une ligne parallèle au bord gauche.

Haliotidier. Gastéropode à tête conique, tronquée, munie de quatre tentacules, dont deux plus grandes et pointues, deux plus courtes, portant les yeux à leur extrémité : le pied fort ample ; tout le bord du manteau garni de filets nombreux.

*Haliotis tuberculata*. Linn. Lister, Conch. tab. 611. fig. 2. Dargenville, pl. 3. fig. A. F. Martini, Conch. 1. tab. 16. fig. 147 à 149. vulg. l'Oreille-de-mer.

Vermiculaire. *Vermicularia*. Coquille tubuleuse, contournée en spirale à son origine, et entière dans toute sa longueur. Ouverture simple et orbiculaire.

Vermiculier. Mollusque céphalé, vermiculiforme, à tête tronquée, munie de deux ten-

tacules qui portent les yeux à leur base extérieure. Pied cylindrique, inséré au-dessous de la tête, portant latéralement deux filets, et à son extrémité, un opercule mince et orbiculaire.

*Serpula lumbricalis*. Linn. List. Conch. tab. 548. fig. 1. Gualt. tab. 10. fig. q, V. Dargenv. pl. 4. fig. I.

Siliquaire. *Siliquaria*. Coquille tubuleuse, contournée, en spirale à son origine, irrégulière et divisée latéralement, sur toute sa longueur, par une fente étroite.

Siliquaire.....

*Siliquaria anguina*. Davila, Catal. pl. 4. fig. E.

Arrosoir. *Penicillus*. Coquille tubuleuse, adhérente, rétrécie, et un peu en spirale à son origine, dilatée en massue vers l'autre extrémité. Disque terminal, convexe, garni de petits tubes perforés.

Penicillier..... Est-ce un mollusque ?

*Serpula penis*. Linn. Dargenv. pl. 3. fig. G. List. Conch. tab. 548. fig. 3. Martini, Conch. 1. tab. 1. fig. 7. Favanne, pl. 5. fig. B.

Carinaire. *Carinaria*. Coquille univalve, très-mince, en cône aplati sur les côtés, à sommet en spirale involute et très-petite, et à dos garni d'une carène dentée. Ouverture entière, ovale, oblongue, rétrécie vers l'angle de la carène.

Carinairier.....

*Patella cristata* Linn. *Argonauta vitrea*. Gmel. Dargenville, app. pl. 1. fig. B. Favanne, pl. 7. fig. C. Martini, Conch. 1. tab. 18. fig. 165.

Argonaute. *Argonauta*. Coquille univalve, très-mince, involute, naviculaire, à spire rentrant dans l'ouverture : carène dorsale, double et tuberculeuse.

Argonautier..... Ne peut être un poulpe.

*Argonauta argo*. List. Conch. tab. 556. fig. 7. Rumph. Mus. tab. 18. fig. A. Dargenv. pl. 5 fig. A. Favanne, pl. 7. fig. A. 2. Martini, Conch. tab. 17. fig. 157.

Troisième sous-division — Coquille univalve, multiloculaire, engainant ou renfermant l'animal.

Nautilé. *Nautilus*. Coquille spirale, sub-

discoïde, dont le dernier tour enveloppe les autres, et dont les parois sont simples : loges nombreuses, formées par des cloisons transverses, simples, et dont le disque est perforé par un tube.

Nautilier. Mollusque céphalé, ayant postérieurement un appendice filiforme.

*Nautilus pompilius*. Linnæus, Rumph. Mus. tab. 17. fig. A. C. Gualteri, tab. 17 et 18. Dargenv. pl. 5. fig. E. F. Martini, Conch. 1. tab. 18. fig. 164. et tab. 19. fig. 165 et 166. vulg. le Nautilé chambré.

Orbulite. *Orbulites*. Coquille en spirale, subdiscoïde, dont le dernier tour enveloppe les autres, et dont les parois internes sont articulés par des sutures sinueuses. Cloisons transverses, lobées dans leur contour, et percées par un tube marginal.

Orbulitier....

*Ammonis cornu lave*. Lang. tab. 25. fig. 2, 3, 4, Bourguet, Traité des pétrif. tab. 48. fig. 511.

Ammonites. *Ammonites*. Coquille en spirale, discoïde, à tours contigus et tous apparens,

à parois internes, articulées par des sutures sinueuses. Cloisons transverses, lobées et découpées dans leur contour, et percées par un tube marginal.

Ammonitier....

*Ammonites bisculata*. Brug. List. Conch. angl. tab. 6. fig. 3. et Synops. tab. 1041. fig. 21. Lang. tab. 24. fig. 1. Bourguet, Pétrif. tab. 41. fig. 270.

Planulite. *Planulites*. Coquille en spirale, discoïde, à tours apparens et ayant les parois simples. Cloisons transverses, entières ou perforées.

Planulitier...

Corne d'Ammon à raies ondoyantes. Bourg. Pétrif. tab. 46. fig. 290.

Nummulite. *Nummulites*. Coquille lenticulaire, discoïde, à parois simples, recouvrant tous les tours : loges nombreuses, formées par des cloisons transverses, imperforées.

Nummulitier.

*Camerina*. Brug. pierre lenticulaire. Bourg. Pétrif. tab. 50. fig. 521. Hélicite, Gualt.

mém. 3. tab. 13 fig. 1 à 10. Knorr. foss. 11. tab. VII. n<sup>o</sup> 1, 12. Pierres numismales. Dargenv. Oryctol. pl. 8. fig. 10.

Spirulier. *Spirula*. Coquille partiellement ou complètement en spirale discoïde, à tours séparés; le dernier surtout s'allongeant en ligne droite. Cloisons transverses, simples, dont le disque est percé par un tube. Ouverture orbiculaire.

Spirulier....

*Nautilus spirula*. Linn. Dargenville, pl. 5. fig. G. Rumph. Mus. tab. 20. fig. 1. Mart. Conch. tab. 20. fig. 184 et 185. vulg. le Cornet de postillon.

Turrilite. *Turrilites*. Coquille en spirale, turbinée, à tours contigus et tous apparens, et à parois internes, articulées par des sutures sinueuses. Cloisons transverses, lobées et découpées dans leur contour, percées dans leur disque. Ouverture arrondie.

Corne d'Ammon turbinée. D. Montfort, Journal de Phys. thermidor an 7. tab. 1 fig. 1. *Turbinites langius*, tab. 32. fig. 6, 7. Bourg.

Pétrif. tab. 34. fig. 250 et 251. Chemn.  
Conch. 9. tab. 114. fig. 980. A. B.

Baculite. *Baculites*. Coquille droite, cylindracée, un peu conique, à parois internes, articulées par des sutures sinueuses. Cloisons transverses, imperforées, lobées et découpées dans leur contour.

Baculitier....

Faujas, foss. de Maestricht, tab. 21. fig. 2, 3.

Orthocère. *Orthocera*. Coquille droite ou arquée, un peu conique, loges distinctes, formées par des cloisons transverses, simples, perforées par un tube, soit central, soit latéral.

Orthocerier....

*Nautilus raphanus*. Linn. Gualteri, tab. 19. fig. L. M. Plencus, tab. 1. fig. 6.

Hippurite. *Hippurites*. Coquille conique, droite ou arquée, munie intérieurement de cloisons transverses et de deux arêtes longitudinales, latérales, obtuses et convergentes : la dernière loge fermée par un opercule.

Hippuritier....

*Orthoceratites*. Picot-la-Peyrouse, Monog. tab. 5. fig. 2. tab. 6. fig. 4. tab. 7. fig. 1 et 4.

Belemnite. *Belemnites*. Coquille droite, en cône allongé, pointue, pleine au sommet, et munie d'une gouttière latérale. Une seule loge apparente et conique, les anciennes ayant été successivement effacées par la contiguité et l'empilement des cloisons.

Belemnitier...

Breyn. Dissert. de Polythalam. tab. 1. fig. 1, 14. Klin, de *tubulis marinis*. tab. 8. fig. 2, 15.

ORDRE SECOND. *Mollusques acéphalés*. — Ils n'ont point de tête distincte, et tous sont dépourvus d'yeux, d'organes auditifs et d'organes de mastication. Ils produisent sans accouplement.

PREMIÈRE SECTION. — Mollusques acéphalés, nus.

Ascidie. *Ascidia*. Manteau fermé en forme de sac, ou cylindrique; irrégulier, fixé à sa

base, contenant le corps de l'animal, et terminé par deux ouvertures inégales, dont l'une est moins élevée que l'autre.

*Ascidia rustica*. Linn. Muller, Zool. Dan. 1. tab. 15. fig. 1, 5. Brug. Encycl. pl. 62. fig. 7 à 9.

Biphore. *Salpa*. Corps libre, oblong, creux, gélatineux, constitué par le manteau qui est fermé par devant, ouvert aux deux bouts, et qui enveloppe le corps de l'animal.

*Salpa maxima*. Forsk. Descript. anim. tab. 35. A. a. Encycl. tab. 74. fig. 2.

Mammaire. *Mammaria*. Corps libre, nu, globuleux ou ovale, terminé en dessus par une seule ouverture.

*Mammaria mamilla*. Gm. Syst. nat. Muller, Zool. Dan. prod. 2718.

DEUXIÈME SECTION. — Mollusques acéphalés, conchyliifères.

Première sous-division. — Coquille équivalve, c'est-à-dire, composée de deux valves égales, avec ou sans pièces accessoires.

Pinne. *Pinna*. Coquille longitudinale, cunéiforme, pointue à sa base, bâillante un peu

en son bord supérieur, et se fixant par un byssus. Charnière sans dents; ligament latéral, fort long.

Pinnier. Acéphale ne produisant aucun tube saillant. Il se fixe au-dehors par un byssus soyeux.

*Pinna rudis*. Linn. List. Conch. tab. 373. fig. 214. Chemn. 8. tab. 88. fig. 773. vulg. le Jambonneau rouge.

Moule. *Mytilus*. Coquille longitudinale, à crochets terminaux, droits, saillans et en pointes, et se fixant par un byssus. Une seule impression musculaire; charnière le plus souvent édentée.

Mytilier. Acéphale sans tube saillant, faisant sortir un pied étroit et linguiforme, lorsqu'il veut filer ou déplacer sa coquille.

*Mytilus edulis*. Linn. Lister, Conch. tab. 364. fig. 200. Pennant, Zool. Brit. 4. tab. 63. fig. 73. Chemn. 8. tab. 84. fig. 751. La Moule commune.

Modiole. *Modiola*. Coquille subtransverse, à côté postérieur extrêmement court, et à

crochets abaisés sur le côté court de la coquille. Une seule impression musculaire : charnière simple, sans dents.

Modiolier...

Dargenv. pl. 22. fig. C. Encycl. tab. 219. fig. 1. Chemn. 8. tab. 85. fig. 757.

Anodonte. *Anodonta*. Coquille transverse, ayant trois impressions musculaires; charnière simple, sans aucune dent.

Anodontier. Acéphale fluviatile, ne faisant saillir aucun tube, et ayant un pied musculaire, qu'il fait sortir en lame transversale.

*Mytilus anatinus*. Linn. Dargenv. pl. 27. fig. 10, au milieu inférieur. Pennant, Zool. Brit. 4. tab. 68. fig. 79. Encycl. pl. 202. fig. 1.

Mulette. *Unio*. Coquille transverse, ayant trois impressions musculaires. Une dent cardinale, irrégulière, calleuse, se prolongeant d'un côté sous le corselet, et s'articulant avec celle de la valve opposée.

Mulettier. Acéphale fluviatile, ne faisant saillir aucun tube, et ayant un pied musculaire, qu'il fait sortir en lame transverse.

*Mya margaritifera*, Linn. Gualteri, tab. 102. fig. C. List. tab. 149. fig. 4. Chemn. Conch. 6. tab. 1. fig. 5.

Nucule. *Nucula*. Coquille presque triangulaire ou oblongue, inéquilatérale. Charnière en ligne brisée, garnie de dents nombreuses, transverses et parallèles. Une dent cardinale, oblique et hors de rang; les crochets contigus et tournés en arrière.

Nuculier...

*Arca nucleus*. Linn. Petiver, Gaz. tab. 17. fig. 9. Gualt. tab. 88. fig. R. Chemn. 7. tab. 58. fig. 574. a, b. Encycl. tab. 511. fig. 5.

Petonce. *Pectunculus*. Coquille orbiculaire, sub-équilatérale, charnière en ligne courbe, garnie de dents nombreuses, sériales, obliques, articulées ou intrantes: ligament extérieur.

Petonceulier...

Dargenv. pl. 24. fig. B. Chemn. 7. tab. 58. fig. 568, 569. List. tab. 239. fig. 75.

Arche. *Arca*. Coquille transverse, inéquilatérale, à crochets écartés. Charnière en li-

gne droite, simple aux extrémités, et garnie de dents nombreuses, sériales, transverses, parallèles et intrantes : ligament extérieur.

Archier...

*Arca Noe*. Linn. List. tab. 368. fig. 208. Dargenv. pl. 25. fig. G. Gualt. tab. 87. fig. H. I.

Cuculée. *Cucullæa*. Coquille bombée, subtransverse ; inéquilatérale et crochets écartés. Charnière en ligne droite, ayant des dents nombreuses, sériales, transverses, intrantes, et à ses extrémités deux ou trois côtes parallèles : ligament extérieur.

Cucullier...

*Arca cucullus*. Gm. Syst. nat. Chemn. 7. tab. 53. fig. 526, 528. Encycl. tab. 504. K. foss. tab. 25. fig. 1, 2.

Trigonié. *Trigonia*. Coquille inéquilatérale, subtransverse : charnière à deux dents comprimées et intrantes ; lunule bâillante.

Trigonier...

Knorr. foss. tab. 17. fig. 8. Encycl. tab. 257. fig. 4.

Tridacne. *Tridacna*. Coquille inéquilatérale subtransverse ; charnière à deux dents comprimées et intrantes ; lunule bâillante.

*Chama gigas*. Linn. Rumph. Mus. tab. 43. fig. B. Gualt. tab. 92. fig. A. Chemn. 7. tab. 49. fig. 495. Encycl. pl. 255. fig. 1.

Hippope. *Hippopus*. Coquille inéquilatérale, subtransverse : charnière à deux dents comprimées et intrantes ; lunule pleine.

Hippopier...

*Chama hippopus*. List. tab. 349. fig. 187, et tab. 350. fig. 188. Rumph. Mus. tab. 43. fig. C. Dargenv. pl. 25. fig. H. Chemn. 7. tab. 50. fig. 498 et 499. Encycl. pl. 256. fig. 2. vulg. le Chou.

Cardite. *Cardita*. Coquille inéquilatérale : charnière à deux dents inégales, dont une courte, située sous les crochets, et une longitudinale, se prolongeant sous le corselet.

Carditier....

*Chama calyculata*. Lister, tab. 347. fig. 84. Favanne, pl. 50. fig. L. Chemn. 7. tab. 50. fig. 500, 501.