

*Mart. Univ. Conch. 2. tab. 26.*  
Se trouve dans l'île d'Otaïti.

Hélice crénelée, *Hel. crenata.*

Ronde, brune; les tours de spire en carène; l'ouverture sinueuse.

*Martyn, Univ. Conch. 2. tab. 69.*  
Se trouve à la Nouvelle-Zélande.

*A coquilles rondes et ombiliquées.*

Hélice cor-de-chasse, *Helix cornea.*

Aplatie, noire; quatre tours de spire.

*Lister, Conch. tab. 157. fig. 41. Exerc. anat. tab. 2. fig. 26. Gualteri, tab. 4. fig. D. D. Geoff. Test. Dargenv. pl. 27. fig. 2 et 8. et Zoomorph. pl. 8. fig. 7. Chemnitz, Conch. 9. tab. 127. fig. 113. 1120. Le grand planorbe, Geoff. Coq. 1.*

Voyez pl. 29, fig. 3, où elle est représentée de grandeur naturelle, avec son animal.

Se trouve très communément dans les eaux stagnantes, en Europe et en Asie.

Hélice spirorbe, *Hel. spirorbis.*

Aplatie, blanche, concave des deux côtés, avec cinq tours de spire.

*Martini, Berl. mag. tab. 4. 7. fig. 20. Le petit planorbe, Geoff. Coq. 2.*

Se trouve en Europe: dans les eaux stagnantes: elle n'est pas rare aux environs de Paris.

Hélice polygyre, *Hel. polygyra.*

Aplatie, l'ouverture ovale, la lèvres découpée.

*Chemnitz, Conch. 9. tab. 127. fig. 1124 et 1125.*  
On ignore son pays natal.

Hélice contournée, *Hel. contorta.*

Aplatie des deux côtés; l'ouverture linéaire, courbe.

*Petiver, Gazoph. tab. 92. fig. 8. Geoff. Test. 3. Chemnitz, Conch. 9. tab. 127. fig. 1126.*

Le petit planorbe à six spirales: *Geoff. Coq. 3.*

Se trouve en Europe, dans les eaux stagnantes: elle est rare aux environs de Paris.

Hélice brillante, *Hel. nitida.*

Unie, jaunâtre; le dessus convexe, le dessous aplati.

*Schroet. Flusconch. tab. 5. fig. 27. Mart. Berol. mag. tab. 8. fig. 22.*

Se trouve dans les eaux stagnantes au nord de l'Europe.

Hélice blanche, *Hel. alba.*

Blanche, ombiliquée des deux côtés; l'ouverture très grande.

*Petiver, Gaz. tab. 92. fig. 7. Schroeter, Flusconch. tab. 5. fig. 12.*

Se trouve en Danemarck dans les eaux douces.

Hélice simile, *Hel. similis.*

Mince, ombiliquée en dessus, et striée par des points enfoncés.

*Martini, Berl. mag. 4. tab. 11. fig. 64. B.*

Se trouve en Prusse et en Danemarck, dans les eaux stagnantes.

Hél. corne de bélier, *Hel. cornu arietis.*

Aplatie; l'ouverture ovale.

*Séba, Mus. 3. tab. 39. fig. 14, 15. Lister, Conch. tab. 156. fig. 40. Chemn. 9. tab. 112. fig. 952, 953.*

Se trouve dans les mers de la Chine.



Hélice hérissée, *Hel. hispida*.

Demi-transparente, convexe, hérissée de poils, avec cinq tours de spire, et l'ouverture presque ronde.

*Lister*, Anim. ang. tab. 2. fig. 12. *Petiv.* Gazoph. tab. 95. fig. 15. La veloutée : *Geoffroy*, Coq. 11. *Chemnitz*, Conch. tab. 112. fig. 1057, 1058.

Se trouve en Europe, dans les bois humides et les prairies : elle n'est pas rare aux environs de Paris.

Hélice piscinale, *Hel. piscinalis*.

Presque globuleuse, perforée; d'un roux brun, striée transversalement; quatre tours de spire.

Se trouve en Danemark, dans les eaux douces.

Hélice petite, *Hel. pusilla*.

Globuleuse, verdâtre, perforée; l'ouverture arrondie.

*Martini*, Berl. mag. 4. tab. 8. fig. 26.  
Se trouve dans les lacs de la Prusse.

Hélice sphérique, *Hel. spherica*.

Globuleuse, couleur de corne; le sommet obtus.

Se trouve rarement en Danemarck, dans les lieux marécageux.

H. des vignes ou escargot, *H. pomatia*.

Presque ovale, obtuse, fauve sale; l'ouverture demi-ronde.

*Lister*, Conch. tab. 48. fig. 46. Exerc. anat. tab. 1. fig. 1 — 6. *Dargenville*, pl. 28. fig. 1. et Zoomorph. pl. 9. fig. 4. *Guatt.* tab. 1. fig. A. *Chemn.* 9. tab. 129. fig. 1138. Le vigneron : *Geoff.* Coq. 1.

Voyez pl. 29, fig. 2, où elle est représentée un peu plus petite que nature.

Se trouve, terrestre, dans toute l'Europe, et se mange dans beaucoup de pays.

Hélice glauque, *Hel. glauca*.

Presque ronde, et pointue au sommet; la lèvre marginée, l'ouverture ovale.

*Séba*, Mus. 5. tab. 38. fig. 8. *Knorr.* Verg. tab. 5. fig. 3.

On ignore son pays natal.

Hélice citrin, *Hel. citrina*.

Convexe, obtuse, jaunâtre, avec une fascie brune. *Lister*, tab. 54. fig. 50 et tab. 68. fig. 57. *Guatt.* tab. 2. fig. D. E. *Dargenv.* pl. 28. *Fav.* pl. 6. fig. F. 1. *Chemn.* Conch. 9. tab. 131, fig. 116. 1175.

Se trouve terrestre à la Chine et à la Jamaïque.

Hélice rave, *Hel. rapa*.

Presque globuleuse, percée de petits trous; une fascie rouge; la plus grande spire supérieurement recourbée en dedans.

*Chemn.* Conch. 9. tab. 131. fig. 1176.

On ignore son pays natal.

Hélice châtaigne, *Hel. castanea*.

Presque globuleuse, couleur de châtaigne obscure; une fascie rousse; jointe à une blanche; les tours de spire striés.

*Chemn.* Conch. 9. tab. 131. fig. 1177, 1178.

On ignore son pays natal.

Hélice globule, *Hel. globulus*.

Presque globuleuse, blanche, la lèvre recourbée en dehors.



*Lister*, tab. 44. fig. 41. *Gualt. Test.* 2. fig. C.  
*Chemn.* 9. tab. 151. fig. 1159, 1160.  
 On ignore le pays d'où elle vient.

Hélice lactée, *Hel. lactea*.

Comprimée, grise, ponctuée de blanc, l'ouverture d'un rouge brun; la lèvre dentée.  
*Chemn. Conch.* 9. tab. 150. fig. 1160.  
 Se trouve en Portugal et à la Jamaïque.

Hélice entaillée, *Hel. incisa*.

Comprimée, blanche; le dos des spires entaillé.  
*Fav. pl.* 64. fig. 5. *Chemn. Conch.* 9. tab. 150. fig. 1166.  
 On ignore son pays natal.

Hélice des arbustes, *Helix arborum*.

Convexe, aiguë, l'ouverture presque ronde, deux fois marginée, antérieurement allongée.  
*Lister*, tab. 56. fig. 55. *Chemn. Conch.* 153. figure 1202.  
 Se trouve en Europe, souvent au pied des arbres, dans la mousse.

Hélice fauve, *Hel. fulva*.

Globuleuse, demi-transparente, fauve; la lèvre blanche.  
 Se trouve, mais très rarement, en Danemarck.

Hélice épistylle, *Hel. epistylum*.

Presque imperforée, presque globuleuse; striée, blanche, avec sept tours de spire.  
*Lister*, *Conch.* tab. 62. fig. 60.  
 On ignore son pays natal.

Hélice ceinte, *Hel. cincta*.

Presque imperforée, presque globuleuse, blanche, des fascies et la lèvre rousse.  
 On ignore son pays natal.

Hélice ligate, *Hel. ligata*.

Presque globuleuse, blanche, avec des fascies rousses et la lèvre blanche.  
*Gualt. Test.* tab. 1. fig. E. *Chemn.* 9. tab. 128. fig. 1157.  
 Se trouve en Italie.

Hélice aspergée, *Hel. aspersa*.

Presque globuleuse, jaune, avec quatre fascies rousses, interrompues par du blanc, la lèvre très blanche.  
*Lister*, tab. 49. fig. 47. *Dargenville*, tab. 28. figure 11. *Favanne*, pl. 63. fig. D. 2. D. 3. D. 4. *Chemn.* 9. tab. 150. fig. 1156, 1157.  
 Se trouve en Italie.

Hélice étendue, *Helix extensa*.

Presque globuleuse, pâle, sans taches; l'ouverture très évasée, quatre tours de spire.  
 On ignore son pays natal.

Hélice pisane, *Hel. pisana*.

Perforée, globuleuse, blanche, avec des fascies rouges presque interrompues, et la lèvre rose.  
*Gualteri*, *Test.* tab. 2. fig. E. *Chemn.* 7. tab. 152. fig. 1186. 1187.  
 Se trouve dans les parties méridionales de l'Europe, et en Barbarie.



Hélice striée, *Hel. strigata*.

Blanche, perforée ; le sommet aplati avec plusieurs lignes et fascies rousses, la lèvres blanche en dedans et en dehors.

*Lister*, Conch. tab. 58. fig. 55.

Se trouve en Italie.

Hélice némorenne, *Hel. nemorensis*.

Perforée, globuleuse, blanche, brillante, avec des fascies brunes.

*Chemnitz*, Conch. 9. tab. 129. fig. 1146. 1147.

Se trouve dans l'Inde.

Hélice zonaire, *Hel. zonaria*.

Convexe, un peu aplatie ; l'ouverture alongée, marginée.

*Gualt.* Test. tab. 3. fig. L. *L. Seba*, Mus. 5. tab. 40. fig. 52, 53, 55. *Chemn.* 9. tab. 152. fig. 1188, 1189.

Se trouve dans l'Europe méridionale, et en Barbarie.

Hélice striée, *Hel. striata*.

Un peu comprimée, striée, blanche.

*Schroet*, Erdconch. tab. 2. fig. 20.

Se trouve en Allemagne.

Hélice des bruyères, *Hel. ericetorum*.

Comprimée, jaunâtre, avec une ou plusieurs fascies brunes.

*Lister*, Anim. angl. tab. 2. fig. 15. *Gualt.* tab. 5. fig. O. M. L. P. Le grand ruban : *Geoff.* Coq 15. *Chemn.* Conch. 9. tab. 152. fig. 1193. 1195.

Se trouve dans l'Europe méridionale ; elle est rare aux environs de Paris.

Hélice luisante, *Hel. nitens*.

Un peu comprimée, demi-transparente, d'un fauve brun, presque striée ; l'ouverture très large.

*Petiv.* tab. 93. fig. 14. *Dargenville*, pl. 28. fig. 4. La luisante : *Geoff.* Coq. 7. *Chemn.* Conch. 9. tab. 127. fig. 1130, 1131.

Se trouve dans toute l'Europe, sous les pierres et dans les bois humides : elle n'est pas rare aux environs de Paris.

Hélice à côtes, *Hel. costata*.

Comprimée, cendrée ; les tours de spire carénés ; l'ouverture circulaire, la lèvres blanche recourbée.

Se trouve, mais rarement, en Danemarck.

Hélice pulchelle, *Hel. pulchella*.

Aplatie, blanche, unie ; l'ouverture ronde ; la lèvres cylindrique, relevée.

La petite striée : *Geoff.* Coq. 6.

Se trouve en Europe, sous la mousse et dans les bois humides : elle est commune aux environs de Paris.

Hélice ronde, *Hel. rotundata*.

Un peu aplatie, avec des lignes transversales élevées et des taches couleur de rouille.

*Dargenv.* Zoomorph. pl. 9. fig. 10. Le bouton : *Geoff.* Coq. 9. *Schroet.* Erdconch. tab. 2. fig. 25.

Se trouve dans l'Europe septentrionale, sous les pierres, la mousse, les écorces : elle n'est pas rare aux environs de Paris.

Hélice cellaire, *Hel. cellaria*.

Aplatie, jaunâtre, brillante, blanche en dessous ; l'ouverture évasée.



*Schroeter*, Erdconch. 9. tab. 2. fig. 26. *Chemnitz*,  
Conch. 9. tab. 127. fig. 1129.  
Se trouve en Allemagne.

Hélice grosses lèvres, *Hel. obvoluta*.

Aplatie, des deux côtés, l'ouverture triangulaire;  
la lèvre relevée, jaune.

*Gault*. tab. 2. fig. 5. *Geoffroi*, Test. 12. *Favanne*,  
pl. 63. fig. F. 2. *Chemn. Conch.* 9. tab. 127. fig. 1128.  
La veloutée à bouche triangulaire; *Geoff. Coq.* 12.

Se trouve en Europe, sous les pierres et dans les  
bois humides : elle n'est pas commune aux environs  
de Paris.

Hélice strigosule, *Hel. trigosula*.

Un peu aplatie, striée blanche, fasciée de roux.  
Se trouve en Europe.

Hélice radiée, *Hel. radiata*.

Perforée, un peu aplatie, striée, le dessous con-  
vexe et radié.

*Lister*, Conch. tab. 70. fig. 69. *Gault*. tab. 2.  
figure 3.

Se trouve dans l'Europe méridionale, et en Virgi-  
nie.

Hélice cristalline, *Hel. crystallina*.

Aplatie, blanche, brillante, diaphane.

Se trouve en Danemarck, dans la mousse et sous  
les pierres.

Hélice ongulée, *Hel. unguina*.

Convexe, l'ouverture marginée, presque ronde,  
allongée en haut.

*Ramph. Mus.* tab. 27. fig. R. *Séba*, Mus. tab. 40.  
fig. 11. *Chemn. Conch.* 9. tab. 125. fig. 1098, 1099.  
Se trouve dans l'Inde.

Hélice varice, *Hel. varica*.

Globuleuse, d'un jaune blanchâtre; les tours de  
spire tournés à gauche.

On ignore son pays natal.

Hélice fruit, *Hel. fruticum*.

Globuleuse, l'ouverture à lèvres non bordées.

*Schroet. Erdconch.* tab. 2. fig. 19. *Chemn. Conch.*  
9. tab. 133. fig. 1203.

Se trouve dans le nord de l'Allemagne.

Hélice lucène, *Hel. lucena*.

Un peu globuleuse, le dessous renflé; la lèvre re-  
levée, blanche.

*Dargenville*, tab. 28. fig. 7. *Chemnitz*, Conch. 9.  
tab. 130. fig. 1155.

On ignore son pays natal.

Hélice vittée, *Helix vittata*.

Presque globuleuse, à peine ombiliquée, blanche,  
avec des fascies nombreuses, brunes; le sommet  
bleu; la lèvre relevée, blanche.

*Chemnitz*, Conch. 9. tab. 132. fig. 1190. 1192.  
Se trouve à la côte de Coromandel.

Hélice rosacée, *Hel. rosacea*.

Presque globuleuse, à peine ombiliquée, incar-  
nate, striée transversalement; la lèvre relevée, brune.

On ignore son pays natal.



Hélice italienne, *Hel. itala*.

Conveve, obtuse, à cinq tours de spire, cylindrique; l'ombilic évasé et l'ouverture presque ronde.  
Se trouve en Italie et autres parties de l'Europe méridionale.

Hélice lusitanienne, *Hel. lusitanica*.

Perforée, convexe, obtuse, cinq tours de spire cylindriques, d'un blanc jaunâtre, l'ombilic évasé.  
*Gualteri*, Test. tab. 2. fig. T. *Favanne*, Catal. tab. 2. fig. 107. *Chemnitz*, Conch. g. tab. 108. fig. 913, 914.

Se trouve dans l'Europe méridionale.

Hélice mamillaire, *Hel. mamillaris*.

Ovale, à trois tours de spire, striés; l'ouverture ovale, grande, attachée à l'extrémité.  
Se trouve dans les rivières d'Afrique.

Hélice hispane, *Hel. hispana*.

Convexe, cinq tours de spire cylindriques; l'ombilic très petit et perforé; l'ouverture presque orbiculaire.

Se trouve dans l'Europe méridionale.

Hélice luth, *Hel. lutaria*.

Ovale, allongée, l'intérieur plus coloré; l'ouverture presque ronde, blanche en dedans.  
On ignore son pays natal.

Hélice ovale, *Helix ovalis*.

Perforée, ovale, ventruée, striée; la lèvre rose, et la columelle blanche.  
*Chemnitz*, Conch. g. tab. 119. fig. 1020 et 1021.  
Se trouve dans l'Inde.

Hélice chapeau, *Hel. pileus*.

En forme de toupie, blanche, avec des fascies rousses, une ouverture transverse, ample, et une lèvre un peu relevée.

*Chemn. Conch. g. tab. 112. fig. 1046 et 1047.*

On ignore son pays natal.

Hélice épineuse, *Hel. aculeata*.

En forme de toupie, brune, convexe des deux côtés; les côtes garnies d'épines; la lèvre blanche.

*Muller*, Naturf. 19. tab. 2. fig. 1, 2, 3, *Chemn. Conch. g. tab. 135. fig. 1209.*

Se trouve dans le Nord de l'Allemagne, sur les branches du hêtre.

Hélice volvule, *Hel. volvulus*.

En forme de toupie, aiguë, variée; l'ouverture arrondie, la lèvre relevée.

*Lister*, Conch. tab. 50. fig. 48. *Séba*, Mus. 3. tab. 4. fig. 18, 19. *Chemn. Conch. g. tab. 123. fig. 1064, 1065.*

On ignore son pays natal.

Hélice involvule, *Hel. involvulus*.

En forme de toupie; aiguë, blanche, avec des stries en spirale, convexe; l'ouverture arrondie; la lèvre relevée.

*Lister*, Conch. tab. 75. fig. 75. *Séba*, 3. tab. 40. fig. 56, 58, 61, 63, 64. *Born. Mus. cæs. vind. tab. 14. fig. 23, 24.*

On ignore le pays d'où elle vient.

Hélice néritine, *Hel. neritina*.

Glabre, solide, fauve pâle, fasciée de blanc; les



tours de spire aplatis en dessous; l'ouverture ovale, oblongue.

*Kaemmer*; *Conch. rudolst.* tab. 11. fig. 7.

On ignore son pays natal.

Hél. des tourterelles, *Hel. turturum*.

Arrondie, mince, l'ouverture en demi-lune.

*Lister*, *Anim. angl.* tab. 2. fig. 12. *Mart.* *Berl. magaz.* 2. tab. 3. fig. 34.

Se trouve en Europe, dans les bois, où elle est recherchée des tourterelles.

Hél. des olivettes, *Hel. olivetorum*.

Aplatie, jaune, l'ouverture aplatie; le premier tour s'aplatissant petit à petit.

*Gualt.* *Test.* tab. 3. fig. G.

Se trouve en Italie, dans les plantations d'oliviers.

Hélice bège, *Hel. badia*.

Presque globuleuse, unie, aplatie en dessus; l'ouverture en croissant.

*Born.* *Mus. cæs. vind. test.* tab. 15. fig. 11, 12.

On ignore son pays natal.

Hélice pilcate, *Hel. pilcata*.

Peu ombiliquée, conique, blanche, fasciée de fauve pâle; l'ouverture en croissant.

*Born.* *Mus. cæs. vind. test.* tab. 16. fig. 11, 12.

On ignore son pays natal.

Hélice fucescence, *Helix fucescens*.

Ronde, un peu ombiliquée, mince; l'ouverture en croissant.

*Schroet.* *Erdconch.* tab. 1. fig. 11.

Se trouve en Allemagne.

Hélice terrestre, *Hel. terrestris*.

La spire obtuse, pointue; le premier tour très grand, le reste diminuant progressivement; l'ouverture en croissant, marginée.

*Schroet.* *Erdconch.* tab. 2. fig. 19.

On ignore son pays natal.

Hélice neige, *Helix nivea*.

Arrondie, mince, blanche, brillante; l'ouverture en croissant.

*Schroet.* *Erdconch.* tab. 2. fig. 20.

On ignore son pays natal.

Hélice aveline, *Helix avellana*.

Presque triangulaire, rude au toucher, plissée, argentée en dedans; l'ouverture unie, auriculée; le premier tour de spire avec un cercle élevé.

*Spengl.* *Besch. Berl. naturf.* 1. tab. 9. fig. 4 et 5.

Se trouve dans l'océan Austral.

Hélice rufescence, *Helix rufescens*.

Renflée, fragile; à cinq tours de spire; dont le premier, très grand, est presque comprimé, le reste convexe; l'ouverture en demi-lune.

*Schroet.* *Flusconch.* tab. 5. fig. 35.

Se trouve dans les rivières du nord de l'Allemagne.

Hélice ouverte, *Helix pervia*.

Obtusément pyramidale, à quatre tours de spire convexe; le premier avec un cercle élevé, le reste avec des cercles creux; l'ouverture demi-lunaire.

*Schroet.* *Flusconch.* tab. 6. fig. 10.

Se trouve dans les eaux douces.



Hélice très unie, *Helix lævissima*.

Oblongue; les tours de spire cylindriques, unis; Pouverture orbiculaire.

Schroet. Flusconch. tab. 6. fig. 12.

Se trouve dans les eaux douces.

Hélice médiante, *Helix media*.

Aplatie des deux côtés, avec six tours de spire dont le premier est cylindrique; Pouverture presque ronde.

Schroet. Erdconch. tab. 2. fig. 22.

Se trouve en Allemagne.

Hélice tendre, *Helix tenella*.

Très fragile, aplatie, brillante, convexe en dessus; Pouverture en demi-lune, comprimée.

Schroet. Erdconch. tab. 2. fig. 26.

On ignore son pays natal.

H. crépusculaire, *Helix crepuscularis*.

Comprimée, blanche; avec six tours de spire cylindrique, le troisième et le quatrième brun, le dernier rouge à la pointe; Pouverture en demi-lune unie.

Martin. N. Mannigf. 4. tab. 3. fig. 20 et 21.

Se trouve sur la côte de Guinée.

Hélice transparente, *Helix hyalina*.

Transparente, aplatie en dessus, d'un brun clair, hémisphérique et blanche en dessous; les tours de spire tournés à gauche.

Martin. N. Mannigf. 4. tab. 3. fig. 22, 25.

Chemn. Conch. 9. tab. 109. fig. 921, 922.

Se trouve terrestre sur la côte de Guinée.

Hélice à faisceaux, *Helix fascicularis*.

Demi-transparente, à trois tours de spire séparés par un canal; Pouverture orbiculaire, non marginée.

Schroet. Flusconch. tab. 16. fig. 11.

Se trouve en France dans les eaux douces, et a deux tentacules semblables à ceux du porte-plumet de Geoffroy.

Hélice velours, *Helix holosericea*.

Aplatie, un peu convexe en dessus; le premier tour de spire aplati, velu; Pouverture triangulaire marginée.

Gualteri, Test. tab. 2. fig. 5. Martin. Berl. magaz. 2. tab. 3. fig. 37. Schroet. Erdconch. tab. 2. fig. 24.

Se trouve en France et en Allemagne, dans les eaux douces.

Hélice turgide, *Helix turgida*.

Mince, blanche, fasciée d'un blanc clair; le premier tour de spire cylindrique, renflé; Pouverture presque ronde, non marginée.

Schroet. Flusconch. tab. 5. fig. 28.

Se trouve en Allemagne dans les eaux douces.

Hélice ténue, *Helix tenuis*.

Demi-transparente, couleur de corne, convexe, striée transversalement; six tours de spire, décroissant petit à petit; Pouverture en croissant.

Schroet. Flusconch. tab. 5. fig. 32.

On ignore son pays natal.

Hélice coriace, *Helix coriacea*.

Cartilagineuse, demi-transparente, jaunâtre, bossue; les spires sillonnées par de simples stries circulaires.



*Pallas*, Nov. act. pétr. 2. tab. 7. fig. 31, 33.  
Se trouve aux îles Kourilles.

Hélice corne de chasseur, *Helix cornu venatorium*.

Comprimée, profondément ombiliquée; la lèvre verte.

*Chemn.* Conch. 9. tab. 127. fig. 1152 et 1153, et tab. 109. fig. 317 et 318.  
Se trouve au Sénégal sur les arbres.

Hélice élégante, *Helix elegans*.

Pyramidale, blanche, à six tours de spire aigus et marginés.

*Favanne*, pl. 64. fig. O.  
Se trouve dans l'Europe méridionale et en Barbarie.

Hélice de Cook, *Helix Cookiana*.

Pyramidale, blanche, unie, obtuse, imperforée, convexe.

*Chemnitz*, Conch. 9. tab. 122. fig. 1049 et 1050.  
Se trouve dans les îles de la mer du Sud.

Hélice bidentée, *Helix bidentata*.

Pyramidale, presque carénée, fasciée, finement striée; la lèvre relevée, à deux dents.

*Chemnitz*, Conch. 9. tab. 122. fig. 1052.  
Se trouve aux environs de Strasbourg, dans les jardins et les bocages.

Hélice turbo, *Helix turbo*.

Pyramidale, presque imperforée, jaune, variée de roux.

*Chemnitz*, Conch. 9. tab. 122. fig. 1059.  
Se trouve à la côte de Coromandel.

Hélice bontiane, *Helix bontia*.

Conique, ventrue, perforée, demi-transparente; le sommet noir; le premier tour de spire avec trois fascies jaunâtres; l'ouverture ovale.

*Favanne*, pl. 75. fig. L.  
Se trouve au Bengale.

Hélice trochoïde, *Helix trochoides*.

En forme de toupie, perforée, luisante, striée longitudinalement; spire tournée à gauche, le premier tour caréné; l'ouverture anguleuse; la columelle brune.

*Chemnitz*, Conch. 10. tab. 173. fig. 1686, 1687.  
On ignore son pays natal.

À coquilles rondes et imperforées.

Hélice jamaïcienne, *Helix jamaicensis*.

Globuleuse, brune, fasciée de blanc; la lèvre découpée, blanche; le sommet obtus.

*Lister*, Conch. tab. 42. fig. 32. *Favanne*, pl. 63. fig. M.  
Se trouve à la Jamaïque.

Hélice rhodienne, *Helix rhodia*.

Presque globuleuse, aplatie, concave à sa base; l'ouverture en croissant.

*Chemn.* Conch. 9. tab. 157. fig. 1179 et 1180.  
Se trouve dans l'île de Rhodes.

Hélice géante, *Helix gigantea*.

Presque ronde, solide, la spire aplatie.