

Scopoli, Del. Flor. et Faun. insub. tab. 25. fig. A.
On ignore le lieu d'où elle vient.

Hélice vivipare, *Helix vivipara*.

Presque ovale, obtuse, couleur de corne, avec des fascies brunes; l'ouverture presque orbiculaire.

Lister, Conch. tab. 126. fig. 26. Gualteri, tab. 5. fig. A. Dargenville, Zoomorph. pl. 8. fig. 2. La vivipare. Geoffroy, pag. 112.

Favanne, pl. 61. fig. D. 9. Chemn. Conch. 9. tab. 152. fig. 1182, 1183.

Se trouve en Europe, dans les eaux douces: elle est fort commune dans la Seine.

Hélice fasciée, *Helix fasciata*.

Ovale, ventrue, blanche, avec trois fascies rouges, brillantes.

Gualt. tab. 5. fig. M. Ginan, op. port. tab. 1. fig. 6.

Se trouve en Allemagne et en Italie.

Hélice dissemblable, *Helix dissimilis*.

Presque ovale, acuminée, d'un jaune blanchâtre; la lèvre noire.

Schroet, cial. in Conch. 2. tab. 4. fig. 10.


Se trouve dans l'Inde.

Hélice livrée, *Helix nemoralis*.

Presque ronde, unie, demi-transparente, fasciée, l'ouverture un peu en croissant.

Lister, tab. 57. fig. 54. Gualt. tab. 2. fig. A. D. F. Dargenville, pl. 28. fig. 8. et Zoomorph. pl. 9. fig. 5. Favanne, pl. 63. fig. H. Chemn. Conch. 9. tab. 152. fig. 1196, 1197. La livrée; Geoffroy, Gog. pag. 51.

Voyez pl. 29. fig. 1, où elle est représentée avec son animal.



Deseve del.

Mondet Sculp.

1. L'Helice livrée. 3. L'Helice cor de chasse.
2. L'Helice des vignes, ou Escargot. 4. L'Helice d'Alger.
5. Le Cerite obelisque.

Se trouve dans toute l'Europe, dans les jardins et les bois : est très commune aux environs de Paris, et fournit une grande quantité de variétés.

Hélice des jardins, *Helix hortensis*.

Globuleuse; laèvre blanche.
Chemnitz, Conch. 9. tab. 155. fig. 1199, 1201.
Gêve. Conch. tab. 50. fig. 357. 367.
 Se trouve en Europe, dans les jardins.

Hélice des bosquets, *Helix lucorum*.

Presque ronde, unie, fasciée; l'ouverture allongée, brune.
Gualteri, tab. 1. fig. C. *Lister*, tab. 1058. fig. 1.
 Se trouve dans l'Europe méridionale.

Hélice grise, *Helix grisea*.

Presque ovale, obtuse, grise, avec deux fascies pâles; l'ouverture oblongue.
Gualt. tab. 1. fig. B. *Chemn.* Conch. 9. tab. 150. fig. 1156, 1157.
 Se trouve terrestre en Europe.

Hélice hémastome, *Helix hæmastoma*.

Presque ronde, brune, avec des fascies longitudinales blanches; l'ouverture pourpre.
Schroet. cinl. in Conch. 2. tab. 4. fig. 5, 6. *Chemn.* Conch. 9. tab. 150. fig. 1050, 1054.
 Se trouve terrestre dans l'île de Ceylan.

Hélice poulet, *Helix pulla*.

Presque ovale, brune, fasciée; l'ouverture oblique, marginée, blanchâtre.
Lister, Conch. tab. 42. fig. 45. *Knorr*. *Vergn.* 1. tab. 21. fig. 2.

On ignore le pays d'où elle vient.

Hélice gracieuse, *Helix venusta*.

Presque ovale, jaune, avec des fascies blanches, bordées de rouge; la lèvre relevée, marginée.
Kaemmer. Conch. rudolst. tab. 11. fig. 4, 5.
On ignore son pays natal.

Hélice peinte, *Helix picta*.

Presque globuleuse, unie, avec quatre tours de spire cylindrique, le premier ventru, les autres comprimés; l'ouverture en demi-lune.
Born. Mus. cas. vindob. Test. tab. 15. fig. 17 et 18. Chemn. Conch. 9. tab. 130. fig. 1162, 1165.
Se trouve en Italie.

Hélice variée, *Helix variegata*.

Presque ovale, fasciée de brunâtre; l'ouverture blanche en dedans.
Knorr, Vergn. 4. tab. 27. fig. 5. Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 4. fig. 77.
Se trouve dans les parties méridionales de l'Europe.

Hélice solide, *Helix solida*.

Solide, ovale, unie, avec six tours de spire contigus; la columelle très épaisse.
Born. Mus. cas. vindob. tab. 15. fig. 18 et 19.
On ignore son pays natal.

Hélice ouverte, *Helix aperta*.

Presque globuleuse, striée finement en long; trois tours de spire, dont le premier ventru; l'ouverture en demi-lune; la columelle en spirale.
Born. Mus. cas. vindob. tab. 16. fig. 9. Chemn. Conch. 9. tab. 153. fig. 1204 et 1205.

On ignore d'où elle vient.

Hélice versicolore, *Helix versicolor*.

Presque ronde, striée transversalement; les tours de spire cylindriques, le premier ventru; l'ouverture ovale.
Born. Mus. cas. vindob. Test. tab. 16. fig. 9 et 10.
On ignore son pays natal.

Hélice noix, *Helix nucleus*.

Ovale, glauque, striée transversalement avec des fascies noires et une ouverture sinieuse.
Martyn. Univ. Conch. 2. tab. 67. fig. ext.
Se trouve à l'île d'Otaïti.

Hélice écarlate, *Helix coccinea*.

Ovale, unie, rouge; l'ouverture jaune.
Mart. Univ. Conch. 2. tab. 68. fig. ext.
Se trouve à la Nouvelle Zélande.

A coquilles alongées, en forme de tour.

Hélice escalier, *Helix scalaris*.

Imperforée; les tours de spire écartés; l'ouverture ovale.
Chemn. Conch. tab. 128. fig. 1150.
On ignore d'où elle vient.

Hélice tirebourse, *Helix circinata*.

Transparente, avec des côtes transversalement perforées; les tours de spire écartés; l'ouverture circulaire.
Kaemmer, Conch. Rudolst. tab. 8. fig. 4 et 5.
On ignore son pays natal.

Hélice des mares, *Helix stagnorum*,

Presque perforée, cinq tours de spire peu élevés; l'ouverture ovale.

Baster, Opusc. subs. tab. 7. fig. 4.

Se trouve en Europe, dans les eaux stagnantes.

Hélice tendre, *Helix tenera*.

Convexe, striée, blanche; les stries rares, fauves; la columelle sinuée, sans courbure.

Chem. Conch. 9. tab. 120. fig. 1028 et 1029.

On ignore le pays d'où elle vient.

Hélice pelle, *Helix pella*.

Imperforée, ovale, aiguë, striée transversalement, brune, fasciée de jaune.

Se trouve en Islande.

Hélice ondulée, *Helix undulata*.

Très alongée, unie, finement striée transversalement; les tours de spire cylindriques; l'ouverture ovale.

Born. Mus. cæs. vindob. tab. 16. fig. 15.

On ignore son pays natal.

Hélice Priape, *Helix Priapus*.

Imperforée, glabre; la columelle non recourbée; les tours de spire un peu aplatis.

Gronovius, Zooph. 3. tab. 19. fig. 10, 11.

On ignore son pays natal.

Hélice follicule, *Helix folliculus*.

Demi-transparente, unie; la columelle presque pliée; la lèvres mince.

Gronovius, Zooph. 5. tab. 19. fig. 15, 16. *Schroet.* Erdconch. tab. 1. fig. 1.

Se trouve sur la côte de Barbarie.

Hélice des haies, *Helix sepium*.

Blanche, longitudinalement striée, avec sept tours de spire contigus; l'ouverture ovale.

Mart. Berl. Mag. 3. tab. 5. fig. 53. *Schroet.* Erdconch. tab. 7. fig. 1.

Se trouve en Allemagne, dans les jardins et les bois.

Hélice éclatante, *Helix splendidula*.

Mince, brillante, demi-transparente, d'un fauve clair; l'ouverture oblongue.

Se trouve terrestre en France et en Allemagne.

Hélice mitre, *Helix mitra*.

Les tours de spire à côtes et distans; le premier cylindrique, le reste aplati; l'ouverture ovale.

Schroet. Flusconch. tab. 9. fig. 12.

On ignore son pays natal.

Hélice noire, *Helix atra*.

Noire, très finement striée; les tours de spire convexes; l'ouverture ovale, oblongue.

Gualt. Test. tab. 6. fig. G. G. *Schroet. Flusconch.* tab. 10. fig. A. 5.

On ignore son pays natal.

Hélice pointue, *Helix cuspidata*.

Couleur de corne; finement striée en largeur, plissée en longueur; l'ouverture ovale; la lèvres aiguë.

Lister, tab. 118. fig. 15. *Gualt.* Test. tab. 6. fig.
H. Chemn. Conch. 9. tab. 155. fig. 1228.
 Se trouve dans les rivières de l'Inde.

Hélice crénelée, *Helix crenata*.

Blanche, striée transversalement; la suture entourée d'un cercle crénelé.

Chemn. Conch. 9. tab. 155. fig. 1230.
 Se trouve dans les rivières de l'Inde.

Hélice carinulée, *Helix carinula*.

Presque ombiliquée, blanche; le premier tour de spire presque caréné, avec une fascie noirâtre.

Chemn. Conch. 9. tab. 156. fig. 1263.
 On ignore son pays natal.

Hélice safranée, *Helix crocea*.

Cylindrique, glabre, d'un jaune orangé; l'extrémité obtuse.

Chemn. Conch. 9. tab. 155. fig. 1233.
 Son pays natal est inconnu.

H. lanschaurique, *Hel. lanschaurica*.

Peu allongée, très blanche, brune, avec des taches plus foncées; l'ouverture blanchâtre.

Chemn. Conch. 9. tab. 155. fig. 1243.

Hélice obtusate, *Hel. obtusata*.

Blanche, densément striée, presque cylindrique; les tours de spire convexes; la lèvres marginée.

Kaemm. cab. Rudolst. tab. 11. fig. 5.
 On ignore son lieu natal.

Hélice pourpre, *Hel. purpurea*.

Ovale, oblongue, purpurine, avec des taches car-

rées plus foncées en couleur; le dedans gorge-de-pigeon.

Martyn. Univ. Conch. 2. tab. 68. fig. du milieu.
 Se trouve à la Nouvelle-Zélande.

A coquilles ovales, imperforées.

Hélice de Barbarie, *Hel. Barbara*.

Oblongue, rude au toucher, à huit tours de spire; l'ouverture en croissant, presque ronde.
 Se trouve sur la côte de Barbarie.

Hélice tachée, *Hel. navia*.

Sillonnée transversalement, blanche, striée de noir; la spire aiguë; les tours de spire aplatis, le premier plus grand et cylindrique.

Kaemm. cab. Rudolst. tab. 8. fig. 3.
 Se trouve dans la mer du Sud.

Hélice mamelon, *Hel. papilla*.

Conique, perforée, avec des stries rugueuses; l'ouverture transversale; la lèvres relevée.

Chemnitz, Conch. 9. tab. 122. fig. 1053 et 1054.
 On ignore son pays natal.

Hélice ventrue, *Hel. ventricosa*.

Conique, pâle, striée; l'ouverture sans dents.
 Se trouve en Allemagne.

Hélice brillante, *Hel. lubrica*.

Conique, fauve, brillante, demi-transparente, aiguë, l'ouverture sans dents; la lèvres rougeâtre,

Lister, An. angl. tab. 2. fig. 7. La brillante, *Geoff.*
Coq. pag. 54. *Schroet.* Erdconch. tab. 11. fig. 9.
Se trouve en Europe, sous les mousses et les pierres.
Elle n'est pas rare aux environs de Paris.

Hélice limoneuse, *Hel. limosa*.

Alongée, aiguë, demi-transparente; l'ouverture ovale.

Brit. zool. tab. 86. fig. 157.

Se trouve en Europe, dans les marais.

Hél. contournée, *Hel. contortuplicata*.

Cendrée, un peu perforée; le sommet tronqué.

Dargenville, pl. 28. fig. 24.

Se trouve dans les marais en Europe.

Hélice angulaire, *Hel. angularis*.

Verdâtre; les tours de spire anguleux; la gorge blanche.

Lister, Conch. tab. 127. fig. 27. *Chemnitz*, Conch. tab. 154. fig. 1222. 1235.

Se trouve dans les rivières de la Chine.

Hélice tentaculate, *Hel. tentaculata*.

Obtuse; l'ouverture presque ovale; les tours de la spire au nombre de cinq et convexes.

Lister, Conch. tab. 152. fig. 32. *Gualt.* Test. tab. 5. fig. B. *Chemn.* Conch. tab. 135. fig. 1245.

Se trouve communément en Europe, dans les eaux stagnantes.

Hélice lévigate, *Hel. levigata*.

Presque ovale, très obtuse; très unie, demi-transparente.

On ignore son pays natal.

Hélice baltique, *Hel. baltica*.

Ovale, aiguë, avec des rides élevées; l'ouverture ovale très ample.

Se trouve dans la mer Baltique.

Hélice néritoïde, *Hel. neritoides*.

Convexe, longitudinalement striée, avec une fente à l'ombilic et une ouverture presque ronde.

On ignore son pays natal.

Hélice transparente, *Hel. perspicua*.

Convexe; la lèvre nulle; l'ouverture ouverte jusqu'au sommet.

Se trouve dans la Méditerranée.

Hélice pouchet, *Hel. muralis*.

Un peu aplatie, striée, blanche, tachée de brun; la lèvre blanche.

Lister, tab. 74. fig. 74. *Gualt.* tab. 5. fig. F. *Adanson*, pl. 1. fig. 2.

Se trouve, terrestre, en Italie et en Afrique.

Hélice cartusienne, *Hel. cartusiana*.

Un peu aplatie; blanche, avec six tours de spire.

Schroet. Erdconch. tab. 2. fig. 27. *Geoff.* Test. 4.

Se trouve en France et en Allemagne.

Hélice vertigo, *Hel. vertigo*.

Cylindrique, glabre, d'un fauve obscur; la spire cylindrique, tournée à gauche; l'ouverture presque carrée, à six dents.

Se trouve en Danemarck, sous les arbres pourris, la mousse, etc.

Hélice figue, *Hel. carychium*.

Presque conique, transparente, glabre; l'ouverture ovale, avec trois ou six dents dans l'intérieur.
Se trouve dans les bois humides du Danemarck.

Hélice fossar, *Hel. ambigua*.

Convexe, avec des sillons comprimés, écartés; l'ouverture semi-orbiculaire.
Adanson, pl. 15. fig. 1.
Se trouve dans la Méditerranée et sur la côte d'Afrique.

Hélice corbeau, *Hel. corvus*.

Noire; l'ouverture ovale.
Martini, Berl. Mag. 4. tab. 9. fig. 36.
Schroet, Flusconch. tab. 7. fig. 5, 4.
Se trouve en Allemagne, dans les eaux douces.

Hélice poire, *Hel. pyrum*.

Presque cylindrique, striée en sautoir, demi-transparente, variée de fauve clair; l'extrémité brune; la spire tournée à gauche; trois larges impressions au milieu.
Martini, n. Mannigfalt. 4. tab. 2. fig. 15, 16.
Se trouve en Guinée.

Hélice marbrée, *Hel. mamorata*.

Obtuse, blanche, variée de bleu et de cendré; les tours de spire cylindriques; le premier deux fois plus long, renflé dans son milieu, strié longitudinalement; l'ouverture ovale.
Schroet, Flusconch. tab. 6. fig. 9.
Se trouve dans le Rhin, à Strasbourg.

Hélice agathe, *Hel. agathina*.

Faive pâle, transparente, mince: l'ouverture ovale.
Schroet, Flusconch. tab. 6. fig. 15. a. b.
On ignore son pays natal.

Hélice lugubre, *Hel. lugubris*.

Ovale, aigné, demi-transparente, striée transversalement, noirâtre, ondulée de jaune pâle et de jaune d'ocre: le premier tour de spire deux fois plus grand que le reste; l'ouverture ovale, oblongue.
Schroet, Flusconch. tab. 6. fig. 13.
On ignore son pays natal.

Hélice minime, *Hel. minima*.

Ovale, conique, presque imperforée; l'ouverture orbiculaire, le premier tour de spire deux fois plus long que les autres.
Schroet, Flusconch. tab. 7. fig. 18.
On ignore son pays natal.

Hélice enflée, *Hel. inflata*.

Blanche, solide, opaque; le premier tour de spire deux fois plus grand que les autres; l'ouverture très évasée, marginée.
Schroet, Flusconch. tab. 7. fig. 5.
Se trouve dans l'eau douce au nord de l'Allemagne.

Hélice albâtre, *Hel. albicans*.

Blanche, opaque, acuminée; l'ouverture ovale.
Schroet, Flusconch. tab. 7. fig. 6.
Se trouve dans les marais du nord de l'Allemagne.

Hélice recourbée, *Hel. repanda.*

Ovale, aiguë, presque imperforée; le premier tour de spire ventru, plus grand que tous les autres; l'ouverture demi-circulaire.

Schroet. Flusconch. tab. 7. fig. 16.

Se trouve dans les eaux stagnantes en Allemagne.

Hélice opaque, *Hel. opaca.*

Ovale, aiguë, solide, très blanche, opaque, l'ouverture ovale, oblongue; le premier tour de spire plus grand que les autres.

Schroet. Flusconch. tab. 7. fig. 17.

On ignore d'où elle vient.

Hélice turgide, *Hel. turgida.*

Obtuse; les quatre tours de spire du milieu enflés, distans; l'ouverture ronde, marginée.

Schroet. Flusconch. tab. 8. fig. 7. a. b.

On ignore son pays natal.

Hélice bleuâtre, *Hel. caeruleascens.*

Ovale, acuminée, bleuâtre; les tours de la spire un peu ventrus; l'ouverture oblongue.

Schroet. Flusconch. tab. 8. fig. 8. a. b.

Se trouve en Allemagne, près Francfort.

Hélice cendrée, *Hel. cinerea.*

Enflée; quatre tours de spire courts, les deux inférieurs écartés; l'ouverture orbiculaire non marginée.

Schroet. Flusconch. tab. 8. fig. 9. a. b.

Se trouve en France et en Allemagne.

Hélice ondée, *Hel. undata.*

Oblongue, blanche, ondulée longitudinalement de

rouge, le premier tour de spire trois fois plus grand que les autres; l'ouverture ovale.

Gualt. tab. 5. fig. N.

On ignore son pays natal.

Hélice cylindrique, *Hel. teres.*

Oblongue, mince, brune, le premier tour de spire trois fois plus grand que les autres; l'ouverture ovale.

Gualt. Test. tab. 5. fig. N. N.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Hélice striatulée, *Hel. substriata.*

Presque imperforée, oblongue, très finement striée, blanche; le premier tour de spire deux fois plus grand que les autres; l'ouverture ovale, marginée.

Gualt. Test. tab. 5. fig. S. 5. Schroet. Flusconch. tab. 10. fig. A. 6.

On ignore son pays natal.

Hel. trigonostome, *Hel. trigonostoma.*

Unie, brune; l'ouverture triangulaire, marginée.

Gualt. tab. 5. fig. S. S. Schroet. Flusconch. tab. 10. fig. 9.

On ignore son pays natal.

Hélice bouffie, *Helix tumida.*

Ventruë, acuminée, cendrée, le premier tour de spire plus grand que tous les autres; l'ouverture ovale, ample; un des côtés marginé.

Gualt. Test. tab. 5. fig. Q. Schroet. Flusconch. tab. 10. fig. B. 2.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Hélice voyageuse, *Hel. peregrina.*

Ovale, imperforée; les tours de spire écartés, décroissant également; l'ouverture ovale.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 4. fig. 11.
Se trouve dans les îles de la côte ouest de l'Amérique.

Hélice danubienne, *Hel. danubialis.*

Oblongue, les tours de spire ventrus, écartés; l'ouverture ronde.

Schroet. Flusconch. tab. 10. fig. 5. Marsigl. Dan. 4. tab. 51. fig. 1.

Se trouve dans le Danube.

Hélice turbinée, *Hel. turbinata.*

Oblongue, unie, aiguë; les tours de spire renflés; le premier beaucoup plus grand, le reste décroissant également; l'ouverture presque ovale, marginée.

Marsigl. Dan. 4. tab. 51. fig. 2. Schroet. Flusconch. tab. 10. fig. 1.

Se trouve dans le Danube.

Hélice courbée, *Hel. curvata.*

Oblongue, courbée, un peu perforée; l'ouverture ovale, marginée.

Marsigl. Dan. 4. tab. 51. fig. 2. Schroet. Flusconch. tab. 10. fig. 3.

Se trouve dans le Danube.

Hélice fluette, *Hel. exilis.*

Unie, mince, blanche, fasciée de fauve pâle; la spire obtuse; ses tours aplatis.

Kaemm. cab. Rudolst. tab. 12. fig. 5.

On ignore son pays natal.

VOLVAIRE, *VOLVARIA*, Lamarck.

Coquille cylindrique, roulée sur elle-même, sans spire saillante: ouverture étroite, aussi longue que la coquille; un ou plusieurs plis sur la base de la columelle.

UNE coquille des côtes d'Angleterre, figurée par Pennant dans sa Zoologie Britannique, volume 4, pl. 70, n° 85, et par Dacosta, dans sa Conchyliologie Britannique, pl. 2, n° 7, a servi à Lamarck pour établir ce genre. Cette coquille a l'aspect de la bulle cylindrique, et a trois plis au bas de la columelle. Elle fait le passage des bulles aux bulimes. On ne sait rien de plus sur son compte.

BULLE, *BULLA*, Linnæus.

Coquille bombée, à spire non saillante: ouverture aussi longue que la coquille; point d'ombilic.

Ce genre était assez nombreux dans Linnæus, qui le premier l'avait établi, d'après Rumphius. Mais Bruguière l'a beaucoup réduit, en plaçant plusieurs espèces parmi les bulimes, et en établissant son genre ovule, *ovula*.