

Lister, tab. 58. fig. 57 et 59. fig. 57. b. *Favanne*, pl. 61. fig. H. 15. *Martini*, 9. tab. 212. fig. 954, 955.
Se trouve, fluviatile, sur la côte de Guinée.

Bul. grain d'orge, *Bul. hordeaceus*.

Oblong, couleur de marron, l'ouverture ovale, bordée de blanc.

Lister, Anim. ang. tab. 2. fig. 8. Le grain d'orge : *Geoff.* pag. 51. *Dargenville*, pl. 28. fig. 15.

Se trouve dans la mousse et sous les pierres, en Europe : il n'est pas rare aux environs de Paris.

Bulime mousseron, *Bul. muscorum*.

Cylindrique, fauve, obtus aux deux bouts ; l'ouverture demi-ovale, bordée de blanc.

Turbo muscorum, Linn. — *Lister*, Anim. angl. tab. 2. fig. 6. Le petit barillet : *Geoff.* pag. 58.

Se trouve dans la mousse et sous les pierres, en Europe : il n'est pas rare aux environs de Paris.

Bul. ovoïde, *Bul. ovoideus*.

Ovale, lisse, ventru, blanc ; l'ouverture demi-ovale, bordée d'un bourrelet ; le sommet obtus.

Lister, Sinop. tab. 15. fig. 8. *Klein*, Ostra. tab. 5. fig. 55.

On ignore son pays natal.

Bul. grain de riz, *Bul. oryza*.

Cylindrique, treillisé, blanc, brillant, l'ouverture ovale ; le sommet obtus.

On ignore son pays natal.

Bulimes à ouverture dentée ou plissée.

Bulime sicilien, *Bulimus siculus*.

Ovale, blanchâtre, lisse ; la columelle garnie d'un pli ; le sommet pointu.

Gualt. tab. 5. fig. N. N.

Se trouve, fluviatile, en Sicile.

Bul. de Dombey, *Bul. Dombeianus*.

Ovale, roux, lisse, ondé de brun ; la columelle garnie d'un pli ; le sommet carié.

Se trouve, fluviatile, au Pérou.

Bul. brocard, *Bul. variegatus*.

Ovale, ventru, blanc, marqué de stries transverses et de flammes rougeâtres, ondulées, la columelle garnie d'un pli.

Lister, tab. 814. fig. 24. *Favanne*, pl. 65. fig. P. 1. *Martini*, 2. tab. 45. fig. 459.

On ignore son pays natal.

Bul. moucheté, *Bul. solidulus*.

Ovale, étroit, blanc, marqué de stries transverses, mouchetées de noir ; la columelle garnie d'un pli bilobé.

Bulla solidula, Linn. — *Fav.* pl. 65. fig. P. 2. *Martini*, 10. tab. 149. fig. 1415.

Se trouve, fluviatile, aux Indes-Orientales.

Bul. tourné, *Bul. tornatilis*.

Ovale, brun, marqué de stries transverses, et de deux fascies fauves ; la columelle garnie d'un pli.

Voluta tornatilis, Linn. — *Lister*, tab. 855. fig. 58.

Favanne, pl. 65. fig. P. 3. *Martini*, 2. tab. 43. figure 442, 445.

Voyez pl. 30, fig. 3, où elle est représentée de grandeur naturelle.

Se trouve dans la mer Adriatique.

Bul. collier, *Bul. monile*.

Ovale, lisse, fauve, fascié de blanc; la columelle garnie de deux plis.

Lister, tab. 834. fig. 60, 61. *Favanne*, pl. 65. fig. H. 1. *Martini*, 2. tab. 43. fig. 444.

Se trouve, fluviatile, aux Antilles.

Bul. ovule, *Bulimus ovulus*.

Ovale, lisse, brun; la columelle garnie de trois plis; la lèvres droite striée.

Favanne, pl. 65. fig. H. 4. *Martini*, 2. tab. 43. fig. 446.

Se trouve, fluviatile, aux Antilles.

Bulime coniforme, *Bulimus coniformis*.

Coniforme, fauve, fascié de blanc; la columelle garnie de trois plis; la lèvres droite striée.

Voluta coffea, Linn. — *Lister*, tab. 834. fig. 59. *Favanne*, pl. 65. fig. H. 8. *Martini*, 2. tab. 43. figure 445.

Se trouve, fluviatile, en Amérique.

Bulime piétin, *Bulimus pedipes*.

Ovale, épais, strié, blanchâtre; l'ouverture garnie de cinq dents.

Adanson, pl. 1. fig. 4.

Se trouve dans la mer du Sénégal.

Bulime aveline, *Bul. scarabæus*.

Ovale, marqué de deux angles longitudinaux; l'ouverture garnie de sept dents.

Helix scarabæus, Linn. — *Lister*, tab. 577. fig. 51, 32. *Gualt.* tab. 4. fig. 5, *Dargenville*, pl. 9. fig. T. *Favanne*, pl. 65. fig. D. 1, 2, 4. *Martini*, 9. tab. 136. fig. 1151 à 1153.

Se trouve, terrestre, aux Grandes-Indes.

Bul. oreillette, *Bul. auricula*.

Ovale, étroit, lisse, blanc; la columelle garnie de deux plis.

Gualt. tab. 55. fig. F. *Lister*, tab. 577. fig. 32.

On ignore son pays natal.

B. oreille de Midas, *B. auris Midæ*.

Ovale, épais; les tours de la spire treillisés; l'ouverture longue; la columelle garnie de deux plis.

Voluta auris Midæ, Linn. — *Lister*, tab. 1058. fig. 6. *Dargenville*, pl. 10. fig. G. *Favanne*, pl. 65. fig. H. 2. *Martini*, 2. tab. 43. fig. 436, 438.

Se trouve dans les Indes-Orientales.

B. oreille de chat, *Bul. auris felis*.

Ovale, épais, noirâtre, marqué de stries transverses; la columelle garnie de trois dents; la lèvres droite crénelée au milieu.

Favanne, pl. 65. fig. H. 7. *Mart.* 9. tab. 121. fig. 1043, 1044.

Se trouve dans la mer du Sud et des Indes.

B. oreille de Judas, *Bul. auris Judæ*.

Ovale, épais, treillisé; l'ouverture longue, rétrécie vers le milieu; la columelle garnie de trois plis.

Voluta auris judæ. Linn. — *Lister*. Synop. tab. 52. fig. 50. *Martini*, 2. tab. 44. fig. 449. 450.

Se trouve dans les Grandes-Indes.

Bulime tortu, *Bul. distortus*.

Oblong, ovale, ridé, strié, fauve; l'ouverture étroite, sinueuse, rétrécie vers le bas; la columelle et la lèvre droite garnies d'un pli.

Mart. 10. tab. 149. fig. 1395 et 1396.

On croit qu'il vient des Grandes-Indes.

Bul. oreille de bœuf, *Bul. bovinus*.

Oblong, ovale, ridé, blanc, flambé de brun; l'ouverture jaune; la columelle garnie d'un pli.

Lister, tab. 1058. fig. 8. *Favanne*, pl. 65. fig. 5.

Martini, 9. tab. 121. fig. 1039, 1040.

Se trouve, terrestre, à la Nouvelle-Hollande.

B. oreille de Silène, *Bul. auris Sileni*.

Oblong, ovale, fauve, luisant, marqué de rides grenues et de flammes brunes; l'ouverture blanche; la columelle garnie d'un pli.

Lister, Synop. tab. 1058. fig. 9. *Martini*, 2. tab. 43. fig. 447, 448.

Se trouve terrestre, à Saint-Domingue.

B. oreille de lièvre, *B. auris leporis*.

Cônique, oblong, granuleux; la base large, oblique, aplatie, l'ouverture allongée vers le bas; la columelle garnie d'un pli.

Se trouve, terrestre, à Madagascar.

Bul. austral, *Bul. australis*.

Oblong, ovale, perforé, fauve, fascié de brun foncé; la columelle unie, dentée.

Martini, 9. tab. 121. fig. 1041.

Se trouve, terrestre, à la Nouvelle-Hollande.

Bul. d'Othaïti, *Bul. Othaitanus*.

Ovale, oblong, perforé, épais, brun; l'ouverture tournée à gauche, demi-ovale, unie, dentée.

Martini, Conch. tab. 112. fig. 950 et 951.

Se trouve, fluviatile, à Othaïti.

Bul. labié, *Bul. labiosus*.

Presque cylindrique, lisse, blanc, diaphane; l'ouverture très évasée, unie, dentée.

Gualt. tab. 4. fig. R.

On ignore son pays natal.

Bul. fuseau, *Bul. fusus*.

Cylindrique, rétréci et obtus aux deux bouts, marqué de stries obliques; l'ouverture demi-ovale, unie, dentée.

Lister, Synop. tab. 588. fig. 49. *Seba*, Thes. 5. tab. 55. fig. 21.

Se trouve, terrestre, dans les Antilles.

Bul. momie, *Bul. numia*.

Cylindrique, blanc, marqué de stries obliques écartées; l'ouverture demi-ovale, rousse, bidentée.

Lister, Synop. tab. 588. fig. 48. *Martini*, 4. tab. 153. fig. 1439.

Se trouve dans l'Océan Américain.

Bul. maillot, *Bul. wa*.

Cylindrique, garni de stries serrées, saillantes et droites; l'ouverture demi-ovale, blanche, unie, dentée.

Turbo uva, Linn. — *Gault.* tab. 58. fig. 17. *Favanne*, pl. 65. fig. B. 11.
Se trouve dans les mers d'Europe.

Bul. poupée, *Bul. pupa.*

Cylindrique, strié, blanc; l'ouverture grande, unie, dentée.

Helix pupa, Linnæus.

Se trouve, terrestre, sur la côte de Barbarie.

Bul. barillet, *B. doliolum.*

Cylindrique, lisse, transparent; l'ouverture tridentée.

Le grand barillet, *Geoff.* pag. 56.

Se trouve aux environs de Paris, sous la mousse, les pierres, etc. Il n'est pas rare.

B. antibarillet, *Bul. quadridens.*

Cylindrique, lisse, jaunâtre; l'ouverture tournée à gauche et garnie de quatre dents.

Lister, Synop. tab. 40. fig. 38. L'antibarillet: *Geoff.* pag. 65. *Martini*, 9. tab. 112. fig. 965.

Se trouve en France et en Italie, dans les lieux ombragés: il n'est pas commun aux environs de Paris.

Bul. nompareil, *Bul. perversus.*

Turriculé, strié, brun; l'ouverture tournée à gauche, ovale, blanche, garnie de deux plis.

Turbo perversus, Linn. — La nompareille, *Geoff.* pag. 65. *Dargenv.* pl. 28. fig. 19. et *Zoomorph.* tab. 9. fig. 13, 14. *Martini*, 9. tab. 112. fig. 959.

Se trouve, terrestre, dans toute l'Europe: il est fort commun aux environs de Paris.

Bul. bidenté, *Bul. bidens.*

Turriculé, lisse, brun; l'ouverture tournée à gauche, ovale, blanche, garnie de deux plis.

Lister, tab. 41. fig. A. *Gault.* tab. 4. fig. C. *Favanne*, pl. 65. fig. E. 11. *Martini*, 9. tab. 112. fig. 960.

Se trouve en Europe, dans les lieux humides.

Bul. papilleux, *Bul. papillaris.*

Turriculé, strié, fauve; les sutures crénelées; l'ouverture tournée à gauche, et garnie de deux plis.

Turbo bidens, Linn. — *Gault.* tab. 4. fig. D. E. *Favanne*, pl. 65. fig. E. 9. *Martini*, 9. tab. 112. fig. 965. 964.

Se trouve terrestre dans les parties méridionales de l'Europe.

Bul. froncé, *Bul. corrugatus.*

Turriculé, cendré; le dehors du tour inférieur ridé; l'ouverture tournée à gauche, et garnie de deux plis.

Martini, 9. tab. 212. fig. 961, 962.

Se trouve terrestre dans les parties méridionales de l'Europe.

Bul. antinompareille, *Bul. similis.*

Turriculé, cendré, strié; l'ouverture ovale, garnie de cinq plis.

Gault. tab. 4. fig. G. *Dargenv.* pl. 28. fig. 16. *Favanne*, tab. 65. fig. E. 12. L'antinompareille, *Geoff.* pag. 54.

Se trouve dans les bois, aux environs de Paris, et dans les parties méridionales de l'Europe.

B. grain d'avoine, *Bul. avenaceus.*

Conique, turriculé, brun; l'ouverture ovale, garnie de cinq plis.

Le grain d'avoine, *Geoff. pag. 52.*

Se trouve sous la mousse et les pierres aux environs de Paris.

Bul. foret, Bul. terebellum.

Conique, turriculé, ombiliqué, lisse; la columelle recourbée en dehors, garnie de trois plis; la lèvre droite unie.

Gualt. tab. 4. fig. M. Lister, tab. 844. fig. 72.

Se trouve dans les îles de l'Amérique.

Bul. poli, Bul. dolabratus.

Conique, turriculé, perforé, lisse; la columelle recourbée, garnie de trois plis; la lèvre droite striée.

Trochus dolabratus, Linn. — Dargenville, pl. 11. fig. L. Favanne, pl. 65. fig. L. Mart. 5. tab. 167. fig. 1603, 1604.

Se trouve terrestre en Afrique.

Bulimes dont l'axe est tronqué par la base.

Bul. zèbre, Bul. zebra.

Ovale, ventru, blanc, marqué de flammes noirâtres; la columelle arquée, blanche.

Dargenville, Supp. pl. 2. fig. L. Favanne, pl. 65. fig. M. 3. Martini, 9. tab. 118. fig. 1014.

Se trouve terrestre à Madagascar.

Bul. perdrix, Bul. achatinus.

Ovale, ventru, blanc, marqué de taches et de flammes brunes, ondulées, écartées; la columelle arquée, couleur de rose.

Bulla achatina, Linn. — Lister, tab. 579. fig. 34. Favanne, pl. 65. fig. M. 5. Dargenville, pl. 10. fig. Gualt. tab. 45. fig. B. Martini, 9. tab. 118. fig. 1012, 1013.

Se trouve terrestre dans l'Amérique méridionale.

Bulime bicariné, Bul. bicarinatus.

Ovale, ventru, fauve, rayé de blanc; la spire tournée à gauche, marquée à son commencement de deux carènes émoussées; la columelle arquée, blanche.

Lister; Synop. tab. 37. fig. 36.

On ignore son pays natal: c'est l'espèce la plus rare et la plus chère du genre.

Bul. pourpré, Bul. purpurascens.

Ovale, ventru, treillissé, verdâtre, flambé de brun; la columelle arquée; l'ouverture pourprée.

Lister, Synop. tab. 581. fig. 35. Martini, 9. tab. 118. fig. 1017, 1018.

Se trouve en Afrique et dans les Antilles.

Bul. Priam, Bul. Priamus.

Ovale, ventru, mince, jaunâtre, marqué de cinq à six rangs de points bruns; la columelle arquée.

Favanne, Cat. tab. 2. fig. 129. Martini, Conch. 9. tab. 120. fig. 1026 et 1027.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Bulime carié, Bul. prerosus.

Ovale, sillonné, noirâtre; la columelle droite, luisante, blanche; le sommet carié.

Buccinum prerosum, Linn. — Martini, Conch. 9. tab. 121. fig. 1057 et 1058.

Se trouve fluviatile en Espagne.

Bulime raboteux, Bulimus exaratus.

Ovale, ventru, sillonné, blanc; le tour inférieur marqué d'une carène; la columelle droite.

Martini, Conch. 9. tab. 120. fig. 1031 et 1032.
On le croit terrestre et de la côte de Guinée.

Bul. pavillon, *Bul. vexillum*.

Conique, oblong, blanc, marqué de bandes de diverses couleurs; la columelle droite couleur de rose.

Bulla virginea, Variété: Linn. — *Lister*, tab. 12. fig. 7. *Gualt.* tab. 6. fig. C. *Favanne*, pl. 65. fig. G. 2. 5. 6. *Dargenv.* pl. 14. fig. M. *Supp.* pl. 1. fig. G. *Martini*, 9. tab. 117. fig. 1004. 1006.

Vient des Grandes-Indes.

Bul. ventru, *Bul. ventricosus*.

Conique, ventru, blanc, fascié de brun; la columelle droite; la lèvre garnie d'un bourrelet.

Martini, 9. tab. 117. fig. 1007 et 1008.

Se trouve à la Guadeloupe.

Bul. ruban, *Bul. virgineus*.

Conique, lisse, blanc, fascié; la columelle arquée, couleur de rose; l'intérieur de la lèvre gauche plissée.

Bulla virginea, Linn. — *Lister*, tab. 15. fig. 10. *Gualt.* tab. 6. fig. A. *Favanne*, pl. 65. fig. G. 1 et 4. *Dargenv.* pl. 11. fig. N. *Martini*, 9. tab. 117. fig. 1000. 1005. et 173. fig. 1682, 1683.

Voyez pl. 30, fig. 4, où il est représenté de grandeur naturelle.


Se trouve terrestre à Cayenne.

Bulime d'Alger, *Bulimus Algerus*.

Cylindrique, strié, blanc; les sutures marquées d'une strie transverse; la columelle presque droite.

Favanne, pl. 61. fig. F. 1.

Se trouve terrestre à la côte d'Alger.



Desceve del.

J. Maillet Sculp.

1. 2. Le Bulime stagnal. 5. La Bulle ampoule.
3. Le Bulime tourné. 6. La Bulle rayée.
4. Le Bulime ruban. 7. L'Ovule œuf.

Bulime gland, *Bul. glans*.

Cylindrique, lisse, couleur marron ; la columelle échanquée au bas ; la lèvre droite ondulée.

Martini, 9. tab. 117. fig. 1009 et 1010.

Se trouve à la Martinique et à la Guadeloupe.

Bulime taché, *Bul. maculatus*.

Oblong, strié, de couleur marron, flambé de brun ; la columelle échanquée.

Martini, 9. pl. 117. fig. 1011.

Se trouve à Saint-Domingue.

Bul. strié, *Bul. striatus*.

Turriculé, strié, blanc ; les sutures marquées d'une strie profonde ; la columelle échanquée.

Martini, Conch. 9. tab. 120. fig. 1028. et 1029.
Kaemmer, tab. 10. fig. 5.

On ne connaît pas son pays natal.

Bulime fauve, *Bulimus fulvus*.

Presque ovale, fauve, longitudinalement et faiblement strié ; la columelle couleur de rose.

Lister, Synop. pl. 582. fig. 35. a.

On ignore sa patrie : se rapproche beaucoup du bulime perdrix.