

Toupie safranée, *Troch. croceus*.

Convexe, fauve; les tours de spire convexes; le dernier couleur de safran.

Chemn. Conch. 5. tab. 171. fig. 1684.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Toupie oblique, *Trochus obliquatus*.

Convexe, aplatie, avec des rayons obliques violâtres; les tours de spire convexes.

Chemn. Conch. 5. tab. 171. fig. 1685.

Se trouve dans la Méditerranée.

Toupie vittée, *Troch. vittatus*.

Convexe, fauve pâle; le bord supérieur des tours de spire avec une bande rouge variée de blanc.

Chemn. Conch. 5. tab. 171. fig. 1687.

On ignore son pays natal.

Toupie de Schroeter, *Troch. Schroeteri*.

Pyramidale, aplatie; la base concave; les tours de spire striés transversalement, avec des côtes obliques; le premier tour caréné en ses bords; l'ombilic en entonnoir.

Schroeter, einl. in Conch. 1. tab. 7. fig. 2, 3.

Se trouve fossile à Courtagnon.

Toupie indienne, *Troch. indicus*.

Convexe, conique; les tours de spire sans tubercules; l'ouverture en demi-cœur.

Chemn. Conch. 5. tab. 172. fig. 1697 et 1698.

Se trouve dans la mer des Indes.

Toupie infondibuliforme, *Trochus infundibuliformis*.

Comprimée, fauve pâle; les tours de spire aplatis, striés et crénelés transversalement par une grande quantité de séries de petits tubercules; l'ombilic petit et crénelé.

Chemn. Conch. 5. tab. 175. fig. 1706, 1707.

On ignore son pays natal.

Toupie stramine, *Troch. stramineus*.

Couleur de paille; les tours de spire crénelés, striés en sautoir, avec quelques sillons; l'ombilic très petit.

Lister, tab. 635. fig. 23. Chemn. Conch. 5. tab. 172. fig. 1699.

Se trouve dans la mer des Indes.

Toupie variée, *Trochus variegatus*.

Blanche, radiée de brun clair, avec des stries crénelées; l'ombilic petit et crénelé.

Chemn. Conch. 5. tab. 173. fig. 1709.

On ignore son pays natal.

Toupie aréole, *Troch. areola*.

Convexe, striée transversalement, blanche, maculée de taches carrées variées de rouge; l'ombilic crénelé.

Chemn. Conch. 5. tab. 175. fig. 1710 et 1711.

On ignore son pays natal.

Toupie inerme, *Troch. inermis*.

D'un jaune verdâtre, avec des côtes longitudinales plissées terminées par des épines; l'ombilic rugueux; l'ouverture comprimée.

Chemnitz, Conch. 5. tab. 175. fig. 1712 et 1715.
On ignore son pays natal.

Toupie impériale, *Troch. imperialis*.

Conique, couleur d'olive, couverte de séries d'écaillés violettes en voûte, les tours de spire enflés, radiés par des épines marginales; l'ombilic en entonnoir, blanc.

Chemnitz, Conch. 5. tab. 175. fig. 1714 et 1715.
Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie aplatie, *Trochus planus*.

Aplatie, couleur de paille, avec des côtes obscures; les tours de spire plissés; l'ombilic très petit.

Chemn. Conch. 5. tab. 174. fig. 1721 et 1722.
On ignore son pays natal.

Toupie blanchâtre, *Trochus albidus*.

Conique, blanche, avec des fascies obliques brunes; les tours de spire canaliculés près la suture.

Born. Mus. cas. vind. Test. tab. 11. fig. 19, 20.
On ignore son pays natal.

Toupie brunâtre, *Troch. fuscatus*.

Conique; la base d'un vert cendré tacheté de brun; les tours de spire cylindriques; l'ombilic cylindrique.

Born. Mus. cas. vind. Test. tab. 12. fig. 1, 2.
On ignore son pays natal.

Toupie fasciée, *Troch. fasciatus*.

Conique, unie, blanche, maculée de brun et fasciée de rose; les tours de spire cylindriques, aplatis vers la suture.

Born. Mus. cas. vind. Test. tab. 12. fig. 3, 4.
On ignore son pays natal.

Toupie fujet, *Troch. coralinus*.

Conique, rouge, ponctuée de blanc, peu ombiliquée; les tours de spire cylindriques, le premier avec quinze et les autres avec six rangs de tubercules.

Adanson, pl. 12. fig. 4 et 5.
Se trouve sur la côte d'Afrique.

Toupie lomir, *Troch. griseus*.

Grise, tachetée de blanc; le tour des spires aplati, sillonné transversalement.

Adanson, pl. 12. fig. 6.
Se trouve sur les côtes d'Afrique.

T. ferrugineuse, *Troch. ferrugineus*.

Convexe; les tours de spire tournés à gauche.

Martin. Neuest. Mannigf. 4. tab. 1. fig. 1, 2. *Chemn.* Conch. 9. tab. 114. fig. 977. a. b.

Se trouve, fossile et changée en mine de fer, près de Schaffhouse.

Toupie neuve, *Trochus novus*.

Pyramidale; les tours de spire cylindriques, tournés à gauche; quatre rangs de tubercules, le quatrième très grand et distant.

Spengl. N. Samml. 1. tab. 1. fig. 5. *Chemnitz*, Conch. 9. tab. 115. fig. 970.

On ignore son pays natal.

Toupie fragile, *Trochus fragilis*.

Mince, couleur de cire; le premier tour de spire très grand, avec une fascie brune au milieu.

Schroet. einl. in Conch. 1. tab. 5. fig. 16.
On ignore son pays natal.

Toupie calleuse, *Troch. callosus*.

Pyramidale, obtuse; quatre tours de spire contigus, élevés et renflés sur leurs bords.

Chemnitz, *Conch.* 9. tab. 122. fig. 1051. *Schroet*, *Flusconch.* tab. 6. fig. 10, 12.

On ignore son pays natal.

Toupie lonier, *Trochus afer*.

Convexe, grise, tachée de blanc; les tours de spire aplatis.

Adanson, pl. 12. fig. 6.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Toupie néritoïde, *Troch. neritoideus*.

Presque ovale, convexe, aplatie, unie, rougeâtre. Se trouve sur les côtes du Groënland.

Toupie perlée, *Troch. perlatus*.

Rougeâtre, avec des côtes inégales formées par des tubercules; les tours de spire convexes.

Kaemmer, *ab. rudolst.* tab. 12. fig. 1.

On ignore son pays natal.

Toupies imperforées.

Toupie vestiaire, *Troch. vestiarius*.

Conique, convexe; la base bossue, avec des callosités; l'ouverture presque en cœur.

Lister, tab. 649, 652. fig. 44, 50. *Gualt. Test.* tab. 65. fig. A. B. F. H. *Chemn.* 5. tab. 166. fig. 1601, 1602.

Se trouve dans la Méditerranée et la mer du Sud.

Toupie retan, *Troch. labio*.

Ovale, presque striée; la columelle avec une dent.

Adanson, pl. 12. fig. 2. *Rumph.* tab. 21. fig. E. *Lister*, tab. 584. fig. 42 et 645. fig. 57. *Chemnitz*, *Conch.* 5. tab. 166. fig. 1579, 1580.

Voyez pl. 31, fig. 6, où elle est représentée presque de grandeur naturelle.

Se trouve dans la mer des Indes et sur la côte d'Afrique.

Toupie truffe, *Troch. tuber*.

Un peu aplatie; les tours de spire presque carénés, avec des nœuds à leur bord inférieur et supérieur.

Séba, *Mus.* 3. tab. 74. fig. 12. *Dargenv.* pl. 8. fig. I. *Chemnitz*, 5. tab. 164. fig. 1561 et tab. 156. fig. 1572 à 1576.

Se trouve dans la Méditerranée et sur la côte d'Amérique.

Toupie striée, *Troch. striatus*.

Conique; le dernier tour de spire presque anguleux; l'ouverture presque ovale.

Gualt. Test. tab. 61. fig. N. *Chemn.* 5. tab. 162. fig. 1527, 1528.

Se trouve dans la Méditerranée.

Toupie petite cône, *Troch. conulus*.

Conique, unie; les tours de spire avec une ligne élevée; les derniers tours noduleux.

Lister, *anim. angl.* tab. 3. fig. 15. *Gualt. Test.* tab. 61. fig. B. G. M. *Chemnitz*, 5. tab. 166. fig. 1588, 1591.

Se trouve dans les mers d'Europe.

Toupie zizyphine, *Troch. zizyphinus*.

Conique, livide, unie; les tours de spire avec un rebord.

Lister, tab. 616. fig. 1. *Gualteri*, tab. 61. fig. C. *Dargenville*, pl. 8. fig. N. *Chemnitz*, Conch. 5. tab. 166. fig. 1592 à 1598.

Se trouve dans les mers d'Europe.

Toupie obélisque, *Troch. obeliscus*.

Conique, entourée d'un grand nombre de séries de grains blancs on verts; columelle à une seule dent.

Knorr, Verg. 1. tab. 12. *Chemnitz*, Conch. 5 tab. 160. fig. 1510—1512.

Se trouve dans la mer des Indes.

Toupie détordue, *Troch. distortus*.

Blanche, solide, brillante, striée; le bout obtus; les tours de spire écartés, le premier bossu; l'ouverture comprimée, ovale.

Pallas, Spic. zool. 10. tab. 3. fig. 7, 8. *Chemn.* Conch. 5. tab. 160. fig. 1513. a. b.

On ignore son pays natal.

Toupie virgate, *Troch. virgatus*.

Pyramidale, avec des virgules roses et blanches, et plusieurs séries de nodosités; la base avec des cercles concentriques, blancs et rouges.

Lister, tab. 631. fig. 17. *Chemnitz*, Conch. 5. tab. 160. fig. 1514 et 1515.

Se trouve dans la Méditerranée.

Toupie fovéolate, *Troch. foveolatus*.

Cendrée, variée de rouge, de blanc et de vert; les tours de spire tuberculés à leur bord inférieur, l'extrémité avec des cercles dentelés.

Chemnitz, Conch. 5. tab. 161. fig. 1516 — 1519.
Se trouve dans la mer Rouge.

Toupie diaphane, *Troch. diaphanus*.

Mince, demi-transparente, entourée de petits tubercules arrondis, alternativement blancs et fauves; les tours de spire convexes.

Spengl. Naturf. 9. tab. 5. fig. 2. a. b. *Chemnitz*, Conch. 5. tab. 161. fig. 1520, 1521.

Se trouve à la Nouvelle Zélande.

Toupie iridée, *Troch. iris*.

Très unie, bleuâtre, variée de lignes rouges, ondulées et anguleuses, et des stries iridées.

Walch. Naturf. 4. tab. 1. fig. 5, 6. *Chemn.* Conch. 5. tab. 161. fig. 1522 et 1523.

Se trouve dans l'Océan Austral.

Toupie rostrate, *Tr. rostratus*.

Pyramidale, transversalement striée, variée de blanc et de rouge; l'extrémité demi-transparente et verte.

Chemn. Conch. 5. tab. 161. fig. 1524 et 1525.

Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie notate, *Troch. notatus*.

Striée en sautoir, sillonnée en dedans; l'extrémité très rouge.

Schroet, einl. in Conch. tab. 3. fig. 14.

Se trouve dans l'Océan Austral.

Toupie élégante, *Troch. elegans*.

Pyramidale, striée de pourpre, un peu brune.

Zorn. Naturf. 7. tab. 2. fig. D. 1, 2.

Se trouve dans la mer du Sud.

T. mélanostome, *Troch. melanostoma*.

Obtusément pyramidale, tachetée de vert; l'ouverture très noire en dedans.

Chemnitz, *Conch.* 5. tab. 161. fig. 1526. a. b.
Se trouve dans la mer du Sud.

T. rouge blanche, *Troch. erythroleucos*.

Pyramidale, striée de rouge et de blanc.
Chemn. *Conch.* 5. tab. 162. fig. 1529. a. b.
Se trouve sur la côte d'Afrique.

Toupie imbriquée, *Troch. imbricatus*.

Pyramidale, avec des côtes, des sillons et des plis longitudinaux; les tours de spire élevés en leurs bords.

Lister, tab. 628. fig. 14. *Guatt.* tab. 60. figure Q.
Chemnitz, *Conch.* 5. tab. 162. fig. 1531 — 1535.
Se trouve dans la mer d'Amérique.

Toupie américaine, *Troch. americanus*.

Longitudinalement sillonné, couleur d'ocre; les tours de spire transversalement striés; la lèvre denticulée.

Chemn. *Conch.* 5. tab. 162. fig. 1534 et 1535.
Se trouve sur les côtes de l'Amérique méridionale.

Toupie couleur de ciel, *Troch. caelatus*.

Bleu de ciel, avec des cavités, des plis et des écailles obliques et inégales; les tours de spire sillonnés et striés transversalement dans leur milieu; le premier tour avec des épines à son bord inférieur.

Lister, tab. 646. fig. 38. et tab 647. fig. 40. *Fa-*

vanne, pl. 79. fig. I. *Chemnitz*, *Conch.* 5. tab. 162. fig. 1536, 1537.

Se trouve sur les côtes de l'Amérique méridionale.

Toupie pourpre, *Troch. purpureus*.

Pourpre; les tours de spire plissés et tuberculés, avec des séries de petits tubercules ronds; l'ouverture presque orbiculaire.

Chemnitz, *Conch.* 5. tab. 162. fig. 1538, 1539.
On ignore son pays natal.

Toupie de Cook, *Troch. Cookii*.

Bleu de ciel, avec plusieurs rangs de tubercules et de plis obliques et ondulés; les tours de spire canaliculés des deux côtes; le premier convexe en dessus et plat en dessous.

Spengl. *Naturf.* 9. tab. 3. fig. 5, 6. *Chemnitz*, *Conch.* 5. tab. 163. fig. 1640. a. b. et tab. 164. fig. 1551.

Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie noduleuse, *Troch. nodulosus*.

Presque brune, la base convexe; les tours de spire avec une seule série de tubercules, excepté le premier qui en a deux; la lèvre marginée des deux côtés.

Chemn. *Conch.* tab. 163. fig. 1545, 1546.
Se trouve dans la mer du Sud, sur la côte de l'Amérique méridionale.

Toupie Mauricienne, *Tr. mauritianus*.

Pyramidale, blanche, variée de rouge et de vert; les tours de spire obtusément épineux en leur bord inférieur; la columelle émarginée et pliée.

Lister, tab. 625. fig. 11. *Gualteri*, Test. tab. fig. D. F. *Chemn.* Conch. 5. tab. 165. fig. 1547, 1548.
Se trouve dans la mer des Indes.

Toupie fenestrée, *Troch. fenestratus*.

Blanche, pyramidale; les tours de spire longitudinalement garnis de côtes, avec des cercles transverses de petits tubercules verts.

Rumphius, tab. 21. fig. 7. *Gualt.* Test. tab. 60. fig. N. *Chemn.* 5. tab. 165. fig. 1549, 1550.

Se trouve dans la mer des Indes et dans celle du Sud.

Toupie hélicine, *Troch. helycinus*.

Épaisse, convexe des deux côtés; la spire unie, les deux premiers tours de spire avec des côtes obliques et le milieu excavé; l'ouverture presque en croissant.

Knorr. Verg. 4. tab. 6. fig. 2. *Chemnitz*, Conch. 5. tab. 164. fig. 1560.

Se trouve sur les côtes de l'Amérique méridionale.

T. argyrostome, *Tr. argyrotomus*.

Ovale, avec des côtes ondulées et des stries transverses; l'ouverture comprimée; les tours de spire ventrus; le premier un peu caréné à sa base.

Chemn. Conch. 5. tab. 165. fig. 1562 et 1565.

Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie chinoise, *roch. sinensis*.

Obtusément pyramidale, noire; la base fasciée de pourpre; la columelle blanche; tous les tours de spire arrondis.

Knorr. Verg. 5. tab. 3. fig. 1. *Chemn.* Conch. 5. tab. 165. fig. 1564 et 1565.

Se trouve sur les côtes de la Chine.

Toupie lugubre, *Trochus. lugubris*.

Noire, à base un peu convexe, granuleuse; les tours de spire sillonnés, avec des séries de petits tubercules alternativement blancs et noirs.

Chemn. Conch. 5. tab. 165. fig. 1571.

Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie âpre, *roch. asper*.

Obtuse, les tours de spire cylindriques, sillonnés et striés transversalement, avec plusieurs séries de tubercules; la columelle dentée; l'ouverture en demi-lune.

Chemn. Conch. 5. tab. 166. fig. 1582.

On ignore son pays natal.

Toupie osilin, *Troch. tessellatus*.

Conique, convexe, striée transversalement, variée par des séries de taches quadrangulaires; l'ouverture large, presque comprimée; la lèvre tachetée de noir, la columelle blanche; dentiforme.

Lister, tab. 642. fig. 33, 34. *Gualt.* tab. 63. fig. D. E. G. *Adanson*, pl. 12. fig. 1.

Chemn. Conch. 5. tab. 166. fig. 1583 à 1587.

Voyez pl. 31, fig. 1 et 2, où elle est représentée de grandeur naturelle, avec son animal.

Se trouve dans la Méditerranée et sur les côtes d'Afrique.

Toupie citrine, *Troch. citrinus*.

Conique, convexe, citrine, avec des lignes anguleuses noires; les deux premiers tours de spire d'un brun noir.

Knorr. Verg. 1. tab. 10. fig. 7.

Se trouve dans la mer d'Asie.

Toupie granate, Trochus granatus.

Pyramidale, blanche, variée de rouge; la base un peu convexe; les tours de spire convexes avec des séries de petits tubercules; les deux premiers très-grands.

Chemnitz, Conch. 5. tab. 170. fig. 1654 et 1655.
Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie crocate, Troch. crocatus.

Unie, conique, blanche; le bout couleur de safran; les tours de spire cylindriques; avec un sillon peu profond vers la suture.

Born. Mus. cas. vind. Test. tab. 12. fig. 11, 12.
On ignore son pays natal.

*Toupies turriculées.**T. porte coquille, T. conchyliphorus.*

Les tours de spire cylindriques, un peu plissés; le premier et l'ouverture aplatis, presque bruns; la gorge et la base brunes.

Mart. Besch. Berl. Naturf. tab. 12. fig. 2, 3.
Chemn. Conch. 5. tab. 172. fig. 1688 et 1690.
Se trouve dans l'Océan Américain.


Toupie kachin, Troch. pantherinus.

Convexe, blanche, maculée de vert, de brun et de fauve; les tours de spire avec deux rangs de tubercules, le second tour plissé et caréné.

Adanson, pl. 12. fig. 9, et 12.
Se trouve sur la côte d'Afrique.

Toupie grandinate, Troch. grandinatus.

Couverte de globules liés ensemble, la base con-



1. 2. La Toupie osilin. 4. 5. La Janthine fragile.
3. . . La Toupie sorciere. 6. . La Toupie retan.

vexe, avec des cercles concentriques de globules; la lèvre deux fois dentée.

Chemnitz, Conch. 5. tab. 169. fig. 1659. Martyn, Conch. 1. fig. 38.

Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie inégale, *Troch. inæqualis.*

Aplatie, avec des cercles de points blancs en dessous; les tours de spire couronnés par des épines et deux rangées de petits tubercules.

Martyn, Univers. Conch. 1. tab. 31.

Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie tigre, *Troch. tigris.*

Presque ovale, grise, avec des virgules transversales, striées de blanc.

Mart. Univ. Conch. 2. tab. 75.

Se trouve dans la mer du Sud.

Toupie tannée, *Troch. pulligo.*

Conique, brune, obliquement striée de noir.

Martyn, Univ. Conch. 2. tab. 76.

Se trouve dans la mer du Sud.