

Schroet. Flusconch. tab. 8. fig. 15.
On ignore son pays natal.

Rocher tour, *Murex turris.*

Turriculé, les tours de spire couronnés de tubercules, et ceints de rangées de grains; le premier finement strié.

Born. Mus. Kircher. 5. fig. 79.

Rocher costate, *Murex costatus.*

Queue recourbée, obliquement striée; les trois premiers tours de spire avec des côtes; les quatre autres treillisés; la columelle avec un seul pli.

Knorr, Pétrif. 2. tab. C. 11. fig. 7. Dargenville, pl. 29. n° 10. fig. 5.

Se trouve fossile à Courtagnon.

Rocher tafon, *Murex sulcatus.*

Arrondi, sillonné circulairement; l'ouverture ovale; le premier tour de spire renflé.

Adanson, pl. 9. fig. 25.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Rocher âpre, *Murex asper.*

Plissé longitudinalement avec des côtes transverses; la spire un peu allongée; l'ouverture ovale; la lèvre crénelée.

Martini, Conch. 4. tab. 150. fig. 1596 et 1597.
On ignore son pays natal.

Rocher quenouille, *Murex colus.*

Turriculé, caudé, presque droit, strié, noueux, caréné.

List. tab. 917. fig. 10. 918. fig. 11. Gualt. 52. fig. L. Dargenv. pl. 9. fig. B. Favanne, pl. 55. fig. A. 5. 55. fig. C. 1. Martini, 4. tab. 144. fig. 1542.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher nivar, *Murex morio.*

Ouvert, à queue; noir, avec une fascie blanche; les tours de spire presque noueux; la columelle rugueuse.

Lister, tab. 928. fig. 22. Adanson, pl. 9. fig. 51. Mart. 4. tab. 139. fig. 1500, 1501. 140. figures 1502, 1505.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Rocher cochlidie, *Murex cochlidium.*

Ouvert, à queue; les tours de spire aplatis en dessus.

Séba, Mus 3. tab. 52. fig. 6. tab. 57. fig. 27, 28. Dargenville, tab. 9. fig. A. Favanne, pl. 55. fig. B. 3. Chemn. 10. tab. 164. fig. 1569.

Se trouve dans l'océan Indien.

Rocher spirille, *Murex spirillus.*

A queue; la spire pointue; les tours convexes en dessus.

Knorr, Verg. 6. tab. 24. fig. 5. Martini, Conch. 3. tab. 115. fig. 1069.

Se trouve dans la mer des Indes.

Roc. canaliculé, *Murex canaliculatus.*

Ouvert, à queue; les tours de spire avec un canal distinct.

Séba, Mus. 3. tab. 68. fig. 21, 22. Gualt. Test. tab. 47. fig. A. Martini, 3. tab. 66. fig. 758 à 740 et 67. fig. 742, 745.

Se trouve sur les côtes de l'Amérique septentrionale.

Rocher figue, *Murex ficus.*

Ouvert, à queue striée; les tours de spire avec un

canal distinct, le dernier brun, le premier couronné de nœuds à sa base.

Gualt. Test. tab. 26. fig. N. *Martini*, 3. tab. 66. fig. 741.

Se trouve dans la mer Rouge.

Rocher carique, *Murex carica*.

Ouvert, à queue, strié transversalement; la spire saillante, les tours couronnés d'épines à leur base.

Lister, tab. 880. fig. 3. *Gualt.* Test. tab. 47. fig. B. *Martini*, 3. tab. 67. fig. 744 et 69. fig. 756, 757.

Se trouve sur les côtes de l'Amérique septentrionale d'où il a été rapporté par Bosc.

Rocher rave, *Murex rapa*.

Solide, ombiliqué, strié transversalement; à trois rangs de nœuds; l'ouverture ample, striée.

Lister, tab. 894. fig. 14, 15. *Martini*, Conch. 3. tab. 68. fig. 750 — 753.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher neige, *Murex niveus*.

Ouvert, à queue, blanc, demi-transparent; les tours de spire avec un canal distinct, le premier carié par des côtes transverses.

Bonanni, Mus. Kircher. 5. fig. 337.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Rocher grain, *Murex granum*.

Hémisphérique, glabre, demi-transparent; la queue droite, ouverte.

Lister, tab. 881. fig. 5. *Ellis*, Coral. tab. 33. fig. A.

On ignore son pays natal.

Rocher aruan, *Murex aruanus*.

Ouvert, à queue; la spire couronnée d'épines.

Rhumph. tab. 28. fig. A. *Chemn.* Conch. 4. vig. 59 fig. D.

Se trouve dans les mers d'Asie.

Rocher unique, *Murex perversus*.

Ouvert, sinué, à queue; la spire tournée à gauche, couronnée d'épines peu apparentes.

Lister, tab. 907. fig. 27. *Gualt.* tab. 30. fig. B. *Dar-genov.* pl. 15. fig. F. *Chemn.* Conch. 9. tab. 107. fig. 904 à 907.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Rocher antique, *Murex antiquus*.

Oblong, ouvert, à queue, avec huit tours de spire cylindriques.

Lister, tab. 960. fig. 15. et 913. fig. 4. *Martini*, Conch. 4. tab. 138. fig. 1292. 1294. 1296.

Se trouve dans les mers du Nord.

Rocher méprisé, *Murex despectus*.

Oblong, ouvert, à queue courte; huit tours de spire ayant deux lignes élevées.

Lister, tab. 1507. fig. 1. *Martini*, Conch. 4. pl. 138. fig. 1295. *Chemnitz*, 10. tab. 165. fig. 1558.

Se trouve dans les mers du Nord.

Rocher en voûte, *Murex fornicatus*.

Ouvert, ovale, oblong, à queue; les tours de spire ventrus, striés longitudinalement, avec des angles un peu en voûte.

Se trouve dans les mers du Nord.

Rocher épais, *Murex incrassatus*.

Oblong, transversalement rugueux, longitudinalement strié; laèvre dentelée intérieurement et épaisse extérieurement.

Acta nidros, 4. tab. 16. fig. 25.
On ignore son pays natal.

Rocher tronqué, *Murex truncatus*.

Oblong, avec des côtes longitudinales; la queue un peu relevée, tronquée et échancrée.

Acta nidros, 4. tab. 16. fig. 26.

On ignore son pays natal.

Rocher argus, *Murex argus*.

Bossu, avec des côtes tuberculeuses, transverses; brun, avec une fascie plus obscure; le dedans blanc; l'ouverture ovale.

Rumph. tab. 49. fig. B. *Knorr*, Verg. 5. tab. 5. fig. 5. *Martini*, Conch. 4. tab. 127. fig. 1125 et tab. 131. fig. 1255, 1256.

Se trouve dans les mers d'Asie.

Rocher maculeux, *Murex maculosus*.

Treillisé, jaune, avec des fascies blanches et des bandes jaunes, alternes; la columelle unie; onze tours de spire cylindriques.

Lister, tab. 1022. fig. 86. *Favanne*, pl. 55. fig. X. 5. *Martini*, 4. tab. 152. fig. 1257, 1258.

Se trouve dans la mer des Indes.

R. magellanique, *M. magellanicus*.

Ventru, ombiliqué, strié transversalement, cendré, violet intérieurement; les tours de spire avec des côtes parallèles, le premier très grand.

Martini, Conch. 4. tab. 159. fig. 1297. *Knorr*, Verg. 4. tab. 50. fig. 2.

Se trouve au détroit de Magellan.

Rocher treillisé, *Mur. cancellatus*.

Ovale, solide, opaque, cendré; les tours de spire treillisés; un sillon distinct.

Knorr, Verg. 2. tab. 27. fig. 3.
On ignore son pays natal.

Rocher scolopace, *Mur. scolopaceus*.

Brun; les tours de spire avec des sillons accompagnés de tubercules; l'extrémité des tubercules et l'ouverture blanches.

Knorr, Verg. 3. tab. 26. fig. 4, 5.

On ignore le pays d'où il vient.

Rocher saunier, *Mur. trigonus*.

Légerement trigone, treillisé, les tours de spire renflés, contigus, le premier avec un gros tubercule.

Adanson, pl. 8. fig. 15.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Rocher solat, *Mur. semilunaris*.

Des côtes longitudinales, des stries transverses fines; les tours de spire aplatis, séparés, avec des séries de tubercules; l'ouverture en demi-lune.

Adanson, pl. 81. fig. 15.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Rocher sirat, *Mur. costatus*.

Strié circulairement; les tours de spire cylindriques, renflés, avec neuf côtes arrondies, parallèles, épineuses.

Adanson, pl. 8. fig. 19.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Rocher loset, *Mur. fusiformis*.

Alongé, avec beaucoup de rangées très rapprochées de petits tubercules.

Adanson, pl. 9. fig. 25.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Rocher trompette, *Mur. tritonis*.

Ventru, oblong, uni; les tours de spire arrondis; l'ouverture dentée; la queue courte.

Rumph. tab. 28. fig. B. *Lister*, tab. 959. fig. 12. *Gualt.* tab. 48. fig. A. *Martini*, 4. tab. 154. fig. 1277-135. fig. 1285. 136. fig. 1284, 1285.

Se trouve dans les mers d'Asie, la Méditerranée et sur les côtes d'Afrique: il a servi et sert encore de trompette guerrière.

Rocher nifat, *Mur. pusio*.

Ventru, oblong, uni; la spire striée; les tours de spire arrondis; l'ouverture unie, la queue courte.

Lister, tab. 914. fig. 7. *Gualt.* tab. 52. fig. I. *Adanson*, pl. 4. fig. 3. *Martini*, 4. tab. 147. fig. 1557.

Se trouve dans la Méditerranée et sur la côte d'Afrique.

Rocher tulipe, *Mur. tulipa*.

Ventru, oblong, uni; les tours de spire arrondis; la suture double; la columelle à deux plis; la queue très ouverte, striée.

Lister, tab. 910. fig. 1. 911. fig. 2. *Gualt.* tab. 46. fig. A. *Dargenv.* pl. 10. fig. K. *Mart.* 4. tab. 136, 157. fig. 1286 — 1291.

Se trouve sur les côtes d'Amérique.

Rocher à barreaux, *Mur. clathratus*.

Oblong, à queue, sillonné, avec des plis longitudinaux minces.

Lister, Conch. tab. 926. fig. 19. *Klein.* Ort. tab. 3. fig. 65.

Se trouve dans la mer du Nord.

Rocher nasse, *Mur. nassa*.

Solide, noir, ou d'un brun clair, avec une fascie blanche, presque diaphane; les tours de spire noueux; la columelle un peu plissée.

Lister, tab. 828. fig. 50. *Knorr*, Verg. 6. tab. 20. fig. 7. *Martini*, Conch. 4. tab. 122. fig. 1151 — 1154.

On ignore son pays natal.

Rocher plissé, *Mur. plicatus*.

Les tours de spire plissés et noueux.

Lister, tab. 959. fig. 34. *Séba*, Mus. 3. tab. 49. fig. 70. *Martini*, Conch. 4. tab. 125. fig. 1141, 1142.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher échelle, *Mur. scala*.

Ombiliqué; les tours de spire distans, en forme de coin, avec des côtes striées transversalement; l'ouverture en cœur.

Chemnitz, Conch. 4. vign. 57. fig. a. b. c.

On ignore le lieu d'où il vient.

Rocher panier, *Mur. fiscellum*.

Anguleux, plissé longitudinalement, strié transversalement; la lèvres dentée; la gorge violette; la queue droite et courte.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 160. fig. 1524 et 1525.

Se trouve dans les mers des Indes.

Rocher couronne, *Murex corona*.

Fascié de brun et de jaune; les tours de spire aplatis en dessus, couverts de lames onduleuses; la queue droite, entière.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 161. fig. 1526 et 1527. *Davila*, Cat. rais. 1. tab. 9. fig. A.

Se trouve dans le golfe du Mexique.

Rocher tonneau, *Murex dolarium*.

Ovale, ouvert, à queue; les tours de spire avec quelques cercles élevés, obtus.

Bonanni, Mus. Kircher. 3. fig. 347. *Knorr*, Verg. 5. tab. 5. fig. 5.

Se trouve dans l'Océan.

Rocher corné, *Murex corneus*.

Oblong, inégal; les tours de spire enveloppés à leur base; le bout tuberculeux; l'ouverture sans dents; la queue relevée.

Lister, anim. angl. tab. 5. fig. 4. *Guatt.* tab. 46. fig. F.

Se trouve dans la mer du Nord et fossile.

Rocher bûcheron, *Murex lignarius*.

Oblong, inégal; les tours de spire obtusément noueux; l'ouverture sans dents; la queue courte et droite.

Bonanni, Mus. Kircher. tab. 3. fig. 32. *Knorr*, Verg. 6. tab. 26. fig. 5. *Seba*, Mus 3. tab 52. fig. 4.

Se trouve dans la mer du Nord.

Rocher trapèze, *Murex trapezium*.

Alongé, obtusément anguleux; les tours de spire un peu noueux; l'ouverture dentée; la queue courte et droite.

Lister, tab. 951. fig. 26. *Gualteri*, tab. 46. fig. B. *Dargenville*, pl. 10. fig. F et H. *Mart.* 4. tab 159 et 140. fig. 1298 à 1311.

Se trouve dans la mer des Indes.

R. chauve-souris, *Murex vesperilio*.

Solide, ventru, uni; l'ouverture oblongue, ovale;

la queue et la spire couronnées, striées; les derniers tours de la spire canaliculés.

Lister, tab. 884. fig. 6. et 885. fig. 6. *Martini*, Conch. 4. tab. 142. fig. 1323, 1324, 1326, 1327.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher chicorée, *Murex scolymus*.

Mince, demi-transparent, ventru, strié transversalement; le dos uni en son milieu; la spire obtuse et ondulseusement noduleuse; la columelle à trois plis.

Guatt. tab. 52. fig. R. *Mart.* Conch. 4. tab. 142. fig. 1325.

On ignore son pays natal.

Rocher harpe, *Murex harpa*.

Ventru, avec des côtes longitudinales et transverses; la spire saillante; les tours distans.

Martini, Conch. 4. tab. 142. fig. 1328—1330.

On ignore son pays natal.

Rocher tube, *Murex tuba*.

Fusiforme, blanc, strié transversalement; la spire un peu brune; les tours distans, couronnés de nœuds à la base.

Martini, Conch. 4. tab. 143. fig. 1335.

Se trouve dans les mers de la Chine.

R. syracusain, *Murex syracusanus*.

Oblong, les tours de spire striés, plissés, carinés par des tubercules; l'ouverture sans dents; la queue courte.

Bonanni, Mus. Kircher, 3. fig. 80.

Se trouve dans la Méditerranée.

Rocher craticulé, *Murex craticulatus*.

Oblong; les tours de spire arrondis, plissés, trans-

versement réticulés; l'ouverture dentée; la queue courte.

Se trouve dans la Méditerranée.

Rocher écrit, *Murex scriptus*.

Presque sans queue, fusiforme, uni, pâle, avec des stries brunes, longitudinales; la lèvre dentée.

Se trouve dans la Méditerranée.

Rocher de Ternate, *Murex ternatatus*.

Strié transversalement; les tours de spire distans, avec des tubercules onduleux; l'ouverture oblongue: la queue droite, allongée.

Lister, tab. 592. fig. 12. *Séba*, Mus. 3. tab. 82. fig. 5. *Martini*, Conch. 4. tab. 140. fig. 1504 et 1505.

Se trouve à l'île de Ternate.

Roch. entonnoir, *Murex infundibulum*.

Ombiliqué, noueux onduleusement, des stries élevées de diverses nuances de brun; l'ombilic en entonnoir; la columelle à deux plis.

Bonanni, Mus. Kircher, 3. fig. 104. *Chemn.* Conch. 4. vign. 39. fig. A.

On ignore son pays natal.

Rocher polygone, *Murex polygonus*.

Un peu ventru, avec des tubercules onduleux: strié et sillonné par beaucoup d'angles obtus, noirs; l'ouverture ovale; la queue courte.

Lister, tab. 922. fig. 15. *Gualt.* tab. 52. fig. P. *Dardevil*, pl. 10. fig. L. *Martini*, 4. tab. 140. fig. 1506. 1509. et tab. 141. fig. 1514. 1516.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher d'Islande, *Murex islandicus*.

Strié transversalement, d'un blanc sale; la spire

avec un mamelon à son extrémité; les tours cylindriques, le premier très grand et ventru.

Martini, Conch. 4. tab. 141. fig. 1512 et 1515.

Se trouve dans la mer d'Islande.

Rocher uni, *Murex laevigatus*.

Fusiforme; la spire striée transversalement; les tours distans, aplatis, le premier cylindrique, uni; la queue allongée.

Dargenv. pl. 29. fig. 6. n° 4. *Martini*, 4. tab. 141. fig. 1519, 1520.

Se trouve fossile à Courtagnon.

Rocher fossile, *Murex fossilis*.

Fusiforme, treillissé; la queue longue.

Martini, Conch. 4. tab. 141. fig. 1521 et 1522.

Schroet, einl. in Vest. 4. tab. 8. fig. 5.

Se trouve fossile à Courtagnon.

Rocher blanc, *Murex candidus*.

Blanc, strié transversalement; les tours de spire séparés: le milieu caréné et couronné de tubercules: l'ouverture ovale; la lèvre intérieurement sillonnée et denticulée en ses bords.

Mart. Conch. 4. tab. 144. fig. 1539.

On ignore son pays natal.

Rocher crampon, *Murex ansactus*.

Brun, strié transversalement; la spire pointue; les tours séparés, convexes, noueux à leur base, la queue longue.

Regenf. Conch. 1. tab. 12. fig. 62. *Mart.* Conch. 4. tab. 144. fig. 1540.

On ignore son pays natal.

Rocher ondé, *Murex undatus*.

Solide, ventru, ondé, à plusieurs angles, finement

strié en travers ; la spire pointue , les tours noueux à leur base ; la lèvre denticulée.

Martini, Conch. 4. tab. 145. fig. 1545.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher longissime, *Murex longissimus*.

Mince, strié, la spire obtuse, noueuse ; la queue longue, très droite.

Martini, Conch. 4. tab. 145. fig. 1544.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher lance, *Murex lancea*.

Alongé ; les tours de spire avec des côtes transverses et des crénelures longitudinales ; l'ouverture ovale, en dedans blanche avec des côtes ; la columelle à deux plis.

Martini, Conch. 4. tab. 145. fig. 1547.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher alongé, *Murex angustus*.

Alongé ; le premier tour de spire avec des plis longitudinaux et des côtes transverses, le reste uni, cylindrique ; la queue avec des côtes transverses.

Valentin, Abb. tab. 1. fig. 6.

On ignore de quel pays il vient.

Rocher versicolor, *Murex versicolor*.

Presque cylindrique ; la spire obtuse, les tours cylindriques, striés, les inférieurs plus unis que les autres.

Martini, Conch. 4. tab. 147. fig. 1548. *Knorr*, Verg. 5. tab. 14. fig. 1.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher verruqueux, *Murex verrucosus*.

Ombiliqué, entouré de carènes, celles du milieu

plus élevées ; les tours de spire couronnés de tubercules, tachés de bruns ; la queue faisant un angle.

Martini, Conch. 4. tab. 146. fig. 1549. 1556.

Se trouve dans la mer Rouge.

Rocher striatule, *Murex striatulus*.

Mince, strié transversalement ; la spire pointue, les tours cylindriques ; la queue longue ; l'ouverture ovale, la lèvre crénelée.

Martini, Conch. 4. tab. 146. fig. 1551, 1552.

On ignore son pays natal.

Rocher tigre, *Murex pardalis*.

Arrondi, blanc, maculé de violet ; des côtes longitudinales et des stries transverses ; la spire obtuse, la queue alongée.

Knorr, Verg. 2. tab. 5. fig. 4. *Martini*, Conch. 4. tab. 149. fig. 1584.

On ignore le pays d'où elle vient.

Rocher géant, *Murex gigas*.

Les tours de spire renflés, bossus, noueux, annulés ; la queue relevée ; la lèvre denticulée, inférieurement.

Lister Conch. tab. 951. fig. a.

On ignore son pays natal.

Rocher ligneux, *Murex lignosus*.

Blanchâtre ; la spire obtuse, les tours de spire presque couronnés par des tubercules rugueux et inégaux ; la queue striée transversalement.

Gualt. Test. tab. 52. fig. O.

On ignore le pays d'où il vient.

Rocher gibuleux, *Murex gibulus*.

Turriculé, orangé ; la spire obtuse, les tours dis-

tans ; des côtes longitudinales, des stries flexueuses, transverses, la queue courte.

Knorr, Vergn. 5. tab. 10 fig. 4.

On ignore son pays natal.

Rocher granulaire, *Murex granularis*.

Turriculé ; les tours de spire contigus, avec une ligne flexueuse séparée, le premier ventru.

Knorr, Verg. 5. tab. 14. fig. 4.

Se trouve dans la Méditerranée.

Rocher étendard, *Murex vexillum*.

Turriculé, avec des côtes transverses ; les tours de spire convexes ; l'ouverture ovale ; la lèvre denticulée ; la queue courte.

Knorr, Verg. 6. tab. 26. fig. 5.

On ignore le pays d'où il vient.

Rocher renard, *Murex vulpinus*.

Oblong, ventru ; les tours de spire striés sur leurs bords ; l'ouverture unie ; la queue courte, relevée.

Born, Mus. cas. vindob. tab. 11. fig. 10, 11.

On ignore le pays d'où il vient.

Rocher lipin, *Murex aser*.

Ovale, strié transversalement ; les tours de spire aplatis, couronnés par des rangs de tubercules arrondis.

Adanson, pl. 8. fig. 18.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Roch. champenois, *Murex campanicus*.

Ventru ; la spire obtuse, treillisée ; les tours carénés, le premier ventru, uni ; la queue longue, unie.

Dargenv. pl. 29. fig. 6, n° 5. *Schroet.* cinl. in *Verst.* 4. tab. 8. fig. 7.

Se trouve fossile à Courtagnon.

Rocher aréneux, *Murex arenosus*.

Les tours de spire avec des côtes en sautoir, le premier très grand, et les trois derniers unis ; la queue aiguë ; l'ouverture ovale ; la lèvre extérieure dentée.

Spengl. N. Samml. schr. daen. Ges. 1. tab. 2. fig. 8.

Se trouve dans la mer de l'Inde.

Rocher marocain, *Murex maroccensis*.

Alongé ; presque brun, strié transversalement ; la spire pointue, les tours gauches, distans, cylindriques, avec les côtes longitudinales ; la queue saillante ; l'ouverture ovale.

Martini, N. Mannigf. 4. tab. 2. fig. 17. 19. *Chemn.* Conch. 9. tab. 105. fig. 896.

Se trouve sur la côte de Maroc.

Rocher liné, *Murex lineatus*.

Oblong, blanchâtre, strié transversalement de roux ; la queue courte et droite.

Chemn. Conch. 10. tab. 164. fig. 1572.

Se trouve sur les côtes de la Nouvelle-Zélande.

Rocher perron, *Murex perron*.

Presque turriculé ; les tours de spire carénés en dessus, marginés, aplatis, la queue droite, alongée.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 164. fig. 1573, 1574.

Se trouve dans la mer du Sud.

Rocher larve, *Murex larva*.

Cylindrique ; la spire avec un cercle de tubercules crénelés ; les tours supérieurs plissés, noueux, les inférieurs aplatis ; la queue droite, unie, échancrée.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 164. fig. 1575, 1576.

On ignore son pays natal.

Rocher néritoïde, *Murex neritoideus*.

Solide, épais, inégal; la spire saillante, les tours striés transversalement; l'ouverture en demi-cercle, striée; la queue courte, droite.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 165. fig. 1577 et 1578.

On ignore le pays d'où il vient.

Roch. prismatique, *Murex prismaticus*.

Ovale, anguleux, sillonné et plissé longitudinalement, irridé; la queue droite, la lèvre denticulée.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 169. fig. 1633, 1636.

Se trouve dans la mer des Indes.

Roch. colombier, *Murex columbarium*.

Des plis et des côtes longitudinales; des sillons transverses anguleux, épineux; la carène alternativement blanche et brune; la queue droite et courte; la lèvre denticulée.

Chem. Conch. 10. tab. 169. fig. 1637, 1638.

Se trouve dans la mer des Indes.

Rocher raboteux, *Murex asperimus*.

Varié de brun, de jaune et de blanc; des côtes; les tours de spire à bords tuberculés, avec une fascie brune au milieu, l'autre blanche; la queue courte, relevée, large.

Kaemmer, Cab. rudolst. tab. 9. fig. 7.


On ignore le pays d'où il vient.

Rocher ondulé, *Murex undulatus*.

Sillonné, blanc, ondulé de jaune rougeâtre; les sillons élevés, striés; les tours de spire à bords noduleux; la queue droite.

Mollusques.

Pl. 21.



Dessiné del.

Chablain Sculp.

1. Le Rocher babylonien
2. Le Ro. brandaire

3. Le Ro. lavandier.
4. Le Ro. chicorée.

Kaemmer, Cab. Rudolst. tab. 10. fig. 1.
Se trouve dans la mer Rouge.

ROSTELLAIRE, *ROSTELLARIA*, *Lamarck*.

Coquille fusiforme, terminée inférieurement par un canal en bec pointu: bord droit, entier ou denté, plus ou moins dilaté en aile, avec l'âge, et ayant un sinus contigu au canal.

On ne connaît encore, dans la mer, qu'une coquille de ce genre; c'est le strombe fuseau de *Linnaeus*, que ce naturaliste avait regardé lui-même comme mal placé; mais on en connaît trois espèces fossiles, venant de Courtaignon ou de Grignon.

Alex. Brongniard et *R. Coquebert* ont imprimé dans le n° 25 du Bulletin de la Société Philomatique, des observations sur la formation des coquilles de ce genre, observations dont on a fait usage dans l'Introduction, comme on l'a vu, et à leur suite, ils ont caractérisé les espèces fossiles dont il va être fait mention.

Quant à l'espèce marine, elle est extrêmement rare, et on ne sait rien sur ce qui concerne l'animal qui l'habite.