

Chemnitz, Conch. 10. tab. 157. fig. 1504 et 1505.

Se trouve dans la mer des Indes.

Str. de Norwège; *Str. Norwegicus*.

Oblong, blanc; les tours de spire cylindriques; l'ouverture ovale, évasée; la queue relevée.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 157. fig. 1497 et 1498.

Se trouve sur les côtes de Norwège.

BUCCIN, *BUCCINUM*, Linnæus.

Coquille ovale ou oblongue, dont l'ouverture est terminée à la base par une échancrure oblique, sans canal sensible, ni rebord extérieur.

Ce genre, dans Linnæus, comprenait un très grand nombre d'espèces, dont les groupes étaient assez différens les uns des autres, par leur forme, pour pouvoir former des genres nouveaux.

Aussi Bruguière l'a-t-il divisé en quatre, en circonscrivant le caractère de Linnæus dans des bornes plus étroites; pour le genre auquel il a conservé le nom de buccin.

Ces quatre genres sont les buccins, les vis, les casques et les pourpres.

La mort l'a empêché de terminer son tra-

vail, et il a laissé les genres des vis et des pourpres inédits.

Lamarck est allé plus loin. Il a encore subdivisé le genre buccin de Bruguière en quatre autres genres; le genre harpe, dont le type est le *buccinum harpa*; le genre nasse, dont le type est le *buccinum mutabile*, Linn.; le genre tonne, dont le type est le *buccinum galea*, Linn.; le genre éburne, dont le type est le *buccinum glabratum*, Linn.

Les caractères qu'il a donnés à ces quatre nouveaux genres sont :

Harpe, *harpa*; coquille ovale ou bombée, munie de côtes longitudinales, parallèles et tranchantes; ouverture échancrée intérieurement, et sans canal; columelle lisse, à base terminée en pointe.

Nasse, *nassa*; coquille ovale; ouverture se terminant inférieurement par une échancrure oblique, un peu canaliculée, base de la columelle cachant en partie l'échancrure, et paraissant tronquée obliquement.

Tonne, *dolium*; coquille ventrue, subglobuleuse, cerclée transversalement, à bord

droit, denté ou crénelé dans toute sa longueur; ouverture oblongue, très-ample, échancrée inférieurement.

Eburne, *eburna*; coquille ovale ou alongée, lisse, à bord droit, très-entier; ouverture oblongue, échancrée inférieurement; columelle ombiliquée, subcanaliculée à sa base.

Ces genres comprennent la presque totalité des coquilles figurées par Dargenville et Favanne, sous les mêmes noms et sous celui de tonnes.

Les buccins, dont il est ici question, renferment des coquilles renflées, tantôt minces, tantôt épaisses, ayant de trois à dix tours de spire, un sommet plus souvent aplati, une surface rarement unie; les couleurs obscures sont celles qui y dominent; la lèvre est étendue ou évasée, plus ou moins en arc, rarement dentelée.

Les animaux qui habitent ces coquilles, ont une tête alongée, échancrée ou creusée en arc, accompagnée de deux cornes coniques, près de deux fois plus longues qu'elle. C'est au milieu de la longueur de ces cornes, du côté ex-

térieur, que sont placés les yeux. La bouche est située à la partie inférieure et moyenne de la tête; elle consiste en un petit trou ovale et transversal, d'où l'on soupçonne qu'il sort une petite trompe.

Le pied consiste en un gros muscle aplati et ridé, qui présente quelques différences dans sa forme, suivant les espèces. L'opercule est essentiel aux buccins; il est ordinairement très mince, cartilagineux, formé de stries concentriques, et de la forme de l'ouverture de la coquille, qu'il bouche très exactement quand l'animal veut s'y renfermer. Il est ordinairement attaché entre le pied et le manteau, et sert, par cette position, à raffermir la marche et à favoriser le mouvement progressif de l'animal.

Le manteau est une membrane qui fait partie du corps de l'animal, et tapisse les parois intérieures de la coquille; ses bords sont simples, crépus ou ondés, suivant les espèces. Il part, vers la partie postérieure de la tête un tuyau assez long qui sort de la coquille par l'échancrure de sa base, et en est vraisemblablement la principale cause: ce

tuyau ne doit être considéré que comme le prolongement des bords du manteau, étant fendu, en dessous, dans toute sa longueur, et de la même substance que lui. Cet organe sert à l'animal pour se fixer aux corps solides : il le porte ordinairement relevé vers le dos de sa coquille, pendant qu'il rampe au fond de l'eau, à la manière des hélices terrestres.

Lister a fait connaître, dans ses dissertations anatomiques, la structure du buccin couronné; Adanson, celle des buccins perdrix, dentelé, teinturier et totombo; Othon Muller, des buccins ondes et du Nord. Les remarques de ces Naturalistes sont conformes à celle de Bruguière, Dargenville, Fabius Columna et autres.

Il est à croire, d'après les observations d'Adanson, que les buccins sont unisexuels et ovipares, et que la coquille du mâle présente quelques différences avec celle de la femelle. Les buccins mâles ont ordinairement la coquille moins renflée et plus longue, et laissent sortir de la droite du col, une verge semblable à une languette.

C'est de quelques espèces de ce genre,

principalement du buccin teinturier et du buccin cordonné, que les anciens tiraient la pourpre, ainsi qu'il a été dit dans le discours préliminaire. L'analogie porte à penser que la plupart des autres peuvent fournir cette couleur; mais on manque de moyens pour faire des observations à cet égard, cette teinture étant partout abandonnée (1).

Bruguière a divisé ses buccins en trois sections, relativement à la forme totale de la coquille, sans égard au volume ni à l'échancrure.

La première comprend les buccins à coquille ventrue.

La seconde, ceux à coquilles dont la spire a presque la longueur du tour inférieur.

Enfin la troisième, ceux dont la coquille est plus alongée, mais non encore turriculée.

Buccins dont la coquille est ventrue.

B. pelure d'oignon, *Buccinum olearium*.

Ovale; les côtes plates, trois fois plus larges que les sillons; l'ouverture plissée.

(1) Il paraît cependant qu'on en fait encore usage sur les côtes d'Angleterre pour marquer le linge.

Lister, tab. 985. fig. 44. *Gualt.* tab. 44. fig. T.
Martini, 3. tab. 117. fig. 1076 et 1077.
Se trouve dans la mer des Indes et aux Antilles.

Buccin cannelé, *Buccinum galea.*

Côtes convexes, inégales vers le bord supérieur des tours; la spire courte.

Lister, tab. 898. fig. 18. *Gualt.* tab. 42. *Favanne*, pl. 27. fig. B. 1. *Martini*, 3. tab. 116. fig. 1070.
Se trouve dans la mer des Indes.

Buccin perdrix, *Buccinum perdix.*

Ovale, oblong; les côtes serrées, peu convexes, onduées de blanc; la lèvre droite légèrement ondulée.

Lister, tab. 984. fig. 43. *Gualt.* tab. 51. fig. F. *Dargenville*, pl. 17. fig. A. *Favanne*, pl. 27. fig. A. 1. *Adanson*, tab. 7. fig. 5. *Martini*, 3. tab. 117. fig. 1078. 1080.

Se trouve dans la mer des Indes et aux Antilles.

Buccin cordelé, *Buccinum dolium.*

Ovale, blanc; les côtes écartées, tachées de fauve; la lèvre droite ondulée.

Lister, tab. 899. fig. 19. *Gualteri*, tab. 59. fig. E. *Dargenville*, pl. 20. fig. C. *Favanne*, pl. 27. fig. C. 1. C. 2. *Adanson*, pl. 7. fig. 6. *Martini*, 3. tab. 117. fig. 1073.

Se trouve dans la mer des Indes.

Buccin fascié, *Buccinum fasciatum.*

Blanc, garni de côtes peu élevées, marqué de quatre bandes rousses; le bord de la lèvre droite saillant, denté à l'intérieur.

Séba, Thes. 3. fig. 17. *Favanne*, pl. 27. fig. B. 2. *Martini*, 3. tab. 118. fig. 1081.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Buccin pomme, *Buccinum pomum.*

Blanchâtre; les côtes peu convexes, tachées de jaune; l'ouverture étroite, plissée des deux côtés.

Rumph. Thes. tab. 23. fig. 3. *Gualteri*, tab. 51. fig. C. *Favanne*, pl. 27. fig. G. *Dargenville*, pl. 17. fig. L. *Martini*, 2. tab. 36. fig. 370, 371.

Voyez pl. 36, fig. 5, où il est représenté au cinquième de sa grandeur naturelle.

Se trouve dans la mer des Indes et aux Antilles.

B. double côte, *Buccinum bicostatum.*

Blanc; les côtes transverses, légèrement écailleuses; les sillons garnis d'une ligne élevée.

Martini, Conch. 10. tab. 134. fig. 1473.

Se trouve sur la côte de la Nouvelle-Zélande.

Buccin cabestan, *Buccinum trochlea.*

Ovale, gris, à trois côtes élevées, blanches, transverses; les sillons striés.

Petiver, Gaz. tab. 101. fig. 14. *Favanne*, pl. 34. fig. E. *Martini*, 3. tab. 118. fig. 1089.

Se trouve au détroit de Magellan et au cap de Bonne-Espérance.

Buccin harpe, *Buccinum harpa.*

Ovale, très coloré; les côtes longitudinales carénées, garnies d'une épine sur le haut des tours; les interstices striés.

Rumph. Thes. tab. 32. fig. K. L. *Lister*, tab. 992. fig. 55. *Gualt.* tab. 29. fig. C. E. G. *Favanne*, pl. 28. fig. A. 1. 3, 4. *Dargenv.* pl. 17. fig. D. App. tab. 2. fig. F. *Martini*, 3. tab. 119. fig. 1090, 1091. 1093, 1094. 1097.

Voyez pl. 36, fig. 1, où il est représenté au tiers de sa grandeur naturelle.

Se trouve dans la mer des Indes: varie beaucoup. Il est le type d'un nouveau genre dans Lamarck.

Buccin licorne, *Buccinum monoceros.*

Brun; les côtes inégales, garnies d'écaillés tuilées; la lèvre droite crénelée, armée, près de la base, d'une longue épine.

Pallas, Spicil. Zool. 10. tab. 3. fig. 3, 4. *Favanne*, pl. 27. fig. D. 1. *Martini*, 3. tab. 69. fig. 761.

Se trouve au détroit de Magellan.

Buccin narval, *Buccinum narval.*

Brun, lisse, marqué à l'extérieur de quelques lignes transverses écartées; la lèvre droite, unie, armée au bas d'une longue épine.

Se trouve au détroit de Magellan.

Buccin unicorne, *Buccinum unicorn.*

Très épais, gris, marqué de quelques lignes transverses écartées; la lèvre droite plissée dans l'intérieur, armée au bas d'une épine courte.

Se trouve au détroit de Magellan.

Buccins dont la spire a presque la longueur du tour inférieur.**Buccin noyau, *Buccinum nucleus.***

Brun, garni de stries transverses; la columelle plate; l'échancrure de la base comprimée.

Lister, Synops. tab. 976. fig. 32. *Mart.* 4. tab. 123. fig. 1185.

Se trouve à Madagascar et à la Nouvelle-Zélande.

Buccin grive, *Buccinum sulcatum.*

Sillonné transversalement, taché longitudinale-

ment de blanc ou de noir; l'échancrure de la base comprimée.

Lister, tab. 976. fig. 31. 980. fig. 39. *Barn.* Mus. cas. vind. Test. tab. 10. fig. 5, 6. *Mart.* 4. tab. 124. fig. 1170, 1171.

Se trouve dans les Indes et aux Antilles.

Buccin pygmée, *Buccinum lineatum.*

Brun, marqué de lignes transverses, blanches; l'échancrure de la base comprimée.

Dacosta, Conch. tab. 8. fig. 5.

Se trouve dans les mers d'Europe.

Buccin teinturier, *Buccinum lapillus.*

A côtes transverses écailleuses; la lèvre droite plissée; la columelle aplatie.

Lister, tab. 965. fig. 19. *Adanson*, pl. 7. fig. 4. *Mart.* 4. tab. 122. fig. 1136 et 1137.

Se trouve sur les côtes de l'Europe et de l'Afrique.

Buccin otahitien, *Buccinum otahitense.*

Gris, garni de côtes transverses; les sillons ridés et ponctués; le bord supérieur des tours de la spire finement crénelé.

Mart. Conch. 10. tab. 154. fig. 1477.

Se trouve dans la mer du Sud.

Bucc. lacuneux, *Buccinum lacunosum.*

A côtes transverses; les sillons profonds, garnis de fossettes; l'ouverture ovale; la lèvre droite ridée.

Mart. Conch. 10. tab. 154. fig. 1475.

Se trouve sur les côtes de la Nouvelle-Zélande.

Bucc. ondé, *Buccinum undatum.*

Finement strié, treillissé; les tours supérieurs de la spire plissés,

Lister, tab. 962. fig. 14. *Séba*, Thes. 3. tab. 39. fig. 76 à 80. *Favanne*, pl. 32. fig. D. *Mart.* 4. tab. 126. fig. 1206. 1211.

Se trouve sur les côtes de l'Europe, où on le mange.

Buccin du Nord, *Buccinum glaciale*.

A stries transverses, peu élevées; le milieu du tour inférieur avec une carène obtuse.

Mart. Conch. 10. tab. 152. fig. 1446 et 1447.

Se trouve dans la mer du Nord.

Buc. papyracé, *Buccinum papyraceum*.

Très mince, garni de stries transverses peu élevées; le bord supérieur des tours de la spire légèrement aplati.

Lister, tab. 963. fig. 17. *Mart.* Conch. 4. tab. 126. fig. 1212.

Se trouve dans la mer du Nord.

Buc. mexicain, *Buccinum mexicanum*.

Épais, brun, garni de côtes transverses larges et de sillons striés; la columelle convexe.

Mart. Conch. 4. tab. 126. fig. 1213, 1214.

Se trouve dans le golfe du Mexique.

Bucc. francolin, *Buccinum francolinus*.

Brun, marqué de lignes blanches transverses et de taches éparses de la même couleur; la columelle lisse.

Séba, Thes. 3. tab. 53. fig. T.

On ignore son pays natal.

Buccin guirlande, *Buccinum sertum*.

Brun, garni de stries crénelées; marqué d'une

grande bande fauve au milieu du tour inférieur; la columelle colorée.

Lister, tab. 986. fig. 45. *Mart.* Conch. 3. tab. 121. fig. 1115, 1116.

On ignore son pays natal.

Bucc. canaliculé, *Buccinum spiratum*.

Ombiliqué, lisse, taché de jaune; le bord supérieur des tours de la spire creusé en canal de vive arête.

Lister, tab. 985. fig. 42. C. *Rumph.* Thes. tab. 49. fig. D. *Dargenv.* pl. 171. fig. N. *Favanne*, pl. 33. fig. E. 1. et E. 2.

Se trouve dans la mer des Indes, et fossile dans les Cévennes.

Buc. de Ceylan, *Buccinum Zeylanicum*.

Ombiliqué, lisse, marqué de taches jaunes en compartimens; les sutures point canaliculées; l'ombilic très profond, bordé de dents violettes.

Lister, tab. 982. fig. 42. *Gualt.* tab. 51. fig. B. *Mart.* Conch. 4. tab. 122. fig. 1119.

Se trouve à l'île de Ceylan.

Buccin ivoire, *Buccinum glabratum*.

Très lisse, ombiliqué, jaunâtre, sans sutures distinctes; le tour inférieur de la spire marqué extérieurement d'un sillon.

Lister, tab. 974. fig. 29. *Gualt.* tab. 43. fig. T. *Dargenville*, pl. 9. fig. G. *Favanne*, pl. 51. fig. F. *Martini*, 4. tab. 122. fig. 1117.

Voyez pl. 37. fig. 4, 5, où il est représenté un peu plus petit que nature.

Se trouve dans la mer des Indes et en Amérique.

Buccin tacheté, *Buccinum adpersum*.

Ombiliqué, lisse, jaunâtre, marqué de plusieurs rangs de taches rouges; la lèvres droite sinueuse.

Mart. Conch. 10. tab. 154. fig. 1475 et 1476.
Se trouve à la Nouvelle-Zélande.

Buccin bleuët, *Buccinum cyanum*.

Mince, bleuâtre; garni de stries transverses écartées; la columelle marquée d'un seul pli.

Mart. Conch. 10. tab. 152. fig. 1448.
Se trouve sur les côtes du Groënland.

Buccin écaille, *Buccinum testitulum*.

Lisse, marqué de plusieurs rangs de taches alternativement blanches et noires: la base un peu alongée en canal.

Lister, tab. 982. fig. 42. *Gualt.* tab. 51. fig. B. *Mart. Conch.* 10. tab. 152. fig. 1454.
Se trouve à la Nouvelle-Zélande.

Buc. flamboyant, *Buccinum flammeus*.

Lisse, fauve, marqué de flammes brunes ondées; les deux lèvres sans dents.

Martini, *Conch.* 4. tab. 127. fig. 1215, 1216.
On ignore son pays natal.

Buccin bombé, *Buccinum gibbum*.

Lisse, bombé, laèvre gauche étendue en plaque convexe; le bas de laèvre droite garni de dents épineuses.

Lister, tab. 975. fig. 30. *Gualt.* tab. 44. fig. B. *Favanne*, pl. 33. fig. S. 2 et 77. fig. A. 7. *Mart.* 4. tab. 125. fig. 1195.

Voyez la pl. 36, fig. 4, où il est représenté de grandeur naturelle avec l'animal.

Se trouve dans la Méditerranée.

Buccin miran, *Buccinum miran*.

Ovale, oblong, uni; la spire saillante; sillonné longitudinalement; la columelle à deux plis.

Buccinum mutabile. Linn. — *Adanson*, pl. 4. fig. I. *Gualt.* tab. 44. fig. R. *Favanne*, pl. 33. fig. S. 1. *Martini*, 4. tab. 33. fig. 5.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Buccin rayé, *Buccinum glans*.

Lisse, blanc, marqué de lignes brunes transverses; le bas de laèvre droite, garni de dents épineuses.

Lister, tab. 981. fig. 40. *Rumph.* *Thes.* tab. 29. fig. P. *Favanne*, pl. 33. fig. L. *Martini*, 4. tab. 125. fig. 1196, 1198.

Se trouve dans la mer des Indes.

B. tuberculeux, *Buccinum papillosum*.

Roussâtre, couvert de plusieurs rangs de tubercules arrondis; le bas de laèvre droite garni de dents épineuses.

Lister, tab. 969. fig. 23. *Gualt.* tab. 44. fig. M. *Dargenv.* tab. 9. fig. I. *Favanne*, pl. 33. fig. G. 2. *Martini*, 4. tab. 125. fig. 1204, 1205.

Se trouve dans la mer des Indes.

Buccin liseré, *Buccinum zonale*.

A stries transverses très fines, à plis longitudinaux peu marqués, et à une bande noire près les sutures.

Gualt. tab. 44. fig. M.

Se trouve à Saint-Domingue.

Buccin crénelé, *Buccinum crenulatum*.

Strié, plissé; le bord supérieur des tours de la spire aplati et crénelé; les deux lèvres dentées.

Lister, tab. 967. fig. 22. *Favanne*, pl. 33. fig. K. 3.

On ignore son pays natal.

Buccin olivâtre, *Buccinum olivaceum*.

Plissé, lisse, strié près de la base; le bas de laèvre droite garni de dents épineuses.

Guall. tab. 44. fig. D. Favanne, pl. 53. fig. K. 2.
Se trouve dans les Antilles.

Buccin chardon, *Buccinum senticosum.*

A plis et stries aigus ; la columelle marquée de plis obliques.

Murex senticosus, Linn. — Guall. tab. 51. fig. G. 1.
Dargenv. pl. 9. fig. O. Favanne, tab. 51. fig. L. Mart.
4. tab. 155. fig. 1466, 1467.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Buc. cordonné, *Buccinum reticulatum.*

Jaunâtre, treillissé par des plis longitudinaux serrés, et des stries transverses ; les deux lèvres dentées.

Lister, tab. 966. fig. 21. Guall. tab. 44. fig. C. Le corvet. *Adanson*, pl. 8. fig. 9. Mart. 4. tab. 124. figure 1162, 1163, 1164.

Se trouve sur les côtes de l'Europe et de l'Afrique.

Buccin miga, *Buccinum miga.*

A plis obliques, ondulés et à stries transverses peu profondes ; l'ouverture violette, presque ronde.

Séba, Thes. 3. tab. 53. fig. 43. *Adanson*, pl. 8. fig. 10. Mart. 4. tab. 124. fig. 1167 à 1169.

Se trouve au Sénégal et dans la Méditerranée.

Buccin ascagne, *Buccinum ascanias.*


Garni de plis obliques et de stries transverses élevées ; l'ouverture ovale, blanche.

Guall. tab. 44. fig. N.

Se trouve dans la Méditerranée.

Bucc. treillissé, *Buccinum clathratum.*

Bombé, à côtes transverses ondulées, à plis sur la spire ; la suture canaliculée ; les deux lèvres striées.



Desvoul. del.

Chatelain Sculp.

1. . . . Le Buccin harpe.

4. Le Buc. bombé.

2. 3. Le Buc. casquillon.

5. Le Buc. pomme.

Bonanni, Renel. 3. fig. 62. *Born*. Mus. cæs. vind. Test. tab. 9. fig. 17, 18.

Se trouve dans la mer des Indes, et fossile à Courtagnon.

Buccin plissé, *Buccinum plicatulum*.

Garni de plis obliques, écartés, et de stries transverses aiguës; la columelle grenue.

Se trouve à la Guadeloupe.

Buccin totombo, *Buccinum pullus*.

Treillisé par des stries profondes, serrées; la lèvre gauche étendue en plaque convexe.

Lister, tab. 970. fig. 25. *Gualt.* tab. 44. fig. M. *Adanson*, pl. 8. fig. 11.

Se trouve dans les Indes et sur la côte d'Afrique.

Bucc. couronné, *Buccinum coronatum*.

Lisse, livide; le bord supérieur des tours de la spire garni d'un rang de tubercules; la lèvre droite épineuse.

Séba, Thes. 5. tab. 53. fig. 28, 29. *Schroet.* einl. in Conch. tab. 1. fig. 4.

Buccin casquillon, *Buccinum arcularia*.

Stries transverses, et plis obliques terminés près la suture par de gros tubercules; la lèvre gauche étendue en plaques épaisses.

Lister, tab. 970. fig. 24. *Gualt.* tab. 54. fig. O. Q. R. *Dargenv.* pl. 14. fig. C. *Favanne*, pl. 33. fig. F. *Martini*, 2. tab. 41. fig. 409. 412.

Voyez pl. 56, fig. 2 et 3, où il est représenté presque de grandeur naturelle.

Se trouve dans la mer des Indes, et fossile en Piémont.

Buccin thersite, *Buccinum thersites*.

Lisse, bossu; la spire plissée; la lèvres gauche étendue en plaques épaisses.

Lister, tab. 971. fig. 26. *Séba*, Thes. 5. tab. 537. fig. 46. *Martini*, Conch. 2. tab. 41. fig. 415.

Se trouve dans la mer des Indes.

Buccin bossu, *Buccinum gibbosulum*.

Bossu, lisse partout; la lèvres gauche étendue en plaque épaisse.

Lister, tab. 973. fig. 28. *Gualt.* tab. 41. fig. 414 et 415. *Martini*, 2. tab. 41. fig. 414, 415.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Buc. tricariné, *Buccinum tricarinatum*.

Brun, lisse; le tour inférieur de la spire marqué de trois carènes arrondies; l'ouverture terminée en haut par un canal très étroit.

On ignore son pays natal.

B. verruqueux, *Buccinum verrucosum*.

Gibbeux, tuberculeux; la lèvres aplatie et gibbeuse.

Lister, Synop. tab. 972. fig. 27.

Se trouve dans la mer des Indes.

Buccin ponctué, *Buccinum punctatum*.

Brun, épais, lisse, marqué de taches et de points blancs; l'ouverture longue et étroite.

Lister, tab. 826. fig. 48. *Gualt.* tab. 45. fig. D. *Mart.* Conch. 2. tab. 44. fig. 465, 466.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Buccin jaune, *Buccinum flavum*.

Jaune, épais, marqué de lignes longitudinales blan-

ches; l'ouverture droite; la lèvres droite bossue dans l'intérieur.

On ne peut indiquer sa patrie.

Buccin velouté, *Buccinum nitidulum*.

Brun ou olivâtre, marqué de stries transverses, articulées de blanc; la lèvres droite dentée à l'intérieur.

Gualt. tab. 52. fig. C. Le big. *Adanson*, pl. 9. fig. 27. Se trouve sur la côte d'Afrique.

Buccins dont la coquille est allongée, mais non turriculée.**Buccin noir**, *Buccinum fuscatum*.

Oblong, garni de stries vers la suture; la base faiblement recourbée; l'ouverture sans dents.

On ignore son pays natal.

Buccin nifat, *Buccinum nifat*.

Oblong, blanc, lisse, marqué de taches carrées rougeâtres, disposées sur plusieurs rangs; l'ouverture sans dents.

Lister, tab. 914. fig. 7. *Adanson*, pl. 4. figure 3. *Favanne*, pl. 55. fig. I. *Martini*, 4. tab. 147. figure 1. 357.

Se trouve dans l'Océan Indien et sur la côte d'Afrique.

Buccin nisot, *Buccinum nisot*.

Oblong, finement treillissé; la lèvres gauche dentée.

Adanson, pl. 10. fig. 3.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Buccin soni, *Buccinum soni*.

Oblong, brun, marqué de deux lignes transverses mamelonnées, blanches; la lèvre droite garnie de deux dents.

Adanson, pl. 10. fig. 6.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Buccin rac, *Buccinum rac*.

Oblong; les tours de la spire convexes, garnis de plus longitudinaux; les deux lèvres sans dents.

Adanson, pl. 10. fig. 4.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Buccin néritoïde, *Buccinum neriteum*.

Presque orbiculaire, aplati, lisse; la spire tronquée.

Gualt. tab. 85. fig. C. 1. *Plancus*, tab. 5. fig. 5. G. F. *Favanne*, pl. 11. fig. Q.

Se trouve dans la Méditerranée, aux Antilles et en Asie.



FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
IMP. DE V.° BASTIEN.

