

Patelle crénelée, *Patella crenata*.

Très mince, striée, radiée d'un noir olivâtre, le sommet aigu; le fond blanc.

*Lister*, tab. 557. fig. 16. *Gualt.* tab. 9. fig. G. *Martini*, 1. tab. 8. fig. 64, 65.

Se trouve dans la Méditerranée et sur les côtes d'Afrique.

Pat. ferrugineuse, *Patella ferruginea*.

Ferrugineuse, avec de petites lignes anguleuses, onduleuses, blanches; les stries élevées, noueuses; le bord replié; le dedans blanc de lait.

*Martini*, 1. tab. 8. fig. 66.

On ignore le lieu de son habitation.

P. mélanogramme, *pat. melanograma*.

Ovale, d'un jaune d'ocre; des stries élevées, noires; le sommet aigu, blanc; le dedans argenté, maculé; le fond avec une tache couleur de paille.

*Martini*, 1. tab. 8. fig. 67.

On ignore sa patrie.

Patelle sinueuse, *Patella repanda*.

Ovale, mince, les stries fines, ondulées, granuleuses, jaunâtres; le bord très sinueux en dedans, argentée avec des radiations brunes.

*Martini*, 1. tab. 8. fig. 68.

Se trouve au détroit de Magellan.

Patelle anguleuse, *Patella angulosa*.

Ovale, blanche, finement striée, avec des taches et des points; le bord octogone.

*Martini*, 2. tab. 8. fig. 69 et tab. 10. fig. 88, 89.

On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle tigre, *Patella tigrina*.

Ovale, unie, mince, brillante, d'un olive blématique, avec des rangées de points bruns; les côtes jaunâtres; le bord eptagone.

*Martini*, tab. 9. fig. 78.

On ignore le lieu de son habitation.

Patelle monoque, *Patella monopsis*.

Oblongue, aplatie, jaunâtre, striée de blanc; onze côtes inégales; le sommet rond, blanc; l'intérieur blanc.

*Lister*, tab. 552. fig. 11. *Bonanni*, Mus. Kircher, 1. fig. 32. *Martini*, 1. tab. 9. fig. 80 et tab. 10. fig. 82.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Pat. chlorostique, *Patella chlorostica*.

Ovale, brune, ponctuée de vert; onze côtes plus larges, creuses, inégales; le sommet blanc.

*Martini*, 1. tab. 10. fig. 84.

On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle perle, *Patella margaritacea*.

Mince, inégalement striée, blanche, le sommet orangé, ceint d'un anneau jaunâtre, le dedans nacré.

*Gualt.* 1. tab. 8. fig. 1. *Martini*, 1. tab. 10. fig. 85.

A. B.

Patelle mince, *Patella tenuis*.

Ovale, mince, très comprimée; jaune d'ocre varié de lignes brunes, angulaires; des stries élevées, obtuses, creuses, inégales.

*Martini*, 1. tab. 10. fig. 87.  
Son lieu natal est inconnu.

Patelle petite mitre, *patella mitrula*.

Épaisse, presque conique, plissée dans sa largeur, le bord sinueux.

*Lister*, tab. 544. fig. 51. *Martini*, 1. tab. 12. fig. 11, 12.

Se trouve dans la mer des Antilles : elle s'écarte un peu du genre, ou semble se rapprocher d'une valve d'huître.

Patelle plissée, *Patella plicaria*.

Ovale, avec trente stries obtuses, élevées, ondulées, transversalement rugueuses.

*Born. Mus. cæs. vind. Test.* tab. 18. fig. 1.  
Se trouve au détroit de Magellan.

Patelle pentagone, *Patella pentagona*.

Blanche, obtuse, pentagone; le bord dilaté, crénelé; le sommet obtus; le fond rougeâtre.

*Born. Mus. cæs. vind. Test.* tab. 18. fig. 4, 5.  
On ignore son pays natal.

Patelle dorée, *Patella aurea*.

Ovale, fragile, demi-transparente, blanche, argentée, radiée et striée sous l'épiderme; le sommet et le fond d'un vert doré.

*Martini*, Neuest. Mannigf. 1. tab. 1. fig. 9.  
Se trouve au détroit de Magellan.

Patelle conque, *patella conchacea*.

Mince, oblongue; des stries ondulées, très fines, d'un jaune cendré; les rayons élevés, obscurs; le sommet recourbé.

*Martini*, Neuest. Mannigf. 1. tab. 2. fig. 15, 14.  
Se trouve sur les côtes d'Amérique : se rapproche, pour la forme, d'une valve de moule.

Patelle stanée, *Patella stanea*.

Ovale, argentée; les stries élevées, aplaties; le sommet obtus, doré, le fond avec une ligne jaunâtre; le bord sinué.

On ignore son lieu natal.

Patelle candide, *Patella candidissima*.

Presque ronde, striée, blanche, avec une fascie brune, ponctuée; les stries inégales; le bord rugueux transversalement; le dedans blanc.

On ignore son lieu natal.

*Patelles mucronées.*

P. bonnet de dragon, *Patella ungarica*.

Entière, conique, aiguë, striée; le sommet recourbé; blanche, tachée de rouge; le fond rose.

*Lister*, tab. 544. fig. 52. *Gualt.* tab. 9. fig. V. V. *Dargenville*, tab. 2. fig. R. *Mart.* 1. tab. 12. figures 107, 108.

Voyez pl. 25. fig. 2, où elle est représentée de grandeur un peu moins que la nature.

Se trouve dans la Méditerranée, sur les côtes d'Amérique et souvent fossile.

Patelle antique, *Patella antiqua*.

Entière, oblongue, imbriquée; le sommet placé en arrière et recourbé.

Se trouve fossile.

Patelle mamillaire, *Patella mamillaris*.

Entière, conique, striée, presque diaphane; le sommet recourbé, uni, blanc; des fascies transverses jaunâtres.

*Lister*, tab. 557. fig. 17. *Martini*, 1 tab. 7. figures 58, 59.

Se trouve dans la Méditerranée et sur les côtes d'Afrique.

Patelle tricarinée, *Patella tricarinata*.

Presque diaphane, légèrement striée, avec trois grosses côtes antérieures; blanches en haut, vertes en bas.

*Schroet.* einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 2.

On ignore son lieu natal.

Patelle pectinée, *Patella pectinata*.

Ovale, entière, avec des stries rugueuses, un peu rameuses; le sommet central pointu; variée de gris et de fauve.

*Schroet.* einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 2.

Se trouve dans la Méditerranée.

Patelle jaune, *Patella lutea*.

Ovale, entière, convexe, striée; le sommet presque marginal, pointu, recourbé, ceint d'un anneau rougeâtre.

*Martini*, 1. tab. 17. fig. 154 et 155.

Se trouve dans la mer des Indes.

Patelle crête de coq, *Patella cristata*.

Diaphane, sillonnée; le dos caréné; la carène dentelée; le sommet recourbé.

On ignore son lieu natal.

Patelle ancyle, *patella lacustris*.

Ovale, membraneuse, entière, blanche; le sommet très petit, aigu, recourbé.

*Dargenville*, tab. 27. fig. 1. Zoom. fig. 1. L'ancyle, *Geoff. Coq.* pag. 125.

Se trouve en Europe, dans les eaux douces, adhérente aux plantes aquatiques; elle est très commune aux environs de Paris.

Patelle des rivières, *Patella fluviatilis*.

Ovale, mince, entière; le sommet recourbé et obtus.

*Lister*, tab. 141. fig. 59. *Guatt.* tab. 4. fig. A, A, B, B. *Dargenville*, tab. 27. fig. 1.

Se trouve dans les rivières et les eaux courantes.

Patelle aveugle, *Patella cæca*.

Entière, blanche, striée par des rangées de points élevés; le sommet aigu, droit.

*Muller*, Zool. Dan. 1. tab. 12. fig. 1. 5.

Se trouve sur les côtes de la Norvège, adhérente aux fucus: on ne lui découvre pas d'yeux.

Patelle virginale, *Patella virginea*.

Entière, blanche, avec dix-huit fascies rouges.

*Muller*, Zool. Dan. 1. tab. 12. fig. 4.

Se trouve sur les côtes de Norvège.

Patelle parquée, *Patella tessellata*.

Entière, blanche, finement striée, avec des taches carrées, rapprochées, rouges.

*Muller*, Zool. Dan. tab. 12. fig. 6, 7.

Se trouve dans la mer du Nord.

Patelle orange, *Patella fulva*.

Entière, unie, de couleur d'orange; le sommet pointu, presque vertical.

Müller, Zool. Dan. tab. 24. fig. 1—3.  
Se trouve sur les côtes de Norwège.

Patelle en spirale, *Patella subspiralis*.

Ovale, le sommet obtus, un peu en spirale.  
Se trouve dans la mer de Norwège.

Patelle ambiguë, *Patella ambigua*.

Ovale, le bord un peu denté; le sommet légèrement aigu, recourbé.  
Se trouve sur les côtes de Norwège.

Patelle rougeâtre, *Patella rubella*.

Entière, presque conique, unie, rougeâtre.  
Se trouve dans la mer de Groënland.

Patelle borniène, *Patella borniana*.

Ovale, entière, finement striée de blanc dans sa longueur, avec des veines rouges.

Helbling, Abh. boch. privatg. 4. tab. 1. fig. 7.  
On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle coiffe, *Patella calyptra*.

Entière, d'un brun pâle, sinuée en ses bords; les côtes légèrement imbriquées; le sommet recourbé.

Chemnitz, 10. tab. 169. fig. 1643, 1644. Martini, tab. 1. fig. 18.

Se trouve sur la côte ouest de l'Amérique septentrionale.

P. mélanoleuque, *Patella melanoleuca*.

Entière, striée alternativement de noir et de blanc.

Martini, 1. tab. 7. fig. 56, 57.  
On ignore son lieu natal.

Patelle pectoncle, *Patella pectunculus*.

Oblongue, convexe, avec des stries élevées, noduleuses, presque denticulées; le sommet recourbé en devant.

Martini, 1. tab. 12. fig. 115, 116.  
On ignore son lieu natal.

Patelle fasciée, *Patella fasciata*.

Ovale, blanche, fasciée de brun; les stries élevées, aiguës; le bord dilaté, cendré.  
On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle élégante, *Patella elegans*.

Striée en sautoir de blanc et de rouge; les rayons denticulés, le sommet blanc.  
On ignore son lieu natal.

Patelle écailleuse, *Patella squamosa*.

Des stries élevées, rudes, brunes, transverses; le sommet recourbé, argenté, avec une tache dorée à la pointe.

Knorr. Verg. 6. tab. 9. fig. 1, 2.  
On ignore son lieu natal.

Patelle squalide, *Patella squalida*.

Entière, brune; le sommet noueux, avec des stries

peu élevées; le bord intérieur bleuâtre, radié de brun.

Son lieu natal n'est pas connu.

Patelle safranée, *Patella crocea*.

Unie, un peu anguleuse, jaune, radiée de fauve; le sommet obtus, blanc; le fond blanc.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle blanche, *Patella candida*.

Ovale, unie, blanche en dehors et en dedans, avec une ceinture rose extérieure.

*Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 6.*

Son lieu natal est inconnu.

Patelle trigone, *Patella trigona*.

Comprimée, le milieu convexe, treillisé de blanc, avec une bande brune; le sommet marginal, obtus.

*Schroet. in Littérat. 5. tab. 84. fig. 6.*

Son lieu natal est inconnu.

Patelle minime, *Patella minima*.

Ronde, convexe, mince, unie, d'un blanc tacheté de roux; le sommet très obtus, blanc, marginal.

Se trouve dans la mer du Nord.

P. de Tranquebar, *Pat. tranquebarica*.

Ovale, mince, demi-transparente, finement striée de fauve, variée de taches blanches; le sommet avec une bande bleue.

*Lister, tab. 530. fig. 8. Martini, 1. tab. 12. fig. 114.*

Se trouve dans l'Océan indien.

Patelle liri, *patella perversa*.

Oblongue, demi-transparente, fragile, très unie; la base ferrugineuse.

*Adanson, tab. 2. fig. 2. Martini, 1. tab. 12. fig.*

*114. A. B.*

Se trouve sur la côte du Sénégal.

Patelle penchée, *patella cernua*.

Mince, sillonnée en sautoir, d'un incarnat léger; l'ouverture oblongue.

*Meusch. Naturf. 18. tab. 2. fig. 9.*

On ignore son lieu natal.

Patelle recourbée, *Patella incurva*.

Aplatie, blanche; le sommet pointu et contourné.

*Meusch. Naturf. 18. tab. 2. fig. 10.*

On ignore le lieu d'où elle vient.

Pat. interrompue, *patella interrupta*.

Ovale, déprimée, presque brune; des points verts disposés en rayons obliques, interrompus, le sommet obtus.

On ignore son lieu natal.

*Patelles à bords non dentés et à sommet obtus.*

Patelle gadin, *Patella affra*.

Conique, blanche; le milieu et le bord striés de vert.

*Gualt. tab. 9. fig. 10. Adanson, pl. 2. fig. 4. Mart. 1. tab. 5. fig. 54.*

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Patelle portugaise, *Patella lusitanica*.

Conique, blanche; le sommet entouré d'un anneau fauve radié; des stries granuleuses, un peu brunes, distinctes.

*Gualt.* tab. 8. fig. N. et tab. 9. fig. A. m.

*Martini*, 1. tab. 5. fig. 35, 36. et tab. 6. fig. 43.

Se trouve fréquemment sur les côtes de Portugal.

P. de la Jamaïque, *P. Jamaicensis*.

Arrondie, convexe, grise, striée en sautoir, le sommet un peu aigu, avec douze lignes orangées disposées en rayons.

*Martini*, 1. tab. 5. fig. 37.

Se trouve sur les côtes de la Jamaïque.

Patelle auréole, *Patella aureolata*.

Pyramidale, d'un gris rougeâtre; des stries circulaires, coupant des stries longitudinales; le sommet violet.

*Dargenville*, pl. 2. fig. A. *Martini*, 1. tab. 5. fig. 41.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Patelle flambée, *Patella flammea*.

Ovale, finement striée par des lignes circulaires d'un rouge cendré; les rayons ondulés, bruns; le sommet aigu, blanc à son centre.

*Dargenville*, pl. 2. fig. Q. *Martini*, 1. tab. 5. fig. 42.

On ignore son lieu natal.

Patelle de l'Inde, *Patella Indica*.

Plus aiguë d'un côté, d'un rouge gris; les rayons

unis; le sommet aigu, uni, ceint d'un anneau rougeâtre.

*Gualt.* tab. 8. fig. E. *Martini*, 1. tab. 5. fig. 49.

Se trouve dans la mer des Indes.

Pat. de Surinam, *patel. Surinamensis*.

Épaisse, presque ovale, jaunâtre, radiée de noir; les stries longitudinales, inégales, avec des nodosités dorsales; le sommet uni, blanc, obtus.

*Martini*, 1. tab. 7. fig. 50.

Se trouve communément à Surinam.

Patelle vitelline, *patella vitellina*.

Ovale, jaune; la base inégale, striée; le sommet obtus, blanc.

*Martini*, 1. tab. 7. fig. 51.

On ignore son lieu natal.

Pat. sanguinolente, *P. sanguinolenta*.

Solide, ovale, convexe; des stries élevées, capillaires, droites, mêlées avec des anguleuses; le sommet entouré d'un large cercle rouge ponctué.

*Lister*, tab. 537. fig. 18. *Mart.* 1. tab. 7. fig. 52.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Patelle unie, *patella lævigata*.

Ovale, blanche, striée; les stries aplaties, obliques, alternativement épaisses et minces; le sommet blanc, uni, brillant.

*Martini*, 1. tab. 7. fig. 54.

On ignore son lieu natal.

Patelle ponctuée, *patella punctulata*.

Arrondie, blanche, parsemée de points de diverses

couleurs; la base radiée et annulée de deux fascies brunes.

*Martini*, 1. tab. 7. fig. 55.  
On ignore le lieu de son habitation.

Patelle transparente, *patella pellucida*.

Presque ovale, bossue, transparente avec quatre rayons bleus.

*Lister*, tab. 545. fig. 27. *Martini*, Neuest. Man-  
nigf. tab. 1. fig. 12. *Chemn.* 10. tab. 168. fig. 1620,  
1621.

Se trouve dans la Méditerranée et dans la mer Bal-  
tique.

Patelle bouclier, *patella testudinaria*.

Aiguë, unie, très glabre.

*Lister*, tab. 551. fig. 9. *Gualteri*, tab. 8. fig. B.  
*Dargenville*, tab. 2. fig. P. *Martini*, 1. tab. 6. fig.  
45-48.

Voyez pl. 25, fig. 4, où elle est représentée de  
grandeur de moitié de nature.

Se trouve dans la mer du Nord et dans celle de  
l'Inde.

Pat. testudinale, *patella testudinalis*.

Ovale, striée.

*Favanne*, tab. 1. fig. Q. 2. *Chemn.* 10. tab. 168. fig.  
1614, 1615.

Se trouve très fréquemment sur les fucus, dans la  
mer du Nord.

Patelle comprimée, *Patella compressa*.

Ovale, oblongue, striée, jaune, maculée; les stries  
unies; le dos aplati.

*Lister*, tab. 541. fig. 25. *Martini*, 1. tab. 12. fig.  
106.

Se trouve dans la mer des Indes.

Patelle rustique, *Patella rustica*.

Brune, conique, avec cinquante stries obtuses.  
*Schroet.* einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 4.  
On ignore son lieu natal.

Patelle brune, *Patella fusca*.

Ovale, obtuse, brune, avec une fascie plus foncée;  
les stries élevées.  
On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle notée, *Patella notata*.

Striée; le sommet droit, un peu aigu, avec une  
tache noire en cœur, dont le milieu est blanc.  
*Schroet.* einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 5.  
Se trouve dans la Méditerranée.

Patelle cruciée, *Patella cruciata*.

Ovale, légèrement convexe, brune avec une croix  
blanche.  
*Schroet.* einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 6.  
On ignore quel est son pays natal.

Patelle réticulée, *Patella reticulata*.

Conique, comprimée, réticulée par des stries éle-  
vées; le sommet presque central, obtus.  
*Schroet.* einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 7.  
On ignore le lieu où on la trouve.

Patelle jade, *Patella deaurata*.

Ovale, presque entièrement dorée, les stries pres-  
que imbriquées; le bord plissé; l'intérieur strié d'ar-  
gent.

*Favanne*, pl. 1. fig. D. 1. et pl. 3. fig. D. 3.  
Se trouve au détroit de Magellan.

Pat. porte-étoile, *Patella stellifera*.

Ovale, striée par des lignes d'un brun noir, radiées de blanc; le dedans argenté.

*Chemnitz*, Conch. 10. tab. 168. fig. 1617.

Se trouve sur les côtes des îles de la mer du Sud.

Patelle rayonnante, *Patella radians*.

Ovale, demi-transparente, aplatie, striée avec des taches noires en étoiles; le dedans nacré.

*Chemn.* Conch. 10. tab. 168. fig. 1618.

Se trouve à la Terre-de-Feu et à la Nouvelle Zélande.

Patelle roue, *Patella rota*.

Presque raide, avec des stries brunes; le bord jaunâtre.

*Chemnitz*, Conch. tab. 168. fig. 1619.

Se trouve dans les mers de l'Inde et de l'Amérique.

Patelle libot, *Patella umbellata*.

Presque ronde, diaphane, aplatie; le sommet jaune; le bord très aigu; en dedans rayonné de jaune.

*Adanson*, tab. 2. fig. 1. *Favanne*, pl. 3. fig. H. *Chemnitz*, 10. tab. 169. fig. 1645, 1646.

Se trouve dans l'Océan Indien, et sur les côtes du Sénégal.

Patelle pustulée, *Patella pustulata*.

Mince, ovale, aplatie, radiée de blanc et ponctuée de rouge.

*Helbling*. Abh. priv. in *Bœhm.* 4. tab. 1. fig. 2.  
On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle symétrique, *Patella symetrica*.

Ovale, conique, solide, brune, avec des lignes perpendiculaires blanches, disposées en auréole; le bord coupé en arc.

*Helbling*. Abh. priv. in *Bœhm.* 4. tab. 1. fig. 13, 14.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle citrine, *Patella citrina*.

Ovale, convexe, finement striée de blanc, avec deux larges fascies jaunâtres; le sommet brun, le dedans blanc.

*Kaemmer.* Conch. *Rudolst.* tab. 2. fig. 6.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle du Cap, *Patella Capensis*.

Ovale, striée en sautoir; les stries longitudinales, alternativement blanches et brunes.

*Kaemmer.* Conch. *Rudolst.* tab. 2. fig. 1, 2.

Se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

Patelle goutte, *Patella guttata*.

Obscure, finement striée et variée de points de diverses couleurs.

*Schroet.* einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 2, 3.

On ignore le lieu où on la trouve.

Pat. mytiliforme, *Patella mytiliformis*.

Couleur de plomb, très glabre; en dedans une fascie blanche, qui ressemble à un fer-à-cheval.

*Schroet.* einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 5.

Se trouve aux îles de Féroé.



Pat. scutiforme *Patella scutiformis*.

Ovale, mince, noire, avec des stries perpendiculaires, aplaties, blanches.

On ignore le pays d'où elle vient.

Patelle conque, *Patella cochlear*.

Aplatie, blanche; une des extrémités en saillie, canaliculée en dedans avec une bosse bleue, représentant un fer-à-cheval; l'autre extrémité arrondie.

*Knorr*, Vergn. 2. tab. 26. fig. 5.

On ignore son pays natal.

Patelle craticule, *Patella craticulata*.

Ovale, mince, aplatie, treillissée, radiée, variant en brun, en rouge et en jaune.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle ensanglantée, *Patella cruentata*.

Ovale, convexe, presque dentée; blanche, variée de rouge; les stries élevées, inégalement parsemées de pointes.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle papyracée, *Patella papyracea*.

Aplatie, mince, demi-transparente, ponctuée de rouge, radiée de fauve; les petites stries réunies, les grosses granulées.

*Schroet*, einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 12.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Patelle cylindrique, *Patella cylindrica*.

Aplatie, ovale, striée longitudinalement; les stries rapprochées, épaisses, inégales, toutes granulées.

*Schroet*, einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 15.  
On ignore son lieu natal.

Patelle décussate, *Patella decussata*.

Un peu convexe, blanche avec des taches rouges très rapprochées; les stries glabres, dont quelques-unes plus épaisses, blanches, le dedans blanc, strié par des lignes rouges en sautoir.

On ignore son lieu natal.

P. hématostique, *Patella hæmatostica*.

Mince, aplatie, blanche, ponctuée de rouge; le sommet cendré, varié de brun; le dedans brunâtre, strié et tacheté.

*Schroet*, einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 11.

On ignore son lieu natal.

Patelle astéroïde, *Patella asteroides*.

Aplatie, cendrée, treillissée, avec une étoile à rayons fauves; pâle vers le bord; le sommet uni, blanc, entouré de points bruns.

On ignore d'où elle vient.

Patelle ovale, *Patella ovalis*.

Ovale, légèrement convexe, striée par des lignes blanches, fines et très rapprochées; les rayons et des taches noirâtres.

*Schroet*, einl. in Conch. 2. tab. 5. fig. 10.

On ignore d'où elle vient.

Patelle rubelle, *Patella rubella*.

Légèrement convexe, striée, rougeâtre; le sommet rouge, maculé, et le fond blanc.

On ignore le pays d'où elle vient.