

Patelle spectable, *Patella spectabilis*.

Aplatie, presque rugueuse; striée d'un blanc rougeâtre, avec une fascie fauve clair vers le sommet; une partie du bord interne rougeâtre.

On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle sale, *Patella conspurcata*.

Solide, aplatie, noire, avec des points cendrés; le sommet d'un jaune foncé, l'intérieur bleuâtre.

On ne connaît pas son lieu natal.

Pat. mélanolite, *Patella melanosticta*.

Solide, aplatie, striée, très blanche, avec des rayons cendrés, ponctués de noir; le sommet peu acuminé; le dedans bleuâtre.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 9.

On ignore le lieu où elle se trouve.

Patelle noire, *Patella atra*.

Noire, striée; le sommet plus clair; le fond avec une ligne brune et une fascie blanche, qui représente un fer-à-cheval.

On ignore son lieu natal.

Patelle spéculaire, *Patella specularis*.

Ovale, solide, convexe, très unie, rouge brun, avec le sommet brun pâle; le bord blanc et des fascies interrompues, ceintes de brun.

On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle canescente, *Patella canescens*.

Ovale; noire; de grandes stries aplaties, blanches; le sommet obtus, brun pâle, avec une auréole blanche; le dedans strié de bleu.

On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle virescente, *Patella virescens*.

Oblongue, aplatie, dilatée des deux côtés, olivâtre, radiée et maculée de blanc; le dedans bleu.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 8.

On ignore d'où elle vient.

Patelle poulette, *Patella pulla*.

Arrondie, convexe, striée longitudinalement, rugueuse transversalement; brunâtre avec deux fascies blanches; en dedans blanche, radiée de brun.

On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle révolutive, *Patella revoluta*.

Presque ovale, crénelée, striée, d'un jaune d'ocre, maculée de rouge avec des rayons plus larges d'un côté; le bord relevé.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 7.

On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle écailleuse, *Patella squamata*.

Ovale, convexe, variée de noir et de blanc, striée; les stries écailleuses; le sommet blanc au centre.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 4.

On ne connaît pas le lieu où on la trouve.

Patelle testacé, *Patella testacea*.

Ovale, finement striée, testacée, avec trois anneaux transverses bruns; le dedans jaune; le fond blanc.

On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle capillaire, *Patella capillaris*.

Ovale, brun pâle, avec des fascies plus obscures

et des stries plus claires; le sommet et le fond blancs.
On ne connaît pas son lieu natal.

Patelle glauque, *Patella glauca*.

Ovale, un des côtés plus aigu, finement strié, avec une fascie bleue et le bord blanc, le reste bleu; le sommet et le bord blancs.

On ignore son lieu natal.

Patelle obscure, *Patella obscura*.

Ovale, aplatie, striée, variée de brun et de jaune, ponctuée de vert; le sommet fauve pâle.

On ignore son lieu natal.

Patelle surannée, *Patella exoleta*.

Ovale, presque convexe, inégalement striée, très blanche, avec quelques lignes courtes, noires; le fond avec une tache jaune d'ocre.

On ignore son lieu natal.

Patelle voisine, *Patella affinis*.

Ovale, aplatie, solide, avec quelques rayons noirs courts; une tache blanche au fond.

On ignore son lieu natal.

Patelle fauvette, *Patella fuscata*.

Ovale, convexe, finement striée et variée de brun de plusieurs nuances.

On ignore son lieu natal.

Patelle miélite, *Patella mellea*.

Arrondie, solide, très unie, couleur de miel; le bord maculé de brun; le sommet brunâtre; blanche en dedans, avec une bande rougeâtre au fond.

On ignore le pays d'où elle vient.

Patelle ambiguë, *Patella anceps*.

Solide, très unie, un peu pointue, d'un fauve très pâle; le dedans d'un rouge blanc très faible.

On ignore son lieu natal.

Patelle de Guinée, *Patella Guineensis*.

Ovale, convexe, très unie; un des côtés plus large, d'un fauve pâle; l'autre et le sommet jaunes; le bord partout rougeâtre.

Se trouve sur les côtes de Guinée.

Patelle aplatie, *Patella complanata*.

Comprimée, hémisphérique, blanche variée de brun, avec un treillis peu marqué, le sommet aplati.

On ignore son lieu natal.

Patelle verge, *Patella virgata*.

Ovale, blanche, striée longitudinalement; le sommet rayonné de brun; l'intérieur nacré.

Born. Mus. cas. vind. Test. 1. tab. 18. fig. 10.

On ignore son lieu natal.

Patelle soron, *Patella nivea*.

Presque solide, conique, unie, avec sept à huit cercles concentriques blancs.

Adanson; pl. 2. fig. 5.

Se trouve sur les côtes du Sénégal.

Patelle mouret, *Patella grisea*.

Ovale, avec des sillons bruns très rapprochés; le sommet presque central.

Adanson, pl. 2. fig. 5.

Se trouve sur la côte du Sénégal.
L'animal s'éloigne de la forme commune : il n'a presque point de cornes, et sa tête est fendue.

Patelle navire, *Patella navicula*.

Aiguë, avec des stries roses en sautoir ; une ceinture de tubercules au milieu, d'un seul côté ; les bords partout relevés.

Musch. Naturf. 18. tab. 2. fig. 5, 6.
On ignore son lieu natal.

Patelle cinglée, *Patella cingulata*.

Presque ovale, ferrugineuse, avec des stries peu marquées, et deux cercles élevés, fasciés de brun pâle ; le sommet presque central et les bords relevés.

Meusch. Naturf. 18. tab. 2. fig. 7.
On ignore son lieu natal.

Patelle canot, *Patella scapha*.

Pointue d'un côté, blanche, avec des stries ondulées ; le côté le plus large chargé d'une bosse aiguë, l'autre sinueux ; le sommet penché du côté pointu.

Meusch. Naturf. 18. tab. 2. fig. 8.
Son lieu natal n'est pas connu.

Patelles perforées au sommet,

Patelle entaillée, *Patella fissura*.

Ovale, striée, réticulée ; le sommet recourbé, fendu en devant.

Lister, tab. 543. fig. 28. *Muller*, *Zool. Dan.* 1. tab. 24. fig. 7—9. *Mart.* 1. tab. 12. fig. 109, 110.
Se trouve dans la mer du Nord et la Méditerranée.

Patelle fendue, *Patella fissurella*.

Sillonnée ; le sommet recourbé, troué sur le devant.

Muller, *Zool. Dan.* 1. tab. 24. fig. 4—6.
Se trouve sur les côtes d'Islande.

Patella pustule, *Patella pustulla*.

Ovale, convexe et bossue, avec des stries réticulées ; le bord crénelé.

Lister, tab. 528. fig. 3. *Favanne*, pl. 5. fig. A. *Chemn.* 10. tab. 168. fig. 1652 et 1653.

Se trouve dans la Méditerranée et dans la mer des Indes.

Patelle treillis, *Patella græca*.

Ovale, convexe, striée en sautoir ; le bord crénelé en dedans ; le trou près du bord postérieur.

Lister, tab. 527. fig. 1, 2. *Gualt.* tab. 9. fig. N. *Adanson*, pl. 2. fig. 7. *Dargenville*, pl. 2. fig. N. *Martini*, 1. tab. 11. fig. 98. 101. 104.

Se trouve dans la Méditerranée et les côtes d'Afrique.

Pat. trou de serrure, *Patella nimbosa*.

Ovale, striée rugueuse, brune ; le trou du sommet oblong.

Lister, tab. 2. fig. 6. *Gualt.* tab. 9. fig. P. Q. R. S. T. *Adanson*, pl. 2. fig. 6. *Martini*, 1. tab. 11. fig. 91, 92.

Voyez pl. 25, fig. 1, où elle est représentée aux trois quarts de sa grandeur naturelle.

Se trouve dans la Méditerranée et sur les côtes d'Afrique.

Pat. nébuleuse, *Pat. nubecula*.

Presque ovale, rugueuse, blanche, radiée de rouge ; le trou du sommet ovale.

Se trouve dans la Méditerranée.

Pat. peinte, *Pat. picta*.

Ovale, solide, variée d'un blanc et d'un vert obscur; les rayons obliques ondulés, alternativement violets et blancs.

Martini, 1. tab. 11. fig. 90.

Se trouve au détroit de Magellan.

Pat. des Barbades, *Pat. Bardadensis*.

Oblongue, inégalement striée; le bord crénelé, en dedans fascié d'un vert blanchâtre; le trou entouré d'un cercle fauve.

Martini, 1. tab. 11. fig. 95, 96, 97.

Se trouve dans la mer des Antilles.

P. de la Jamaïque, *Pat. Jamaicensis*.

Blanche, annulée; les stries longitudinales, avec des tubercules foliacés; les plus grands réunis.

Martini, 1. tab. 11. fig. 94.

Se trouve dans la mer des Antilles.

Pat. coffre, *Pat. coffra*.

Ovale, comprimée, striée finement, annulée de noir et radiée; le bord denté; l'intérieur noir; le fond blanc; le trou presque central.

Martini, 1. tab. 11. fig. 95.

Se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

Pat. perforée, *Pat. perforata*.

Un peu convexe, transversalement rugueuse, radiée et maculée de brun; les stries alternativement plus grandes et écailleuses.

Martini, 1. tab. 11. fig. 97.

On ignore sa patric.

Pat. porphyre, *Pat. porphyrozonias*.

Oblongue, comprimée, inégalement striée, blanche, avec cinq cercles interrompus, pourpres; le dedans d'un blanc verdâtre, avec un cercle rouge.

Martini, 1. tab. 12. fig. 102, 105.

Se trouve sur les côtes de l'Amérique septentrionale.

Pat. rose, *Pat. rosea*.

Les stries très rapprochées, alternativement tachetées de rose et de blanc; le trou ovale.

Martini, 1. tab. 12. fig. 105.

On ignore son lieu natal.

Pat. écusson, *Pat. scutellum*.

Sinueuse et comprimée; le trou sillonné en rayons.

Meusch. Naturf. 18. tab. 2. fig. 5.

On ignore son lieu natal.

Pat. noisette, *Pat. avellana*.

D'un blanc pâle, faiblement striée; les bords relevés; le trou oblong.

Meusch. Naturf. 18. tab. 2. fig. 4. *Dargenville*, pl. 2. fig. E. 5.

On ignore son lieu natal.

Pat. épineuse, *Pat. spinosa*.

Ovale, convexe, blanche; les stries les plus élevées plus épaisses à leur extrémité, avec quatre rangs de tubercules; les tubercules extérieurs épineux; le sommet rose; le trou crénelé.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 12.

On ignore son lieu natal.

Pat. denticulée, *Pat. denticulata.*

Ovale, bossue, très blanche, radiée de brun; les stries un peu rugueuses, alternativement grandes et petites; le bord denticulé, en dedans crénelé et vert.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Pat. noduleuse, *Pat. nodulosa.*

Ovale, un peu convexe; les stries élevées, rugueuses, coupées par de plus petites; le sommet noir; le dedans blanc.

On ignore le lieu où on la trouve.

Pat. aiguë, *Pat. angusta.*

Aplatie, blanche; les stries élevées, quatre plus grosses; le trou très petit; en dedans une tache fauve, entourée de vert.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 13.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Pat. inégale, *Pat. inæqualis.*

Ovale, convexe, striée en sautoir, blanche; un côté plus large, presque triangulaire; le trou dans un cercle élevé, entouré d'une ligne rouge.

On ignore le lieu d'où elle a été apportée.

Pat. petite, *Pat. minuta.*

Ovale, pyramidale, rougeâtre, douze stries élevées blanches, ainsi que le fond; le trou central ovale; le bord denticulé.

On ignore son lieu natal.

Pat. parsemée, *Pat. conspersa.*

Ovale, convexe, striée, jaunâtre, ponctuée de

rouge, avec trois rayons obliques; le dedans blanc; le trou alongé.

On ignore son pays natal.

Patelle rougeâtre, *Pat. rubescens.*

Ovale, striée, rougeâtre; une fascie et le dedans blancs; le bord entier; le trou linéaire.

On ignore son lieu natal.

Pat. sanguine, *Pat. sanguinea.*

Ovale, mince, rouge; des stries très petites, traversées par des rides rugueuses vers les bords; le dedans d'un blanc verdâtre, le fond rouge.

On ignore d'où elle a été apportée.

Pat. ventrue, *Pat. ventricosa.*

Ovale, ventrue, sillonnée par des stries rouges, en sautoir; le sommet aplati; le trou rond; le dedans blanc.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 14.

On ignore d'où elle vient.

Pat. à trois rayons, *Pat. triradiata.*

Ovale, aplatie, striée, blanche, avec trois rayons bruns; le trou linéaire, à bord entier; le dedans très blanc.

Schroet. einl. in Conch. 2. tab. 6. fig. 15.

On ignore son lieu natal.

Pat. mince, *Pat. tenuis.*

Ovale, convexe, demi-transparente, striée, blanche; cinq rayons à moitié bruns; le tour du trou centré, ponctué; le dedans jaunâtre.

On ignore d'où elle est apportée.

Pat. mélanozone, *Pat. melanozonias.*

Convexe, rougeâtre, avec des fascies interrompues noires, et des stries élevées inégales, blanches; le dedans blanc, entouré d'un cercle élevé cendré; le bord denticulé.

On ne connaît pas son lieu natal.

Pat. ouverte, *Pat. effusa.*

Convexe, rougeâtre, des stries élevées, noduleuses, grandes et petites, les grandes blanches; le trou rond, très large; le dedans blanc; le bord crénelé, verdâtre.

On ignore son pays natal.

Pat. punique, *Pat. punica.*

Convexe, d'un fauve pâle; des stries inégales en sautoir et très rapprochées; le trou rond; le dedans avec des fascies alternativement vertes et blanches; le bord entier.

On ignore d'où elle vient.

Pat. rousse, *Pat. rufescens.*

Convexe, blanche, mêlée de rougeâtre, striée de rouge; les stries granuleuses, le dedans blanc.

On ignore son lieu natal.

Pat. dimidiée, *Pat. dimidiata.*

Convexe, le dessus très blanc, treillisé; le bord longitudinalement strié; une fascie rose.

On ignore son lieu natal.

Pat. lactée, *Pat. lactea.*

Convexe, blanche, des stries inégales, glabres, aiguës; le sommet rose; le trou grand et rond.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Pat. pyramidale, *Pat. pyramidalis.*

Convexe, rose, striée; douze côtes unies, le dedans d'un blanc verdâtre.

On ignore son lieu natal.

Pat. bicolore, *Pat. bicolor.*

Aiguë, alternativement radiée de fauve pâle et de blanc; les stries inégales, épaisses, formées par des lames rapprochées; le dedans blanc; le bord crénelé; le trou oblong.

On ignore son lieu natal.

P. érythrocéphale, *Pat. erythrocephala.*

Convexe, blanche, avec des lignes rouges; stries élevées, rugueuses; dix plus grandes sinuées et recourbées à leur extrémité; le sommet rouge.

On ignore son pays natal.

Pat. verruqueuse, *Pat. verrucosa.*

Brune, striée, avec des zones noduleuses; le bas avec des rayons rouges; les côtes aiguës, noduleuses, inégales; le bord sinueux, dentelé.

On ignore son pays natal.

Pat. souillée, *Pat. contaminata.*

Convexe; les côtes noduleuses, inégales, les plus grandes, parsemées de tubercules d'un jaune brun; des taches noires disposées en cercle interrompu.

Schroet. N. Littérat. 3. tab. 1. fig. 7.

On ne connaît pas son lieu natal.

Pat. noire, *Pat. atrata.*

Un peu convexe, aiguë, blanche, avec des lignes

rougeâtres et des taches noires ; des stries élevées, convexes, inégales ; le trou oblong, fauve pâle en ses bords.

On ignore d'où elle vient.

Pat. candida, *Pat. candidans*.

Blanche, fauve pâle vers les bords ; vingt côtes alternativement plus grandes ; le trou oblong, rougeâtre en ses bords.

On ignore son pays natal.

Pat. succincta, *Pat. succincta*.

Ovale, aiguë, blanche, unie, un cercle élevé au milieu ; les bords dentés, ponctués de ferrugineux ; les stries inégales, élevées, unies.

On ignore son pays natal.

Pat. pusilla, *Pat. pusilla*.

Aplatie, presque ronde, blanche ; vingt stries élevées, alternant avec autant de petites ; le trou rond, entouré d'un cercle rougeâtre.

On ignore son pays natal.

Pat. flavescens, *Pat. flavescens*.


Aiguë, finement striée, jaunâtre ; six rayons bruns, denticulés en leurs bords ; le sommet cendré ; le trou oblong.

On ignore son pays natal.

Pat. antique, *Pat. antiquata*.

Un peu convexe, légèrement strié, blanche, avec des lignes rouges rayonnantes ; le trou oblong, irrégulier.

On ignore son pays natal.



Desce del.

F. Tardieu Sculp.

1. La Patelle trou de serrure. 4. La Pa. bouclier.
2. La Pa. bouclier de dragon. 5. 6. La Pa. vulgaire.
3. La Pa. voutée.

Pat. casque, *Pat. galeata*.

Ovale, solide, comprimée; le sommet un peu recourbé, obtus; le trou linéaire; le bord crénelé.

Helbling. Abh. der Boehme. privatg. 4. tab. 1, fig. 3, 4.

On ne connaît pas son lieu natal.

PLANOSPIRITE, *PLANOSPIRITES*, *Lamarck*.

Coquille univalve, suborbiculaire, aplatie; ayant en sa face inférieure, d'un côté, un rebord en cordon, rentrant sur le disque de la coquille, décurrent et courbé en spirale.

Fossile de la montagne de Saint-Pierre de Maestricht, recueilli et déposé au muséum par Faujas, et ainsi caractérisé par Lamarck. Comme cette coquille n'est point encore connue, on ne peut que renvoyer le lecteur au bel ouvrage de Faujas, sur les fossiles de Maëstricht, où sans doute elle sera décrite avec tous les détails désirables.