

Nérite cagar, *Nerita promontorii*.

Noire, ovale, aiguë, avec trente sillons; la lèvre gauche ridée.

Adanson, pl. 13. fig. 3.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Nérite dunar, *Nerita Senegalensis*.

Ovale, obtuse, solide, noire, sillonnée par vingt-cinq à trente stries; la lèvre dentée des deux côtés.

Adanson, pl. 13. fig. 1.

Voyez pl. 28, fig. 1, 2, 3, 4, où elle est représentée de grandeur naturelle en dessus et en dessous, avec son animal et son opercule.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Nérite selot, *Nerita tricolor*.

Rouge, variée de blanc et de noir; le premier tour de la spire avec quinze stries élevées; la lèvre dentée des deux côtés.


Adanson, pl. 13. fig. 4.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

NATICE, *NATICA*. Adanson.

Coquille presque globuleuse, ombiliquée, à lèvre gauche, calleuse vers l'ombilic: ouverture demi-ronde; la columelle oblique. Non dentée.

ADANSON est le premier qui ait séparé ce genre des nérites avec lesquelles il avait été confondu, comme il a été dit précédemment; et c'est d'après lui que Lamarck a établi ses caractères distinctifs, dont le principal est tiré



1. 2. 3. 4. La Nerite dunar.  
5. 6. . . . La Nerite carène  
. 8. . . . . L'Haliotide ormier.

de l'ombilic, qui ne se trouve pas dans les nérîtes proprement dites. Ainsi il ne comprend que les coquilles de la division des nérîtes ombiliquées de Linnæus, quoique Favanne, et autres, l'aient étendu à d'autres coquilles non ombiliquées, mais dont la bouche était demi-ronde.

Les natices ont généralement la forme et la contexture des nérîtes, mais elles sont cependant moins globuleuses, les tours de leur spire allant fréquemment jusqu'à sept. C'est dans la columelle que la différence des deux genres se fait le plus sentir. Dans les nérîtes, ce n'est qu'une cloison mince qui se développe longitudinalement. Dans les natices, c'est une colonne creuse qui soutient, comme dans la plupart des autres univalves, les spires de la coquille, et qui ensuite s'étend plus ou moins longitudinalement à l'ouverture de la bouche. Cette columelle est extérieurement épaisse et luisante, comme dans les nérîtes, et le devient d'autant plus, qu'elle est plus voisine des pas de la spire. Elle varie dans sa forme et dans sa position. L'ombilic varie également sous les mêmes rapports, selon les espèces, et il

\*

est quelquefois en partie, et même en totalité, rempli par une espèce d'apophyse ou d'appendice qu'on nomme cordon ombilical, et qui est tantôt lisse et tantôt ridé; tantôt étroit et tantôt large, quelquefois aplati à son extrémité, quelquefois contourné, etc.

Les lèvres sont les mêmes que dans les nérîtes, mais toujours calleuses du côté gauche.

Les natices ont toute l'ouverture ou la bouche exactement fermée par un opercule testacé, de forme approchant assez généralement de celle d'une demi-lune, mais qui n'a jamais les entailles ou les crans qu'on voit quelquefois à ceux des nérîtes. Cet opercule est ordinairement aplati. Sa surface supérieure est garnie de lames ou feuilletts demi-circulaires très serrés, ou de grosses cordelettes dont les dernières, plus étroites, laissent entre elles de profonds sillons. Sa surface inférieure offre un sillon qui décrit trois tours de spire fort petits; elle est, de plus, finement striée, et couverte d'un périoste mince.

L'animal des natices est aussi voisin de celui des nérîtes, que les coquilles mêmes. Sa

tête est petite, cylindrique, de moitié plus longue que large, et légèrement échancrée à son extrémité, d'où part un petit sillon qui n'a pas toute sa longueur, en dessus. La bouche est un petit sillon situé dans la partie opposée.

Les cornes sont deux fois plus longues que la tête, et coniques; elles portent, chacune, à leur racine, un appendice charnu et carré, qui flotte librement sur la tête, et derrière lequel sont placés les yeux.

Le manteau consiste en une simple membrane fort mince, qui tapisse les parois intérieures de la coquille.

Le pied est fort petit, presque rond, aplati en dessous, et assez épais.

Les natices sont, comme les nérîtes, répandues sur toutes les côtes de l'ancien et du nouveau continent; comme ces dernières, elles s'attachent aux rochers, et restent volontiers exposées à l'air lors des basses mées.

Naticae canrenae, *Natica canrena*.

Unie, la spire un peu pointue; l'ombilic à apophyse bossue, bifide.

*Nerita canrena*. Linn. — *Lister*, tab. 560. fig. 4. *Gualt.* tab. 67. fig. V. *Adanson*, pl. 13. fig. 2. *Dargenville*, pl. 7. fig. A. *Chemnitz*, *Conch.* 5. tab. 186. fig. 1860 et 1861.

Voyez pl. 28, fig. 5 et 6, où elle est représentée, en dessus et en dessous, un peu plus petite que nature.

Se trouve dans les mers de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique; et varie depuis le blanc jusqu'au bleu le plus foncé, avec des taches et des lignes de toutes couleurs.

#### Natice treillissée, *Natica cancellata*.

Striée en sautoir avec des points enfoncés; spire un peu en massue, et ombilic à apophyse gibbeuse et bifide.

*Chemn.* *Conch.* 5. tab. 188. fig. 1911 et 1914.  
Se trouve sur la côte ouest de l'Amérique.

#### Natice grelot, *Natica glaucina*.

Unie, la spire obtuse, l'ombilic à demi fermé; la lèvres bossue, bicolore.

*Nerita glaucina*, Linn. — *Lister*, tab. 562. fig. 9. *Gualt.* tab. 67. fig. A. B. D. *Dargenville*, pl. 7. fig. V. *Chemn.* *Conch.* 5. tab. 186. fig. 1856. 1859.

Se trouve dans la mer de l'Inde et dans la Méditerranée.

#### Natice jaune d'œuf, *Natica vitellus*.

Presque globuleuse; l'ombilic entièrement perforé.

*Nerita vitellus*. Linn. — *Lister*, tab. 565. fig. 12. *Gualt.* tab. 67. fig. I. *Chemn.* *Conch.* 5. tab. 186. fig. 1866, 1867.

Se trouve dans la mer des Indes.

#### Natic blanc d'œuf, *Natica albumen*.

Convexe; ombilic presque en cœur; le sommet de l'apophyse aplati.

*Nerita albumen*, Linn. — *Rumph.* tab. 22. fig. B. *Chemnitz*, *Conch.* 5. tab. 189. fig. 1924, 1925.

Se trouve dans la mer des Indes et sur les côtes de Barbarie.

#### Natice mamelon, *Natica mamilla*.

Ovale, glabre; l'ombilic presque couvert; l'ouverture ovale.

*Nerita mamilla*. Linn. — *Rumph.* tab. 22. fig. F. *Lister*, tab. 566. fig. 14, et 171. fig. 22. *Dargenville*, pl. 7. fig. X. *Chemn.* *Conch.* 5. tab. 187. fig. 1881 et 1884.

Se trouve dans la mer des Indes.

#### N. à zones blanches, *Nat. leucozonias*.

Presque globuleuse, solide, fauve, fasciée de blanc; la spire comprimée.

*Nerita leucozonias*. — *Kaemmer*, *Conch.* *Rudolst.* tab. 12. fig. 5, 6.

On ignore le lieu d'où elle vient.

#### Natic fauve, *Natica spadicea*.

Presque globuleuse, solide, fauve pâle; l'intérieur blanc; l'extrémité bleuâtre; la gorge avec des fascies latérales, et le dos blanc.

*Nerita spadicea*. — *Chemn.* *Conch.* 5. tab. 187. fig. 1872 et 1875, et 188. fig. 1896. a. b. et 1897.

Se trouve sur les côtes de l'île de la Réunion.

#### Natic rousse, *Natica rufa*.

Roux clair, l'ombilic plus coloré; le bord et la base du dos des spires fasciés de blanc; la gorge avec

une fascie roussâtre, et la columelle avec une bande brune.

*Nerita rufa*. Linn. *Rumph. Mus. tab. 22. fig. D. Chemnitz*, 5. tab. 187. fig. 1874, 1875.

Se trouve sur les côtes de l'île de la Réunion.

Natrice gochet, *Natica fulminans*.

Presque globuleuse, avec des lignes en zig-zag, d'un fauve pâle; l'apophyse à sommet aplati.

*Nerita fulminea*. Linn. — *Lister*, tab. 567. fig. 17. *Adanson*, pl. 13. fig. 4. *Guatt.* tab. 67. fig. M. *Chemn. Conch.* 5. tab. 187. fig. 1881. 1884.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Natrice crotte de mouche, *Natica stercus muscarum*.

Unie, blanche, maculée et ponctuée très finement de trous; l'apophyse de l'ombilic bossue et bifide.

*Nerita stercus muscarum*. — *Chemnitz*, *Conch.* 5. tab. 187. fig. 1894.

Se trouve dans la Méditerranée et sur les côtes d'Amérique.

Natrice orientale, *Natica orientalis*.

Presque globuleuse, unie, luisante; la spire presque rugueuse à sa base, la columelle blanche.

*Nerita orientalis*. — *Chemn. Conch.* 5. tab. 188. fig. 1898, 1899 et 1904.

Se trouve dans la mer des Indes.

Natrice ensanglantée, *Natica cruentata*.

Presque globuleuse, blanche, maculée et ponctuée de rouge; l'extrémité et le dedans bleuâtres; l'ombilic en spirale.

*Nerita cruentata*. — *Chemn. Conch.* 5. tab. 188. fig. 1900 et 1901.

On ignore son pays natal.

Natrice rugueuse, *Natica rugosa*

Rugueuse; l'intérieur glabre, d'un rouge de brique clair; le bord de l'ombilic blanc.

*Nerita rugosa*. — *Chemn. Conch.* 5. tab. 188. fig. 1902, 1903.

Se trouve sur la côte ouest de l'Amérique.

Nat. marocaine, *Natica marochiensis*.

Presque globuleuse, unie, verdâtre; l'extrémité livide, un peu rugueuse à l'angle de la spire; l'intérieur d'un brun clair.

*Nerita marochiensis*. — *Chemn.* 5. tab. 188. fig. 1905 et 1910.

Se trouve sur la côte d'Afrique et aux Antilles.

Natrice sillonnée, *Natica sulcata*.

Presque globuleuse, obliquement plissée, la spire pointue; l'apophyse de l'ombilic bifide.

*Nerita sulcata*. — *Born. Mus. cæs. vind. Test.* tab. 17. fig. 5, 6.

On ignore son pays natal.

N. toile d'araignée, *Nat. arachnoidea*.

Blanche, réticulée de roux; l'extrémité noirâtre; les tours de spire convexes; l'ombilic presque couvert.

*Nerita arachnoidea*. — *Chemn. Conch.* 5. tab. 188. fig. 1915 et 1916.

On ignore son pays natal.

N. mélanostome, *Natica melanostoma*.

Mince, demi-transparente, oblongue, unie; le premier tour de la spire ventru, très grand, plus comprimé que les autres; l'ombilic presque fermé.

*Nerita melanostoma*. Linn. — *Lister*, tab. 142. fig.

36. et 566. fig. 15. *Gualt. Test. tab. 67. fig. D.*  
*Chemn. 5. tab. 189. fig. 1926, 1927.*  
 Se trouve dans la mer des Indes.

Natice bout de tétou, *Natica papilla.*

Mince, demi-transparente, oblongue, striée en sautoir, d'un jaune foncé; la bouche presque ovale; la columelle blanche; l'ombilic à demi fermé.

*Nerita papilla.* — *Chemnitz, Conch. 5. tab. 189. fig. 1959.*

Se trouve sur la côte de Tranquebar.

Natice treillissée, *Natica clathrata.*

Ovale, comprimée, ondulée transversalement, striée longitudinalement; les côtes planes, obliques, sémilunaires; la spire en mamelon.

*Nerita clathrata.* — *Schroet, einl in Conch. 2. tab. 4. fig. 15.*

Se trouve fossile à Courtagnon et ailleurs.

Natice australe, *Natica australis.*

Jaunâtre, variée de vert et de bleu, avec des lignes en zigzag vertes; les tours de la spire partagés par neuf sillons.

*Nerita australis.* — *Zoom. Naturf. 7. tab. 2. fig. B. 1 et B. 2.*

Se trouve à la Nouvelle-Zélande. Peut être rapportée aux trochus.

FIN DU TOME TROISIÈME.

