

Lister, tab. 826, fig. 47. *Gualt.* Test. tab. 52, fig. E. *Martini*, 2. tab. 44, fig. 460, 461.

Se trouve dans la mer Méditerranée et dans celle des Indes.

Volute bivet, *Voluta cancellata*.

Entière, plissée, réticulée en sautoir; la columelle un peu à trois plis, alongée, ombiliquée.

Gualt. tab. 48, fig. B. C. D. E. *Adanson*, pl. 8, fig. 16. *Born.* Mus. cas. vindob. Test. tab. 9, fig. 7, 8.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Volute élégante, *Voluta elegans*.

Unie, blanche, fasciée de bleu; l'ouverture jaune, la spire presque oblitérée; la columelle à six dents.

Lister, tab. 865, fig. 11. *Bonanni*, Mus. Kircher. 5, fig. 269. *Martini*, Conch. 2. tab. 42, fig. 424, 425.

On ignore son pays natal.

Volute œuf, *Voluta ovum*.

Unie, d'un blanc verdâtre, avec beaucoup de fascies; la lèvres recourbée en dedans; la columelle à quatre plis.

Knorr, Verg. 4. tab. 23, fig. 5 et 27, fig. 1.

On ignore son pays natal.

Volute marginée, *Voluta marginata*.

Spire peu visible; les côtés épais et marginés; la columelle à quatre plis.

Favanne, pl. 29, fig. E. *Chemn.* 10. tab. 150, fig. 1421.

On ignore son pays natal.

Volute noix, *Voluta nuccea*.

Presque striée, glabre, la spire saillante, obtuse, unie: la columelle à quatre plis.

Gronovius, Zooph. tab. 18, fig. 11.

On ignore son pays natal.

Volute albide, *Voluta albida*.

Ovale, blanche, avec des rangées de points rousâtres; la spire obtuse, à base émarginée; la columelle à cinq plis; la lèvres bossue, denticulée.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 150, fig. 1419 et 1420.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute cône, *Voluta conus*.

Conique, blanche; la base avec des sillons transverses, semés de petits trous; les tours de spire crénelés; la columelle à six plis.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 150, fig. 1415 et 1416.

On ignore son pays natal.

Volutes fusiformes.

Volute tringate, *Voluta tringa*.

Presque entière, oblongue, unie; la spire proéminente, brisée; la columelle à trois plis; la lèvres avec trois dents en dedans.

Gualteri, Test. tab. 45, fig. B. *Schroet.* einl. in Conch. 1. tab. 1, fig. 12.

Se trouve dans la Méditerranée.

Volute cornicule, *Voluta cornicula*.

Un peu émarginée, oblongue, unie, couleur de corne; la spire alongée; la columelle à quatre plis; la lèvres égale, sans dents.

Gualteri, Test. tab. 43, fig. N. *Schroet.* einl. in Conch. 1. tab. 1, fig. 13.

Se trouve dans la Méditerranée et sur les côtes d'Afrique.

Volute vierge, *Voluta virgo*.

Entière, turriculée, plissée et striée transversalement ; la columelle à trois plis, perforée.
On ignore le pays d'où elle vient.

Volute hérisson, *Voluta scabriuscula*.

Émarginée, striée, transversalement rugueuse ; la columelle perforée, à quatre plis ; la lèvres crénelée.
Rumph. tab. 29. fig. T. *Gualt.* Test. tab. 55. fig. D.
H. Martini, 4. tab. 149. fig. 1388, 1389. 1391.
Se trouve dans la mer des Indes.

Volute rufine, *Voluta rufina*.

Presque entière, transversalement rugueuse ; la columelle à quatre plis ; la lèvres crénelée.
Gualteri, Test. tab. 54. fig. G.
Se trouve dans la mer des Indes.

Volute nubile, *Voluta nubila*.

Presque entière, unie, striée transversalement de rouge sale ; la lèvres crénelée ; la columelle à quatre plis.
Martyn, Univ. Conch. 1. tab. 23.
Se trouve dans la mer du Sud.

Volute genot, *Voluta sanguisuga*.

Émarginée, sillonnée longitudinalement, striée transversalement ; la columelle à quatre plis ; la lèvres unie.
Lister, tab. 821. fig. 30. *Gualteri*, tab. 55. fig. F.
Adanson, pl. 9. fig. 55. *Mart.* 4. tab. 148. fig. 1367, 1368. 1373, 1374.

Volute caffre, *Voluta caffra*.

Émarginée, cylindrique, unie ; les tours de spire plissés et striés ; la columelle presque à quatre plis.
Gualt. Test. pl. 53. fig. E. *Martini*, 4. tab. 148. fig. 1369, 1370.
Se trouve dans la mer des Indes.

Volute more, *Voluta morio*.

Un peu émarginée, cylindrique, unie ; la columelle trois plis.
On ignore le lieu où elle se trouve.

Volute aiguille, *Voluta acus*.

Des rangées transverses de points rouges ; la spire guë, unie.
Martini, Conch. 4. tab. 157. fig. 1493 et 1494.
On ignore son pays natal.

Volute renardine, *Voluta vulpecula*.

Émarginée, presque anguleuse, sans épines, striée transversalement ; la columelle à quatre plis ; la gorge riée.
Rumphius, tab. 29. fig. R. *Gualt.* Test. tab. 54. fig. B. C. *Martini*, 4. tab. 148. fig. 1366.
Se trouve dans la mer des Indes.

Volute plicaire, *Voluta plicaria*.

Émarginée, anguleuse ; les angles antérieurs presque épineux ; la columelle à quatre plis ; la lèvres nie.
Lister, tab. 820. fig. 37. *Gualt.* tab. 54. fig. D. E.
Dargenv. pl. 9. fig. Q. *Favanne*, pl. 31. fig. I. 4.
Martini, 4. tab. 148. fig. 1362. 1365.
Se trouve dans la mer des Indes.

Volute bullée, *Voluta bullata*.

Cylindrique, très unie, roussâtre, avec des cercles livides; la spire obtuse, à quatre plis en dessous; l'ouverture large.

Lister, tab. 803. fig. 11. Knorr, Verg. 4. tab. 25. fig. 1 et 27. Martini, 2. tab. 42. fig. 424, 425.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute crénelate, *Voluta crenulata*.

Cylindrique, striée en sautoir avec des points enfoncés, blanche nuagée de jaune; laèvre et les deux tours de spire crénelés, noduleux; la columelle à huit plis.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 150. fig. 1428 et 1429. Se trouve dans la mer des Indes.

Volute écusson, *Voluta scutellata*.

Noire, maculée de blanc, striée transversalement; le premier tour de spire un peu ventru; la columelle à quatre plis.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 151. fig. 1428. Se trouve dans la mer des Indes.

Volute noire, *Voluta nigra*.

Émarginée, noirâtre; les tours de spire aplatis; la columelle à quatre plis.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 15. fig. 1430, 1431. Se trouve dans les mers de l'Inde et de l'Afrique.

Volute fendue, *Voluta subdivisa*.

Émarginée, avec des côtes longitudinales, formées par des plis; des stries transverses fines, et la columelle à trois plis.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 151. fig. 1434 et 1437. Se trouve dans la mer des Indes.

Volute ensanglantée, *Voluta cruentata*.

Émarginée, fasciée, transversalement striée avec des côtes longitudinales, noueuses, maculées de rouge; la columelle à trois plis.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 151. fig. 1438 et 1439. Se trouve dans la mer des Indes.

Volute raboteuse, *Voluta exasperata*.

Émarginée, granuleuse, striée en sautoir, avec des côtes longitudinales, fasciées de brun; la columelle à cinq plis.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 151. fig. 1440 et 1441. Se trouve dans la mer des Indes.

Volute granuleuse, *Voluta granulosa*.

Émarginée, striée transversalement, sillonnée longitudinalement; avec des points élevés, des lignes rougeâtres, le bout et la base noirs; la columelle à trois plis.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 151. fig. 1442 et 1443. Se trouve dans la mer des Indes.

Volute chaste, *Voluta casta*.

Unie, brune, fasciée de blanc; la columelle à six plis, la base émarginée.

Chemnitz, Conch. 10. vign. 20. fig. C. D. Se trouve dans la mer des Indes.

V. à zones blanches, *Voluta leucozonias*.

Couleur de paille, avec des fascies en zigzags, blanches; la columelle avec des plis peu marqués.

Martini, Conch. 4. tab. 148. fig. 1571 et 1572.

Walch, Naturf. 4. tab. 1. fig. 5, 4. On ignore le pays d'où elle vient.

Volute maculée, *Voluta maculosa*.

Blanche, avec des fascies brunes, réticulées et maculées.

Martini, Conch. 4. tab. 149. fig. 1577.

On ignore d'où elle vient.

Volute noduleuse, *Voluta nodulosa*.

Brune, treillissée; les angles noduleux, tachés de blanc; la columelle à quatre plis.

Gualt. Test. tab. 52. fig. F. *G. Martini*, 4. tab. 149. fig. 1585. 1590.

On ignore son pays natal.

Vol. couleur de paille, *Voluta spadicea*.

Couleur de paille, nuagée et maculée de jaune, les tours de spire avec huit plis longitudinaux et striés transversalement; la columelle à cinq plis.

Martini, Conch. 4. tab. 50. fig. 1592.

On ignore son pays natal.

Volute orange, *Voluta aurentia*.

Orangée; les quatre premiers tours de spire avec une fascie blanche; la lèvre denticulée; la columelle à quatre plis.

Martini, Conch. 4. tab. 150. fig. 1595 et 1594.

On ignore son pays natal.

Volute treillissée, *Voluta decussata*.

Jaune, striée en sautoir; les stries longitudinales ondulées; la columelle à quatre plis.

Martini, Conch. 4. tab. 150. fig. 1595.

On ignore son pays natal.

Volute polygone, *Voluta polygona*.

Ponctué, avec des côtes longitudinales et de fines

stries transversales; le premier tour de spire anguleux; la lèvre sillonnée; la columelle presque ombilicquée, à cinq plis.

Martini, Conch. 4. t. 150. fig. 1403 et 1404.

On ignore le lieu de sa naissance.

Volute acuminée, *Voluta acuminata*.

Treillissée; la columelle à quatre plis; le bout de la spire aigu.

Martini, Conch. 4. t. 150. fig. 1405 et 1404.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute à deux plis, *Voluta biplicata*.

Unie, blanche, variée de points noirs et de taches jaunes; la lèvre aiguë; la columelle à deux plis.

Mart. Conch. 4. tab. 149. fig. 1575.

On ignore son pays natal.

Volute turriculée, *Voluta turriculata*.

La columelle à deux plis; les tours de spire un peu renflés avec une fascie de points noirs, le premier avec deux.

Martini, Conch. 4. tab. 149. fig. 1576.

On ignore son pays natal.

Volute linéate, *Voluta lineata*.

Des lignes longitudinales noires en sautoir, avec des fascies blanches; la columelle à trois plis.

Martini, Conch. 4. tab. 149. fig. 1578 et 1579.

On ignore son pays natal.

Volute discordante, *Voluta discors*.

Blanche, avec des taches perpendiculaires en virgules, ondées de jaune; le dessous brun, ponctué de blanc.

Martini, Conch. 4. tab. 150. fig. 1400 et 1405.
On ignore son pays natal.

Volute striée, *Voluta striata*.

Finement striée en travers, obscure, ponctuée de rouge, avec deux fascies plus claires.

Martini, Conch. 4. tab. 1406.
On ignore son pays natal.

Volute sillonnée, *Voluta sulcata*.

Sillonnée longitudinalement, brune, avec une fascie transverse, blanche, noduleuse; la columelle à quatre dents.

Martini, Conch. 4. tab. 150. fig. 1406.
On ignore son pays natal.

Volute unie, *Voluta lævigata*.

Unie, brune; le bord de l'ouverture et la spire avec une fascie plus claire.

Martini, Conch. tab. 150. fig. 1408.
On ignore son pays natal.

Volute ocellée, *Voluta ocellata*.

Couleur de paille, avec des yeux blancs.
Martini, Conch. 4. tab. 150. fig. 1409.
On ignore son pays natal.

Volute nasique, *Voluta nasuta*.

Rouge, avec des rangées de points noirs; la lèvre proéminente; l'échancrure un peu allongée, relevée.

Martini, Conch. 4. tab. 150. fig. 1410.
On ignore son pays natal.

Volute marbrée, *Voluta marmorea*.

Blanche, varié de brun; la lèvre recourbée en dedans.

Martini, Conch. 4. tab. 150. fig. 1411.
On ignore son pays natal.

Vol. barbadienne, *Voluta barbadiensis*.

Roussâtre, striée finement en travers; l'ouverture ovale, oblongue; la spire obtuse.

Lister, Conch. tab. 819. fig. 33.
Se trouve dans la mer d'Amérique.

Volute grillée, *Voluta clathrata*.

Treillisée; la spire obtuse; la lèvre marginée; l'échancrure un peu allongée, relevée.

Lister, Conch. tab. 819. fig. 34.
Se trouve dans l'Océan Américain.

Volute à trois couleurs, *Voluta tricolor*.

Bossue, jaune, chaque tour de spire avec une fascie blanche chargée de taches carrées, noires; la columelle à trois plis; l'échancrure proéminente.

Bonanni, Mus. Kircher. 3. fig. 37.

Volute tour, *Voluta turrita*.

Brune, variée de lignes ondulées plus foncées, avec des plis horizontaux peu marqués et presque noduleux, l'ouverture striée; la columelle à trois plis.

Martini, Conch. 4. tab. 141. fig. 1317 et 1318.
On ignore son pays natal.

Volute syracusaine, *Voluta syracusana*.

Unie, blanche, avec des taches perpendiculaires en virgules, ondulées d'un noir jaune.

Bonanni, Mus. Kircher. 3. fig. 40.
Se trouve dans la Méditerranée.

Volute brillante, *Voluta nitens*.

Très unie, couleur de paille, le dedans blanc; la columelle à quatre plis.

Bonanni, Mus. Kircher. 3. fig. 323.

On ignore son pays natal.

Volute citrine, *Voluta citrina*.

Citrine, avec des fascies rousses.

Valentin, Abh. 2. tab. 2. fig. 12.

On ignore son pays natal.

Voluté mucronée, *Voluta mucronata*.

D'un brun clair, striée longitudinalement; la spire perforée; la columelle perforée, à quatre plis.

Gualt. Test. tab. 52. fig. M.

On ignore son pays natal.

Volute rugueuse, *Voluta rugosa*.

Un peu ventrue, longitudinalement rugueuse, transversalement striée, d'un blanc vif, avec des lignes couleur de poix.

Gualt. Test. tab. 54. fig. A.

On ignore son pays natal.

Volute maigre, *Voluta strigosa*.

Cendrée, striée de rouge; la spire très unie; les tours un peu renflés.

Dargenville, pl. 9. fig. V.


On ignore son pays natal.

Volute fossile, *Voluta fossilis*.

Très unie; la columelle à cinq plis.

Dargenville, pl. 29. fig. 6. B.

Se trouve fossile à Courtagnon et à Grignon.



1. . . La Volute olive .

6. La Volute yet .

2. 3. La Volute épiscopale .

7. La Tarniere villebrequin .

4. 5. La Volute porcelaine .