

V. ponctuée de blanc, *Vol. leucosticca.*

Mince, unie, brune, entourée de rangées de points blancs.

Knorr, Verg. 2. tab. 5. fig. 7.

Se trouve dans la mer du Sud.

Volute jalousie, *Voluta clathrus.*

D'un blanc brillant treillissé; les tours de spire avec une fascie de taches jaunes.

Knorr, Verg. 5. tab. 27. fig. 3.

On ignore son pays natal.

Volute verge, *Voluta virgata.*

Des côtes transverses, une fascie transverse, et des stries longitudinales onnées, brunes.

Knorr, Verg. 5. tab. 11. fig. 2.

On ignore son pays natal.

Volute leucostone, *Voluta leucostona.*

Treillissée, couleur de paille, maculée de blanc; des taches onnées brunes; l'ouverture jaune d'ocre.

Knorr, Verg. 4. tab. 11. fig. 3.

On ignore son pays natal.

Volute variée, *Voluta variegata.*

Striée transversalement, jaune, une fascie et des taches brunes, et plusieurs plus petites, blanches.

Knorr, Verg. 5. tab. 18. fig. 6.

On ignore son pays natal.

Volute filaire, *Voluta filaris.*

Émarginée, cylindrique, striée en sautoir, ceinte par des lignes rouges; la columelle à trois plis.

On ignore son pays natal.

Volute volva, *Voluta volva*.

Cylindrique, glabre, blanche, la spire évasée, obtuse, émarginée à sa base; la columelle à quatre plis.

Chemnitz, *Conch.* 10. tab. 1408. fig. 1389 et 1390.
Se trouve sur les côtes d'Afrique.

V. de Ziervogel, *Voluta Ziervogelii*.

Ovale, large, longitudinalement rugueuse, inférieurement sillonnée en travers; la spire obtuse; la columelle à quatre plis; la lèvres denticulée.

Chemnitz, *Conch.* 10. tab. 149. fig. 1406.
On ignore son pays natal.

Volute rhinocéros, *Voluta rhinoceros*.

Ovale, trigone, rugueuse, sillonnée transversalement, ombiliquée; les tours de spire noueux, épineux; la columelle à trois plis; la lèvres dentée; la gorge striée.

Chemn. *Conch.* 10. tab. 150. fig. 1407 et 1408.
Se trouve dans la mer des Indes.

Volute à côtes, *Voluta costata*.

Blanche, la spire finement striée en travers avec des côtes arrondies, le premier tour avec trois fascies brunes; la columelle à quatre plis.

Schroet, *einl.* in *Conch.* 1. tab. 1. fig. 17.
On ignore son pays natal.

Volute bâtarde, *Voluta spuria*.

Ovale, blanche; la spire tachée de brun; le premier tour avec six fascies brunes; l'échancrure un peu allongée; la lèvres avec des enfoncemens; la columelle à six plis.

Schroet, *einl.* in *Conch.* 1. tab. 1. fig. 16.
On ignore le lieu d'où elle vient.

Volute percée, *Voluta pertusa*.

Émarginée, striée, percée de trous; la lèvres denticulée; la columelle à cinq plis.

Lister, tab. 822. fig. 40. *Gualt.* tab. 54. fig. H. *Favanne*, pl. 31. fig. D. 5. *Martini*, 4. tab. 147. fig. 1361.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute cardinale, *Voluta cardinalis*.

Émarginée, striée transversalement; blanche, avec des taches couleur de paille, dont plusieurs rangées en échiquier; la columelle à cinq plis.

Lister, tab. 858. fig. 65. *Gualteri*, *Test.* tab. 53. fig. G. 2. *Martini*, 4. tab. 147. fig. 1558, 1559.
Se trouve dans la mer des Indes.

Volute épiscopale, *Voluta episcopalis*.

Émarginée, unie; les tours de spire non dentés en leurs bords; la lèvres denticulée; la columelle à quatre plis.

Lister, tab. 839. fig. 66. *Gualteri*, tab. 52. fig. G. 1. *Dargenville*, pl. 9. fig. C. *Favanne*, pl. 31. fig. C. 2. *Martini*, 4. tab. 147. fig. 1560.

Voyez pl. 38, fig. 2, 3, où elle est représentée presque de grandeur naturelle.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute papale, *Voluta papalis*.

Émarginée, striée transversalement; le bord des tours de spire et la lèvres denticulés; la columelle à quatre plis.

Lister, tab. 839. fig. 67. *Gualt.* tab. 55. fig. 1. *Dargenville*, pl. 9. fig. E. *Favanne*, pl. 32. fig. D. 2. *Martini*, 4. tab. 147. fig. 1555 à 1556.

Se trouve dans la mer des Indes.

V. patriarchale, *Voluta patriarchalis*.

Un peu ovale, solide, striée transversalement; blanche, striée de safran et de roux; plissée et noduleuse; la columelle à quatre plis; les tours de spire couronnés par des tubercules.

Chemn. Conch. 10. tab. 150. fig. 1425 — 1427.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute musique, *Voluta musica*.

Émarginée; les tours de spire avec des épines obtuses; la lèvre unie, très épaisse.

Lister, tab. 805. fig. 14, 15. *Gualt.* tab. 28. fig. X. *Z. Dargenville*, pl. 14. fig. F. *Martini*, 3. tab. 96. fig. 926. 953.

Se trouve sur les côtes d'Amérique.

Vol. chauve-souris, *Voluta vesperilio*.

Émarginée; les tours de spire aigus; la columelle à quatre plis; la lèvre unie.

Lister, tab. 807. fig. 16. 808. fig. 17. *Gualt. Test.* tab. 28. fig. F. G. I. M. T. V. *Martini*, 3. tab. 97. fig. 934 à 940.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute arabique, *Voluta arabica*.

Émarginée; les tours de spire tuberculés, avec des caractères noirs; la columelle à quatre plis.

Martyn, Univ. Conch. 2. tab. 52.

Se trouve dans la mer du Sud.

Volute hébraïque, *Voluta hebraica*.

Émarginée; les tours de spire avec des épines

émoussées; la columelle avec cinq gros plis et trois petits.

Lister, tab. 809. fig. 18. *Gualt.* tab. 28. fig. Z. *Dargenville*, pl. 14. fig. D. *Martini*, 3. tab. 96. fig. 924, 925.

Se trouve dans la mer des Indes et aux Antilles.

Volute turbinellée, *Voluta turbinella*.

Presqu'entière, turbinée, avec des épines coniques presque perpendiculaires; les supérieures plus grandes; la columelle à quatre plis.

Lister, tab. 811. fig. 20. *Gualt.* tab. 26. fig. L. *Dargenv.* pl. 14. fig. P. *Martini*, 3. tab. 99. fig. 944.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute chapiteau, *Voluta capitellum*.

Ovale, rugueuse, noneuse; la columelle à trois plis.

Lister, tab. 810. fig. 19. *Gualt.* tab. 57. fig. A. *Dargenville*, pl. 15. fig. K. *Favanne*, pl. 24. fig. C. 3. *Martini*, 3. tab. 199. fig. 947 à 950.

Se trouve dans la mer des Indes et en Amérique.

Volute céramique, *Voluta ceramica*.

Ovale, aiguë; les épines divergentes; la columelle à cinq plis.

Lister, tab. 829. fig. 51. *Gualt.* tab. 55. fig. D. *Dargenville*, pl. 15. fig. E. *Martini*, 3. tab. 99. fig. 943.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute poire, *Voluta pyrum*.

Ovale, presque caudée; la spire striée, unie, et prolongée à son extrémité; la columelle à trois plis.

Lister, tab. 815. fig. 25, 26. *Gualt. Test.* tab. 46. fig. C. *Martini*, 3. tab. 95. fig. 916. à 919.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute laponique, *Voluta laponica*.

Presque ovale, unie; la spire unie; le ventre évasé.
Rumph. tab. 37. fig. 3. *Séba*, Mus. 3. tab. 57. fig. 25, 26. *Martini*, Conch. 3. tab. 89. fig. 872 et 873, et tab. 95. fig. 920 et 928.

Se trouve dans l'Océan Indien et Américain.

Volute étendard, *Voluta vexillum*.

Ventruée, jaunâtre, striée d'orangé; le premier tour de spire trois fois plus grand que les autres, et tuberculé.

Rumph. tab. 37. fig. 2. *Dargenville*, Zoomorph. pl. 11. fig. G. *Favanne*, pl. 33. fig. O. 2. *Mart.* 3. tab. 120. fig. 1098.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute jaunissante, *Voluta flavicans*.

Pyriforme, unie, d'un jaune obscur; la spire avec des taches couleur de paille; la columelle à quatre plis.

Séba, Mus. 3. tab. 67. fig. a. b. *Martini*, Conch. 3. tab. 95. fig. 922, 923.

On ignore le pays d'où elle vient.

Volute rupestre, *Voluta rupestris*.

Alongée, avec des côtes chargées de lignes treillisées peu apparentes; la lèvres marginée; la columelle à beaucoup de plis; un mamelon à l'extrémité de la spire.

Martini, Conch. 3. tab. 98. fig. 941, 942.

On ignore son pays natal.

Volute nasse, *Voluta nassa*.

Ventruée; la spire avec des côtes chargées de lignes

treillisées peu apparentes; la lèvres marginée; la columelle ombiliquée, à trois plis.

Séba, Mus. 3. tab. 55. fig. 42. *Martini*, Conch. 4. tab. 124 et 125. fig. 1172 et 1173.

Se trouve sur les côtes orientales d'Afrique.

Volute craticulée, *Voluta craticulata*.

Turriculée, transversalement striée de blanc; des côtes longitudinales couleur de paille; la lèvres denticulée, striée; la columelle à trois plis.

Lister, tab. 919. fig. 15. 967. fig. 22. *Martini*, Conch. 4. fig. 1582 et 1583.

On ignore son pays natal.

Volute spirale, *Voluta spiralis*.

Des côtes longitudinales et de fines stries transverses; les deux premiers tours de spire avec deux rangées de tubercules aigus; la columelle à trois plis.

Rumph. Amb. tab. 29. fig. X.

Se trouve dans la mer des Indes.

V. magellanique, *Voluta magellanica*.

Un peu ventruée, couleur d'ocre, avec des lignes blanches et brunes; la lèvres étendue; les tours de spire convexes, le premier trois fois plus grand que les autres.

Knorr, Verg. 6. tab. 29. fig. 1. *Favanne*, 2. pl. 28. fig. E. *Chemn.* 10. tab. 140. fig. 1383, 1384.

Se trouve au détroit de Magellan.

Volute fileuse, *Voluta filosa*.

Finement réticulée par des stries; des cercles élevés transverses; la columelle à quatre plis; la lèvres crénelée.

Born. Mus. cæs. vindob. Test. tab. 9. fig. 9, 10.

On ignore son pays natal.

Volute fuscate, *Voluta fuscata*.

Rude au toucher, brune; des stries transverses à la base; la spire obtuse; le premier tour de spire ventru, avec quatre fascies étroites, le reste avec une large fascie blanche; la columelle ombiliquée, à trois plis.

Schroet. einl. in Conch. 1. tab. 1. fig. 15.
On ignore son pays natal.

Volutes ventruës.

Volute éthiopique, *Voluta æthiopica*.

Émarginée: la spire couronnée d'épines en voûte; la columelle à quatre plis.

Lister, tab. 797. fig. 4. et 801. fig. 7. *Gualteri*, tab. 29. fig. H. I. *Dargenville*, pl. 17. fig. F. *Favan*, pl. 28. fig. B. 3. *Martini*, 3. tab. 75. 76. fig. 777 à 788.
Se trouve sur la côte orientale d'Afrique.

Volute yet, *Voluta cymbium*.

Émarginée; les tours de spire canaliculés en leurs bords; la columelle à quatre plis.

Lister, tab. 796. fig. 3 et 800. fig. 7. *Gualteri*, tab. 29. fig. B. *Adanson*, pl. 5. fig. I. *Dargenville*, 1. pl. 17. fig. G. *Martini*, 3. tab. 70. fig. 762 et 765.

Voyez pl. 58, fig. 6, où elle est représentée au sixième de sa grandeur naturelle.

Se trouve sur les côtes africaines et américaines de l'Océan. Elle est mangée par des Nègres.

Volute philin, *Voluta olla*.

Émarginée; la spire unie; la columelle à 3 plis.

Lister, tab. 794. fig. 1. *Gualt.* tab. 29. fig. A. *Adanson*, pl. 5. fig. 2. *Dargenv.* Zoomorph. tab. 11. fig. H. *Martini*, 5. tab. 71. fig. 766.

Se trouve dans l'Océan Africain, Américain et Indien.

Volute ample, *Voluta ampla*.

Alongée, l'ouverture ample; la lèvre aiguë; les tours de la spire à peine visibles.

Martini, Conch. 2. tab. 65. fig. 722 et 724.

On ignore son pays natal.

Volute de Neptune, *Voluta Neptunii*.

Émarginée, d'un roux brun; la lèvre saillante; la columelle à quatre plis.

Lister, tab. 802. fig. 8. *Gualt.* Test. tab. 27. fig. A. *A. Mart.* 5. tab. 64. fig. 3 et 65. fig. 3. 7.

Se trouve dans le golfe Persique.

Volute bateau, *Voluta navicula*.

Émarginée; la lèvre saillante; la columelle à quatre plis.

Lister, tab. 795. fig. 2. *Séba*, Mus. 3. tab. 64. fig. 10 et 11. *Martini*, Conch. 3. tab. 71. fig. 768. — 771.

On ignore le lieu d'où elle vient.

Volute papillaire, *Voluta papillaris*.

Alongée, l'extrémité avec des mamelons alongés.

Séba, Mus. 3. tab. 64. fig. 9. *Knorr.* Verg. 5. tab. 10. fig. 69.

On ignore son pays natal.

Volute indienne, *Voluta indica*.

Alongée, jaune, avec trois fascies de taches brunes, et la columelle à quatre plis.

Knorr. Verg. 5. tab. 8. fig. 1. *Martini*, Conch. 3. tab. 72. fig. 772, 775.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute chaloupe, *Voluta scapha*.

Raboteuse, nébuleuse, avec des lignes angulaires brunes; la columelle bleue à quatre plis: la lèvre élargie.

Lister, tab. 799. fig. 6. *Gualt.* test. tab. 28. fig. 5. *Martini*, 3. tab. 72. fig. 774. 776.

Se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

Volute gondole, *Voluta cymbiola*.

Ovale, glabre, presque blanche, avec des lignes longitudinales, couleur de sang; les tours de spire noduleux; la columelle à trois plis.

Chemn. Conch. 10. tab. 148. fig. 1585 et 1586.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute conoïdale, *Voluta conoidea*.

Oblongue, turbinée, unie; la base un peu striée; la suture crénelée.

Bulla conoidea, Linnæus.

On ignore sa patrie.

Volute prépuce, *Voluta præputium*.

Presque ovale, testacée, avec des taches rouges; la columelle à quatre plis; la base émarginée.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 148. fig. 1591 et 1592.

Se trouve à la côte de Coromandel.

Volute gland, *Voluta glans*.

Cylindrique, jaunâtre, la columelle émarginée, à trois plis; l'ouverture évasée et écartée.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 149. fig. 1595 et 1594.

Se trouve à la côte occidentale d'Afrique.

Volute réticulate, *Voluta reticulata*.

Émarginée, blanche, unie, avec un réseau doré; la columelle à quatre plis; spire conique, le premier tour cylindrique, ventru.

Kaemmer, Cab. rudolts. tab. 7. fig. 2.

Se trouve dans la mer des Indes.

Volute spectable, *Voluta spectabilis*.

D'un brun jaunâtre, strié de brun; la columelle à trois plis.

Kaemmer, Cab. rudolts. tab. 7. fig. 1.

Se trouve au détroit de Magellan.

OVULE, *OVULA*, Lamarck.

Coquille bombée, plus ou moins allongée aux extrémités, à bords roulés en dedans: ouverture longitudinale, non dentée sur le bord gauche.

Les ovules faisaient, dans Linnæus, partie du genre des bulles; Bruguière avait indiqué leur séparation comme nécessaire, et Lamarck l'a effectuée. Ce nouveau genre diffère, en effet, essentiellement des bulles par le recouvrement de la lèvre à l'intérieur. Il a de très-grands rapports avec celui des porcelaines, tant par la forme et la contexture de la coquille, que par la nature de l'animal; il n'en diffère réellement que par un peu plus de lar-