

Rumplius, tab. 34. fig. E. *Séba*, 3. tab. 46. fig. 20,
21. *Favanne*, tom. 2. pl. 16. fig. B.
Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône aile de papillon, *Conus genuanus*.

Rubicond, marqué de plusieurs zones inégales; articulé de brun et de blanc; la spire plane, convexe, mucronée.

Lister, tab. 769. fig. 17. B. *Rumphius*, tab. 54. fig. G. *Gualteri*, tab. 22. fig. H. *Dargenville*, pl. 12. fig. V. *Favanne*, pl. 14. fig. I. 3. *Martini*, 2. tab. 56. fig. 624, 625, 625.

Voyez pl. 16, fig. 4, où il est représenté de grandeur de moitié de nature.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

C. papillonacé, *Conus papilionaceus*.

Blanc, zoné de taches et de points fauves; la spire convexe, légèrement canaliculée, mucronée.

Gualt. tab. 22. fig. C. *Lister*, tab. 767. fig. 16. 775. fig. 19. *Dargenville*, pl. 22. fig. Q. *Favanne*, pl. 14. fig. I. 1. *Martini*, 2. tab. 669. 10. tab. 158. fig. 1282, 1283.

Se trouve dans l'Océan Indien.

Cône Prométhée, *Conus Prometheus*.

Oblong, blanc, marqué de zones interrompues couleur d'azur; la spire convexe, légèrement canaliculée, mucronée.

Lister, tab. 771. fig. 17. *Gualt.* tab. 12. fig. B. *Favanne*, tom. 2. tab. 15. fig. I.

Se trouve sur les côtes de l'Afrique orientale.

Cône glauque, *Conus glaucus*.

Glauque, marqué de lignes transverses, fauves,

interrompues; la spire convexe, tachée de brun; la base échancrée, striée; le bord interne de la lèvres droite couleur de rouille.

Rumphius, tab. 35. fig. G. G. *Séba*, 3. tab. 54. fig. 9. *Favanne*, tom. 2. pl. 15. fig. D. 2. *Martini*, 10. tab. 138. fig. 1277, 1278.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône surate, *Conus suratensis*.

Fauve, marqué de taches transverses, linéaires, brunes; la spire convexe, mucronée, tachée de brun; la base échancrée, striée.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône moine, *Conus monachus*.

Ovale, ondé de brun et de blanc cendré, quelquefois marqué de zones articulées; la spire aiguë; la base sillonnée.

Régenf. 1. tab. 12. fig. 68. *Knor.* tom. 3. fig. 2, 3.
Se trouve dans l'Océan Oriental.

Cône renoncule, *Conus ranunculus*.

Ovale, rouge, marqué de stries élevées, ponctuées, et de nébulosités blanches, la spire obtuse.

Séba, Thes. tom. 3. tab. 45. fig. 36.
Se trouve dans l'Océan Américain.

Cône agathe, *Conus achatinus*.

Ovale, brun, taché de blanc, souvent marqué de lignes ponctuées interrompues ou de fils bruns, la spire aiguë; la base raboteuse.

Rumphius, tab. 34. fig. L. *Séba*, 3. tab. 48. fig. 380. *Dargenville*, pl. 15. fig. B. *Favanne*, tom. 2. pl. 19. fig. M. 2. *Martini*, 2. tab. 55. fig. 613. 10. tab. 142. fig. 1320.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône taupin, *Conus cinereus*.

Ovale, cendré, marqué d'une fascie blanchâtre, nébuleuse, de taches fauves et de plusieurs lignes transverses ponctuées; la spire convexe, mucronée; la base sillonnée.

Rumphius, tab. 32. fig. R. *Favanne*, tom. 2. pl. 16. fig. C. 2. *Martini*, 2. tab. 527. fig. 578. 10. tab. 140. fig. 1504.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône réseau, *Conus mercator*.

Ovale, blanc ou jaunâtre, marqué de fascies treillisées de jaune ou de fauve; la spire convexe.

Lister, tab. 788. fig. 41. 789. fig. 42. *Dargenville*, pl. 12. fig. P. *Favanne*, pl. 14. fig. G. 1. G. 2. G. 3. *Adanson*, pl. 6. fig. 3. *Martini*, 2. tab. 56. fig. 220, 221.

Se trouve sur les côtes occidentales d'Afrique.

Cône tinné, *Conus betulinus*.

Citrin, marqué de plusieurs rangs de taches brunes; la spire convexe, mucronée, tachée de brun, la base échancrée, ridée.

Lister, tab. 762. fig. 11. *Rumphius*, tab. 31. fig. C. *Gualt.* tab. 21. fig. B. *Favanne*, pl. 16. fig. L. 1. L. 2. *Martini*, 2. tab. 40. fig. 665. 10. tab. 142. fig. 1521. 2. tab. 61. fig. 675.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône minime, *Conus figulinus*.

Couleur de rouille, marqué de fils transverses noirs; la spire convexe, mucronée; la base échancrée.

Lister, tab. 785. fig. 32. *Gualt.* tab. 20. fig. E. *Dargenville*, pl. 12. fig. A. *Favanne*, pl. 15. fig. D. *Mart.* 2. tab. 56. fig. 656. tab. 59. fig. 658.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône linné, *Conus quercinus*.

Jaune, marquée de lignes transverses très nombreuses, couleur d'ocre; la spire plane, obtuse; la base raboteuse.

Gualteri, tab. 20. fig. B. *Favanne*, tom. 2. pl. 15. fig. D. 3. *Martini*, 2. tab. 59. fig. 657.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône Protée, *Conus Proteus*.

Blanc, marqué de taches et de points bruns, disposés sur des lignes régulières; la spire obtuse, mucronée.

Gualt. tab. 22. fig. E. *Dargenville*, pl. 12. fig. C. 1. *Favanne*, pl. 14. fig. C. 1. *Martini*, 2. tab. 56. fig. 627. 10. tab. 140. fig. 1500.

Se trouve dans l'Océan Américain et Indien.

Cône léonin, *Conus leoninus*.

Blanc, marqué de taches longitudinales irrégulières, brunes, et de gouttes brunes disposées sur plusieurs rangs; la spire plane, canaliculée, mucronée.

Gualt. tab. 21. fig. D. *Favanne*, tom. 2. pl. 14. fig. I. 1. *Martini*, 2. tab. 57. fig. 640. 10. tab. 140. fig. 2099.

Se trouve dans la mer d'Amérique.

Cône picoté, *Conus augur*.

Jaunâtre, fascié de brun foncé, marqué de plusieurs rangs de points obscurs infiniment nombreux; la spire obtuse.

Lister, tab. 755. fig. 7. *Dargenville*, Supp. pl. 9. fig. 3. *Favanne*, pl. 17. fig. E. 2. *Martini*, 2. tab. 58. fig. 641.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône piqué, *Conus pertusus*.

Rose, fascié d'incarnat, marqué de nébulosités blanches, tirant sur le bleuâtre, et de sillons circulaires, piqués; la spire convexe.

Kaemmer, tab. 5. fig. 4.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône foudroyant, *Conus fulgurans*.

Blanchâtre, marqué de taches longitudinales en zigzags et de gouttes transversales couleur d'ocre; la spire concave, aiguë.

Favanne, tom. 2. pl. 17. fig. D. *Martini*, 2. tab. 58. fig. 644.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Cône Rumphius, *Conus acuminatus*.

Blanc, treillissé de brun, marqué d'une fascie simple ou divisée: rarement de deux; la spire aiguë, canaliculée.

Rumphius, tab. 54. fig. F. *Dargenville*, Supp. pl. 1. fig. L. K. *Favan*. pl. 17. fig. N. 1. N. 2. *Mart.* 2. tab. 57. fig. 638, 639.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône Amadis, *Conus Amadis*.

Brun, orangé, parsemé de taches blanches, cordées, presque triangulaires, et réunies; la spire canaliculée; le sommet saillant.

Dargenville, Supp. pl. 1. fig. 5., *Favanne*, tom. 2. tab. 7. fig. M. *Martini*, 2. tab. 58. fig. 642, 643.

Se trouve dans l'Océan Indien.

Cône Janus, *Conus Janus*.

Blanc, ondé de fauve et de châtain; quelquefois

fascié de blanc ou de brun; la spire aiguë, canaliculée; la base sillonnée.

Lister, tab. 785. fig. 33. *Gualt.* tab. 25. fig. S. *Favanne*, tom. 2. tab. 27. fig. O. *Martini*, 2. tab. 58. fig. 647.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône perdu, *Conus deperditus*.

Stries transverses, peu apparentes; la spire aiguë, canaliculée, treillissée par des stries; la base sillonnée.

Darg. pl. 29. fig. 8. *Fav.* pl. 6. fig. G. 1.

On ne la trouve que fossile à Courtagnon, Grignon, et autres lieux.

Cône étourneau, *Conus lythoglyphus*.

Rouge fauve; marqué de deux fascies blanches, écartées; celle de dessus variée de fauve; la spire obtuse; la base granuleuse, noirâtre.

Séba, 3. tab. 42. fig. 40 à 42. *Favanne*, tom. 2. tab. 18. fig. F. *Martini*, 2. tab. 57. fig. 630, 631.

Se trouve dans les mers d'Amérique et de l'Inde.

Cône aumusse, *Conus vexillum*.

Fauve, fascié de blanc, marqué de lignes longitudinales, irrégulières, brunes; la spire obtuse, tachée de brun; le sommet jaune; la base noirâtre.

Rumph. tab. 51. fig. S. *Gualt.* tab. 20. fig. M. et tab. 21. fig. M. *Martini*, tom. 2. tab. 57. fig. 629.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

C. peau de serpent, *Conus testudinarius*.

Blanc ou orangé, marqué de nébulosités brunes et cendrées et de fascies blanches, parsemées de taches brunes sagittées; la spire obtuse.

Rumph. tab. 34. fig. K. *Séba*, 3. tab. 44. fig. 13.

Favanne, tom. 2. pl. 16. fig. G. *Mart.* 2. tab. 55. fig. 605.

Se trouve sur les côtes d'Amérique.

Cône veiné, *Conus venulatus*.

Blanc, veiné de jaune; la spire convexe.

Favanne, tom. 2. pl. 14. fig. D. 1. 2.

Se trouve dans la mer du Sud.

Cône mozambique, *Conus mozambicus*.

Fauve ou jaune, marqué de taches blanches ou brunes, disposées en fascies, et de lignes ponctuées; la spire convexe, aiguë; la base striée.

Chemn. in Mart. tom. 10. tab. 144. A. fig. i. k.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Cône de Guinée, *Conus Guinaicus*.

Rubicond, fascié et varié de blanc; la spire obtuse.

Darg. pl. 1. fig. Q. *Fav.* pl. 16. fig. F. 1. 2.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Cône franciscain, *Conus franciscanus*.

Brun marron, marqué de deux zones blanchâtres; celle du haut se prolongeant sur les tours de la spire; la spire convexe, aiguë.

Kaemmer, tab. 6. fig. 4.

Se trouve dans les mers d'Afrique.

Cône informe, *Conus informis*.

Irrégulier, blanc, taché de brun et de bleuâtre; la spire convexe, aiguë; la base striée.

Knorr, 2. tab. 1. fig. 6. *Favanne*, tom. 2. pl. 79. fig. N.

Se trouve dans l'Océan Américain.

Cône rat, *Conus rattus*.

Cendré, marqué d'une fascie et de points blancs; la spire obtuse; la base violette.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Cône pavillon, *Conus jamaicensis*.

Olivâtre, marqué de lignes ponctuées et de fascies blanches, parsemées de brun; la spire convexe, aiguë.

Favanne, tom. 2. pl. 18. fig. D. 1. *Adanson*, pl. 6. fig. 6.

Se trouve dans les mers d'Afrique et d'Amérique.

C. méditerranéen, *Conus mediterraneus*.

Livide, marqué de fascies blanches, de lignes et de points bruns; la spire obtuse.

Séba, *Thes.* tom. 3. tab. 47. fig. 27.

Se trouve dans la Méditerranée.

Cône pointillé, *Conus puncticulatus*.

Blanchâtre, environné de points fauves alignés; la spire obtuse; la base sillonnée.

Séba, 3. tab. 48. fig. 46, 47.

Gualt. tab. 22. fig. 2. *Favanne*, pl. 19. fig. M. 3. *Martini*, tom. 2. tab. 54. fig. 612. 6. tom. 10. tab. 140. fig. 1505.

Se trouve dans les mers des Antilles.

Cône chiné, *Conus mauritianus*.

Blanc, taché de fauve, marqué de points bruns alignés, quelquefois parsemés; la spire obtuse; la base sillonnée.

Se trouve dans les mers d'Afrique.

Cône cordelier, *Conus fumigatus*.

Marron, fascié de blanc ; la spire obtuse.
Dargenville, pl. 12. fig. D. *Mart.* 2. tab. 56. fig. 618.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Cône à ceintre bleu, *Conus cinctus*.

Légèrement conique ; spire lisse, variée de points blancs et bruns ; une ceinture d'un bleu pourpré, bordée par une rangée de points noirs, et par deux autres ceintures de même couleur sur un fond gris verdâtre.

Voyez planche 40, fig. 2, où il est représenté plus gros que nature : de la collection de Famin, du Havre, qui a permis à Daudin de le décrire et faire dessiner.

Cône cerclé, *Conus vittatus*.

Jaune, marqué d'une zone blanche, variée d'orangé ; la spire convexe, mucronée.

Knorr, tom. 3. tab. 11. fig. 3.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône matelot, *Conus classarius*.

Couleur d'ocre, fascié de blanc et de brun ; la spire obtuse, tachée de brun.

Favanne, tom. 2, pl. 14. fig. C. 5.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône chevalier, *Conus eques*.

Blanc, fascié de jaune, marqué de deux rangs de taches fauves : la spire convexe.

Favanne, tom. 2. pl. 14. fig. F. 1 et 2.

Se trouve sur les côtes de la Floride.

Cône velours, *Conus luzonicus*.

Blanc, marqué de fascies et de points fauves ; la spire aiguë.

Dargenv. Supp. pl. 1. fig. R. *Favan.* tom. 2. pl. 17. fig. C.

Se trouve dans l'Océan Austral.

Cône chat, *Conus catus*.

Blanc, varié de fauve, garni de stries élevées, marqués de points et de taches d'un blanc bleuâtre, quelquefois granuleux ; la spire obtuse.

Knorr, 3. tab. 27. fig. 5. *Mart.* tom. 2. tab. 55. fig. 609 et 610.

Se trouve sur les côtes orientales d'Afrique.

Cône variolé, *Conus verrucosus*.

Sillonné, granuleux, blanc ou jaunâtre, varié de fauve ; la spire élevée.

Lister, tab. 756. fig. 8. *Favanne*, tom. 2, pl. 18. fig. H. *Martini*, 2. tab. 55. fig. 612. C.

Se trouve sur la côte d'Afrique.

Cône colombe, *Conus columba*.

Blanc ou couleur de rose ; la spire aiguë ; la base striée.

Gualteri, tab. 25. fig. G. *Favanne*, tom. 2. pl. 18. fig. K. 1.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône croisé, *Conus madurensis*.

Verdâtre, marqué de nébulosités blanches et de fauves, de lignes ponctuées de brun et de blanc ; la spire élevée.

Favanne, tom. 2. pl. 18. E. 1. et 2.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône jaunisse, *Conus pusio*.

Jaunâtre, marqué d'une zone blanche; la spire obtuse.

Favanne, pl. 18. fig. I. 1. I. 2. Martini, tom. 2. tab. 55. fig. 612.

Se trouve en Amérique.

Cône pluie d'or, *Conus Japonicus*.

Jaune, parsemé de blanc, marqué de lignes brunes interrompues, ponctuées; la spire élevée; la base sillonnée.

Se trouve sur les côtes du Japon.

Cône pluie d'argent, *Conus mendanus*.

Blanc, varié de ponceau, plusieurs rangs de très petits points; la spire élevée; la base obtuse.

Se trouve sur les côtes des Philippines.

Cône bois de frêne, *Conus namocanus*.

Jaunâtre, environné de zones et de fils capillaires, fauves; onduleux et rapprochés; la spire obtuse, tachée de brun.

Se trouve dans l'Océan pacifique.

Cône treillissé, *Conus cancellatus*.

Blanc, treillissé par des sillons transverses et des rides longitudinales; la spire élevée.

Se trouve dans l'Océan Pacifique.

Cône violet, *Conus taitensis*.

Strié transversalement, d'un violet presque noir, marqué de taches et de points rares blancs; la spire obtuse.

Se trouve dans l'Océan Pacifique.

Cône ambassadeur, *Conus tinianus*.

Couleur de cinabre, marqué de taches verdâtres peu apparentes, et entremêlées de points fauves; la spire convexe.

Se trouve dans l'Océan Pacifique.

C. Portoricco, *Conus Portoricanus*.

Granuleux, blanc, taché de fauve; la spire convexe, mucronée.

Se trouve dans l'Océan Américain.

Coquille cylindracée, spire lisse.

Cône oma, *Conus omaicus*.

Orangé, marqué de trois fascies blanches, de zones et de lignes nombreuses composées de fauve et de blanc, souvent litturées; la spire concave, obtuse; le sommet rougeâtre.

Dargenville, Suppl. pl. 1. fig. Y. Favanne, pl. 17. fig. F. Mart. 2. tab. 277. fig. 590.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône noble, *Conus nobilis*.

Jaune citron, marqué de taches blanches cordées, de deux fascies composées de lignes ponctuées, distinctes des taches blanches; la spire plane, concave, accompagnée d'un rebord aigu; le sommet mucroné, couleur de rose; la base échancrée.

Séba, 3. tab. 43. fig. 13, 14. Favanne, tom. 2. pl. 14. fig. E. 2. Mart. 2. tab. 62. fig. 689. 10. tab. 141. fig. 1314.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

C. drap d'argent, *C. stercus muscarum*.

Blanc, marqué de points disposés en masses; la spire canaliculée, obtuse; l'ouverture bâillante, rougeâtre; la base échancrée.

Lister, tab. 557. fig. O. *Gualt.* tab. 5. fig. O. *Favanne*, pl. 15. fig. P. 4. *Dargenville*, pl. 13. fig. E. *Martini*, 2. tab. 64. fig. 711, 712, 713.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône granuleux, *Conus granulatus*.

Silloné, granuleux, écarlate, marqué d'une fascie blanche, de taches et de points pourpres; la spire convexe, aiguë.

Lister, tab. 760. fig. 5. *Favanne*, tom. 2. pl. 15. fig. G. 2. *Martini*, 2. tab. 527. fig. 574, 575.

Se trouve dans l'Océan Américain.

Cône véruleux, *Conus verulosus*.

Blanc, garni de sillons et de stries saillantes; la spire convexe, aiguë.

Lister, tab. 798. fig. 17. a. *Favanne*, tom. 2. pl. 15. fig. G. 3.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Cône orange, *Conus aurisiacus*.

Incarnat, marqué de fascies blanches et de zones élevées, articulées de blanc et de brun; la spire obtuse, canaliculée.

Rumph. tab. 34. fig. A. *Séba*, 5. tab. 47. fig. 7. *Dargenville*, Suppl. pl. 1. fig. I. *Favanne*, pl. 19. fig. K. 1. *Martini*, 2. tab. 57. fig. 535, 536.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Cône carrière, *Conus terebra*.

Rougeâtre, marqué de stries élevées et de deux fas-

cies d'un jaune pâle; la spire obtuse; la base violette.

Rumphius, tab. 35. fig. E. E. *Favanne*, tom. 2. pl. 17. fig. K. 2. *Martini*, 2. tab. 52. fig. 577.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône radix, *Conus raphanus*.

Comprimé au milieu du tour extérieur; jaune, fascié de blanc, ceint de fils fauves très nombreux; la spire obtuse, canaliculée, presque mucronée, tachée de brun; le sommet couleur de rose.

Séba, Thes. tom. 3. tab. 44. fig. 12.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône nébuleux, *Conus magus*.

Blanc, fascié par des taches longitudinales, nébuleuses, brunes; marqué de lignes transverses, ponctuées de blanc; la spire obtuse, presque mucronée.

Séba, 5. tab. 44. fig. 29. *Dargenv.* Suppl. pl. 2. fig. C. *Favanne*, pl. 17. fig. A. 1. *Mart.* 2. tab. 52. fig. 579, 580.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône strié, *Conus striatus*.

Des taches blanches et fauves; de fines stries transverses, parallèles, brunes, distinctes; la spire obtuse, canaliculée; la base sillonnée.

Lister, tab. 760. fig. 5. *Gualt.* tab. 26. fig. D. *Adanson*, pl. 6. fig. 2. *Dargenv.* pl. 13. fig. G. *Favanne*, pl. 19. fig. N. *Martini*, 2. tab. 54. fig. 714, 716.

Se trouve dans les mers de l'Afrique orientale et des Indes.

Cône gouverneur, *Conus gubernator*.

Bombé vers le haut, comprimé au milieu d'un blanc mêlé de rose, marqué de deux fascies composées de

taches longitudinales, figurées, brunes, non striées ; la spire canaliculée, mucronée ; la base sillonnée.

Favanne, Cat. de Latour, pl. 396.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône spectre, *Conus spectrum*.

Légerement sillonné, blanchâtre, marqué de taches longitudinales onduleuses, d'un brun rougeâtre ; spire convexe, mucronée ; ouverture baillante ; base échancrée.

Lister, tab. 785. fig. 50. *Rumph.* tab. 52. fig. S. *Favanne*, tom. 2. pl. 14. fig. H. 2. *Martini*, 2. tab. 53. fig. 582, 585.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône bullé, *Conus bullatus*.

Rouge, de deux nuances ; spire canaliculée, mucronée ; ouverture baillante, orangée dans l'intérieur ; base échancrée.

Gualteri, tab. 26. fig. C. *Séba*, 5. tab. 43. fig. 15. 16. *Dargenville*, pl. 15. fig. H. *Fav.* pl. 18. fig. C. 8.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône satiné, *Conus timorensis*.

Incarnat, ondé de blanc, avec une zone pontuée ; la spire canaliculée, élevée ; l'ouverture baillante ; la base échancrée.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône pluvieux, *Conus nimbosus*.

Blanchâtre, garni d'une fascie rose, de stries élevées, marquées de points et de lignes brunes ; la spire aplatie, presque mucronée.

Se trouve dans l'Océan Indien.

Cône commandant, *Conus dux*.

Oblong, strié transversalement, d'une teinte bleue.

rougeâtre, ceint de lignes blanchâtres, distinctes, tachées de brun ; la spire convexe, élevée.

Valentin, Univ. amb. fig. 11 et 70. *Martini*, tom. 2. tab. 52. fig. 571.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes, et est des plus rare.

Cône bâtonnet, *Conus tendineus*.

Oblong, strié transversalement, d'un brun violet, marqué de taches longitudinales, blanches ; la spire convexe, élevée.

Lister, tab. 745. fig. 36. *Favanne*. Catal. de Latour, pl. 3. fig. 405. et *Martini*, tom. tab. 10. 143. figure 1350 et tab. 52. fig. 572.

Se trouve dans les mers d'Afrique.

Cône préfet, *Conus prefectus*.

Oblong, jaunâtre, fascié de blanc ; la spire convexe, élevée.

Martini, tom. 2. pl. 52. fig. 6.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Cône sillonné, *Conus strigatus*.

Oblong, strié transversalement, d'un violet pâle, marqué de points et de taches fauves ; la spire convexe, élevée.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône gland, *Conus glans*.

Oblong, strié transversalement, brun, marqué de fascies blanches peu prononcées ; la spire convexe, élevée.

Séba, 5. tab. 55. fig. Z. *Dargenv.* Suppl. pl. 2. fig. D. *Favanne*, pl. 17. fig. D. G.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône nussatelle, *Conus nussatella*.

Oblong, strié transversalement, blanc, nué de fauve; ceint de lignes ponctuées brunes; la spire convexe, élevée.

Lister, tab. 744. fig. 35. *Gualt.* tab. 25. fig. H. L. *Dargenville*, pl. 15. fig. P. *Favanne*, pl. 18. fig. E. 2. 4. *Martini*, 2. tab. 51. fig. 567.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône mitré, *Conus mitratus*.

Oblong, strié transversalement, jaune, fascié de taches fauves, orangées et blanches; la spire convexe, élevée.

Lister, Synop. tab. 745. fig. 36.

Se trouve dans l'Océan Indien.

Cône brunette, *Conus aulicus*.

Oblong, strié transversalement, brun; marqué de taches inégales, triangulaires, blanches; la spire aiguë.

Rumphius, tab. 35. fig. 3. *Gualt.* tab. 25. fig. Z. *Lister*, tab. 778. fig. 40. *Dargenville*, pl. 16. fig. O. *Favanne*, pl. 18. fig. 7. *Martini*, 2. tab. 55. fig. 592.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône drap orangé, *Conus auratus*.

Oblong, strié transversalement, orangé, marqué de taches blanches cordées; la spire aiguë.

Dargenville, pl. 15. fig. D. *Gualt.* tab. 25. fig. 10. *Séba*, 5. tab. 45. fig. 1, 2, 4, 5. *Favanne*, pl. 18. fig. C. 3. 6. *Martini*, 2. tab. 54. fig. 597.

Se trouve dans les mers de l'Inde.

Cône drap flambé, *Conus aureus*.

Oblong, strié transversalement, jaune, marqué de

flammes fauves et de taches blanches longitudinales cordiformes; la spire aiguë.

Knorr., Conch. tom. 5. tab. 11. fig. S.

Se trouve dans l'Océan Indien.

Cône drap réticulé, *Conus auricomus*.

Oblong, strié transversalement, d'un fauve cannelé, réticulé par des taches trigones blanches, disposées en fascies; la spire aiguë.

Lister, tab. 744. fig. 34. *Martini*, tom. 2. tab. 52. fig. 570.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône omaria, *Conus omaria*.

Fauve, marqué de taches ovoïdes légèrement trigones, blanches, et de plusieurs lignes circulaires brunes, chargées de petites taches cordées blanches; spire obtuse; sommet couleur de rose.

Séba, 5. tab. 47. fig. 3. *Knorr*, 2. tab. 1. fig. 5. *Favanne*, tom. 2. pl. 18. fig. C. 5. *Martini*, 2. tab. 54. fig. 596.

Se trouve dans l'Océan Indien.

Cône poudingue, *Conus rubiginosus*.

Brun, marqué de taches cordées inégales, blanches; la spire obtuse.

Gualt. tab. 25. fig. V. *Favanne*, tom. 2. pl. 18. fig. C. 4. *Martini*, 2. tab. 54. fig. 594, 595.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône plumeux, *Conus pennaceus*.

Brun, orangé, marqué de taches blanches et de lignes brunes ponctuées de blanc; la spire obtuse.

Rumph. tab. 35. fig. 4. *Séba*, 5. tab. 45. fig. 3. *Favanne*, tom. 2. pl. 18. fig. C. 2.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône prélat, *Conus prelatus*.

Jaune, marqué de deux fascies variées de brun, de blanc, de verdâtre, et de lignes ponctuées finement; la spire aiguë.

Favanne, tom. 2. pl. 18. fig. B. 7. *Martini*, 2. tab. 54. fig. 601.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône archevêque, *Conus archiepiscopus*.

Fauve; flambé de lignes longitudinales brunes, marquées de quatre fascies réticulées de blanc, de bleu, de rose, de violet; la spire aiguë.

Dargenville, pl. 13. fig. 1. *Favanne*, pl. 18. figure B. 2.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône évêque, *Conus episcopus*.

Brun; fascié par des taches triangulaires blanches; marqué de lignes circulaires ponctuées; la spire obtuse.

Séba, 5. tab. 45. fig. 6. *Martini*, tom. 2. tab. 54. fig. 595.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône chanoine, *C. canonicus*.


Ventru, brun, fascié par un réseau et des taches blanches; la spire élevée; le fond de l'ouverture couleur de rose.

Knorr, 5. tab. 18. fig. 2. *Martini*, tom. 2. tab. 54. fig. 602.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône abbé, *Conus abbas*.

Orangé, ondé de brun, marqué de zones réticulées.



Desceve del.

Berthault Sculp.

1. Le Cone musique. 4. Le Cone aile de Papil^{on}
 2. Le Cone à ceinture bleue. 5. Le Cone maculé.
 3. Le Cone drap d'or. 6. Le Cone mosaïque.

de rose , et parsemé de taches rares blanches ; la spire aiguë.

Chemnitz in *Martini*, tom. 10. tab. 143. figure 1326. b. c.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône drap d'or, *Conus textile*.

Jaune, marqué de lignes longitudinales ondulées brunes, et de taches cordées, blanches, circonscrites de fauve ; la spire élevée.

Gualteri, tab. 25. fig. A. A. *Séba*, 3. tab. 47. fig. 15. 43. fig. 9. *Adanson*, pl. 6. fig. 7. *Dargenv.* pl. 13. fig. F. *Favanne*, pl. 13. fig. B. 1. 3. 4. 5. 8. C. 1. *Martini*, 2. tab. 54. fig. 599, 600.

Voyez la pl. 40, fig. 3, où il est représenté de moitié de grandeur naturelle.

Se trouve dans les mers, entre les Tropiques.

Cône gloire de mer, *Conus gloria*.

Oblong, blanc, fascié d'orange, réticulé par des taches très nombreuses, triangulaires, blanches, circonscrites de brun ; la spire aiguë, élevée.

Naturf. 3. tab. 8. fig. A. *Chemnitz*, in *Martini*, tom. 10. tab. 143. fig. 1524 et 1525.

Se trouve dans la mer des Indes.

VERMICULAIRE, *VERMICULARIA*,

Lamarck.

Coquille tubulée, tortillée irrégulièrement en spirale, ordinairement adhérente et garnie d'une ouverture operculée.

Ce genre, formé par *Adanson* de six espèces de vers à tuyau, dont il a observé les ani-