

CONSULTATIONS
ET
ORDONNANCES

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

CORYZAS

I. — Coryza aigu.

1° Repos à la chambre.

2° Trois fois par jour, faire des renflements ou des irrigations nasales avec une *infusion de feuilles d'eucalyptus*, ou simplement de l'eau la plus chaude possible, à laquelle on ajoutera, par verre, une cuillerée à soupe d'une solution d'eau phéniquée au 1/20.

3° Priser toutes les deux heures une pincée du mélange suivant, après s'être mouché :

| | |
|-----------------------------|----------|
| ℥ Chlorhydrate de cocaïne | 0 gr. 10 |
| Menthol. | 0 — 20 |
| Acide salicylique. | 0 — 50 |
| Acide borique. | 4 — |
| Poudre de guimauve. | 10 — |

Pulvériser finement et passez au tamis.

4° Si la douleur frontale est trop vive, prendre dans la journée trois des pilules suivantes, à quatre ou cinq heures d'intervalle :

℥ Azotate d'aconitine cristallisée . . . 1 milligr.
 Bromhydrate de quinine . . . 1 gr.
 Poudre de réglisse q. s.
 F. s. a. Dix pilules.

5° Enduire l'orifice des fosses nasales et la lèvre supérieure, s'il y a irritation, avec :

Vaseline 10 gr.
 Acide borique 1 —

II. — Coryza chronique simple.

1° Faire matin et soir, à l'aide d'un siphon, des irrigations nasales avec une *infusion d'espèces aromatiques* (thym, hysope, menthe poivrée, romarin).

2° Badigeonner ensuite les fosses nasales avec la préparation suivante :

℥ Chlorhydrate de cocaïne 0 gr. 20
 Acide salicylique 1 —
 Glycérine 40 —
 Infusion d'écorce de chêne 60 —

3° Toutes les deux heures, prendre une prise de la poudre suivante :

℥ Oxyde de zinc 2 gr.
 Camphre } à à 5 —
 Talc de Venise }
 Pulvériser finement.

4° Tous les matins prendre une cuillerée à soupe d'huile de foie de morue (ou, pour ceux qui ne peuvent la supporter, 4 à 5 capsules de morrhuel dans la journée) et du sirop d'iodure de fer.

5° Chaque année, faire une saison soit à Uriage, soit à Cauterets ou à Luchon.

III. — Coryza syphilitique des nouveau-nés.

1° Déboucher les narines en introduisant dans les cavités un pinceau imbibé d'huile d'amandes douces.

2° Badigeonner les parois des cavités nasales avec la pommade suivante :

℥ Vaseline 10 gr.
 Calomel 1 —

3° Faire des frictions matin et soir, au niveau des plis articulaires, avec gros comme un pois de la pommade suivante :

Onguent napolitain . . . 60 gr.

4° Si le nourrisson ne peut téter, lui faire prendre le lait soit au verre, soit à la cuiller.

LARYNGITES

I. — Laryngite aiguë simple.

1° S'abstenir de parler, de fumer, de

boire de l'alcool et de manger des mets épicés.

Repos à la chambre à une température modérée (16 à 18°).

Boissons chaudes.

Bain de pieds chaud et sinapisé.

2° Faire toutes les trois heures des inhalations d'une durée de dix minutes avec une décoction de guimauve et de pavot.

3° Prendre matin et soir, dans une *infusion de capillaire et d'erysimum*, vingt gouttes du mélange suivant :

℥ Teinture de belladone. à 10 gr.
Alcoolature de racines d'aconit)

II. — Laryngite catarrhale chronique.

1° S'abstenir absolument d'alcool et de tabac. Parler modérément et à voix basse.

2° Faire matin et soir des fumigations avec le mélange suivant que l'on maintiendra à l'ébullition pendant une demi-heure :

℥ Goudron. 100 gr.
Teinture d'eucalyptus. 20 —
Eau. 1 litre.

3° Faire deux fois par semaine des attouchements du larynx, à l'aide du porte-ouate, avec la solution suivante :

℥ Chlorhydrate de cocaïne 0 gr. 20
Chlorure de zinc. 1 —
Glycérine 30 —

4° Chaque jour, boire à jeun un verre d'eau de la *Raillère*, chauffée au bain-marie ou additionnée par un tiers de lait bouillant.

Couper la boisson, au moment des repas, avec de l'eau de la Bourboule.

III. — Laryngite striduleuse.

1° Appliquer au-devant du cou de l'enfant une éponge trempée dans de l'eau très chaude.

2° Donner, au moment de l'accès, la potion suivante par cuillerées à entremets toutes les dix minutes :

℥ Bromure de strontium . . . 0 gr. 50
Sirop de chloral. 20 —
Sirop de jusquiame 20 —
Sirop d'écorces d'oranges 40 —

Si la potion est refusée par l'enfant, donner le lavement suivant :

℥ Bromure de strontium . . . 0 gr. 50
Hydrate de chloral. 0 — 50
Jaune d'œuf. N° 1
Infusion de valériane. 60 gr.

3° Si l'asphyxie est menaçante, pratiquer la *dilatation forcée du larynx* à l'aide d'une pince courbe.

Essayer les *tractions rythmées de la langue*.

4° Dans la journée qui suit l'accès,

donner, par cuillerées à café, d'heure en heure la potion suivante :

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| ℥ Alcoolature de racines d'aconit | } à X goutt. | |
| Teinture de belladone | | |
| Sirop de codéine | | 30 gr. |
| Hydrolat de tilleul | | 90 — |

IV. — Laryngite tuberculeuse.

1^o Traitement général : Prendre tous les matins une à trois cuillerées à soupe d'huile de foie de morue.

Tous les deux jours faire une injection sous-cutanée de 3 centimètres cubes avec la préparation suivante :

| | |
|----------------------------|------------|
| ℥ Gaïacol | } à 10 gr. |
| Eucalyptol | |
| Huile stérilisée | |

2^o Traitement local : Faire matin et soir des pulvérisations d'une durée de cinq minutes avec la préparation suivante :

| | |
|--------------------------------|-------|
| ℥ Acide phénique cristallisé | 1 gr. |
| Glycérine | 50 — |
| Décoction de guimauve et pavo. | 300 — |

3^o S'il y a ulcération, des attouchements du larynx devront être pratiqués tous les deux jours, par le médecin lui-même avec :

| | |
|----------------------------|--------|
| ℥ Acide lactique | 20 gr. |
| Eau | 100 — |

V. — Laryngite syphilitique.

1^o Prendre chaque jour, en deux fois, dans une tasse de lait, quatre cuillerées de la solution suivante :

| | |
|---------------------------------|--------|
| ℥ Iodure de potassium | 20 gr. |
| Eau | 300 — |

2^o Toucher les parties malades avec la solution suivante :

| | |
|------------------------------|-------|
| ℥ Nitrate d'argent | 1 gr. |
| Eau | 50 — |

3^o Prendre au moment de chaque repas une des pilules suivantes :

| | |
|---|----------|
| ℥ Tartrate ferrico-potassique | 0 gr. 15 |
| Extrait de quinquina | 0 — 05 |
| F. s. a. une pilule. N ^o 20. | |

COQUELUCHE

I. Période catarrhale.

1^o Tenir l'enfant au lit et éloigner les autres enfants.

Boissons chaudes : lait, infusions d'espèces pectorales, décoction de fruits pectoraux (dattes, figues, jujubes, raisins de Corinthe). Grog, café noir.

Alimentation légère.

2° Donner le vomitif suivant :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| ℥ Poudre d'ipéca. | 0 gr. 30 à 0 gr. 60 |
| Sirop d'ipéca. | 30 à 60 gr. |

A prendre par cuillerées à café toutes les cinq minutes jusqu'à effet vomitif. Faire boire de l'eau tiède dans l'intervalle pour faciliter le vomissement.

3° Toutes les deux heures donner une cuillerée à café de la potion suivante :

| | |
|--|-----------|
| ℥ Alcoolature de racines d'aconit. | X gouttes |
| Teinture de belladone | XV — |
| Eau de laurier cerise. | 10 gr. |
| Sirop de narcéine soluble | 30 — |
| Eau de fleurs d'oranger | 80 — |

II. Période d'état.

1° S'il existe un peu de fièvre, de bronchite, ou si les quintes de toux sont trop fréquentes, garder l'enfant à la chambre, dans une pièce vaste, chaude et bien aérée. Ne permettre les sorties que si le temps est chaud et sec, mais pas de fatigues dans les promenades.

Eviter les émotions et les contrariétés.

Au moment des quintes, aider l'enfant ; s'il est couché, l'asseoir sur son lit, et soutenir le front avec la main. Débarrasser la bouche des mucosités.

2° Alimentation : lait, bouillon, viandes hachées, gelées, purées, œufs, crèmes.

Faire manger l'enfant souvent et peu à la fois, aussitôt après une quinte. S'il y a vomissement, couper la boisson avec de l'eau de Vichy (Célestins) ou de Vals, (Perle n° 3), *café noir*.

3° Donner trois cuillerées à entremets par jour de la potion suivante :

| | |
|----------------------------------|-------|
| ℥ Antipyrine. | 2 gr. |
| Sirop de belladone | 20 — |
| Sirop de tolu | 40 — |
| Eau de fleurs d'oranger. | 60 — |

4° Faire évaporer dans la chambre du malade et faire des inhalations trois fois par jour avec le mélange suivant :

| | |
|--------------------------------|----------|
| ℥ Goudron | 100 gr. |
| Essence de thym | } à 10 — |
| Essence d'eucalyptus | |
| Alcool. | 50 — |
| Eau. | 1 litre |

5° En prévision des quintes fréquentes de la nuit et de l'insomnie qui en résulte, donner le soir une à deux cuillerées à dessert de la potion suivante :

| | |
|------------------------------------|--------|
| ℥ Bromure de strontium | 1 gr. |
| Hydrate de chloral | 0 — 50 |
| Sirop de narcéine soluble. | 40 — |
| Eau de fleurs d'oranger | 80 — |

III. Convalescence.

1° Changement de climat. Bains de mer. Promenades au grand air.

Alimentation substantielle.

Un verre à liqueur de *vin de gentiane* avant le repas.

Couper la boisson avec de l'eau de la Bourboule.

2° Matin et soir, faire prendre une tasse de lait sucré avec une cuillerée à soupe de :

Sirop de bourgeons de sapin . 120 gr.

3° Si la toux persiste, donner chaque jour une cuillerée d'huile de foie de morue et envoyer l'enfant au Mont-Dore.

BRONCHITES

I. — Trachéite ou rhume.

1° Repos à la chambre à une température modérée.

2° Alimentation légère.

Boissons chaudes, tisane de violettes ou de bourrache que l'on sucre avec une ou deux cuillerées de *sirop de tolu*; — grogs.

3° Toutes les trois heures, prendre une cuillerée à soupe de la potion suivante :

| | |
|--|-------|
| ℥ Alcoolature de racines d'aconit. XXX gout. | |
| Benzoate de soude | 4 gr. |
| Sirop de narcéine soluble | 30 — |
| Eau de laurier-cerise | 10 — |
| Hydrolat de tilleul | 80 — |

4° Badigeonnages de la poitrine avec un pinceau légèrement trempé dans la mixture

ci-après, et formant chaque fois (toujours à une place différente) un rond de la dimension d'une pièce de 5 francs.

| | |
|-------------------------------|--------|
| ℥ Teinture d'iode | 20 gr. |
| Iode cristallisé | 8 — |
| Iodure de potassium | 4 — |

II. — Bronchite aiguë simple.

A. — 1^{re} période d'hyperhémie et de fièvre. Toux sans expectoration.

1° Repos au lit. Sudation.

Boissons très chaudes : tisane de fleurs pectorales (faire infuser pendant une demi-heure dix grammes de fleurs par litre d'eau ; passer); — tisane de lichen (laver le lichen à l'eau bouillante pour enlever le principe amer; puis le faire bouillir pendant une demi-heure); — grogs.

2° Faire plusieurs fois dans la journée des fumigations avec :

| | |
|--------------------------------|------------------|
| ℥ Racine de guimauve | 30 gr. |
| Tête de pavot | N ^o 1 |

Faire bouillir pendant une demi-heure dans un litre d'eau.

3° Prendre toutes les trois heures une cuillerée à soupe de la potion suivante :

| | |
|---------------------------------|------------|
| ℥ Benzoate de soude | 4 grammes. |
| Sirop diacode | 40 — |
| Sirop de belladone | 20 — |
| Eau de laurier-cerise | 20 — |
| Hydrolat de tilleul | 70 — |

4° Faire appliquer en arrière de la poitrine quarante ventouses sèches.

B. — 2° période de crudité.

1° Tisane de capillaire que l'on sucrera avec une cuillerée à soupe de *sirop diacode*. — Grog.

2° Prendre, en deux jours, la potion suivante :

℥ Kermès minéral . . . 0 gr. 60
Julep gommeux . . . 120 —

3° Continuer les fumigations émollientes, Remettre des ventouses sèches.

C. — 3° période de coction.

1° Tisane de bourgeons de sapin (faire infuser vingt grammes pendant deux heures dans un litre d'eau).

2° Faire plusieurs fois dans la journée des fumigations avec :

℥ Térébenthine 40 gr.
Teinture d'eucalyptus . . . 30 —
Eau 1 litre

3° Prendre dans la journée 5 capsules de :

Eucalyptol 0 gr. 20.

4° Le soir, en se couchant, prendre deux cuillerées à soupe de la potion suivante, dans une tasse de lait bien chaud :

℥ Sirop de chloral. . . } àà 60 gr.
Sirop de morphine. . . }

III. — Bronchite chronique.

1° Chaque matin prendre une cueillerée à soupe d'*huile de foie de morue créosotée* ou cinq capsules de *morrhual créosoté*.

2° Pendant vingt jours par mois, prendre au moment du repas une cuillerée à soupe de la solution suivante :

℥ Arséniate de soude . . . 0 gr. 10
Iodure de sodium 10 —
Eau 300 —

3° Chaque jour, prendre quatre des capsules suivantes :

℥ Benzoate de soude . . . 0 gr. 10
Terpine } àà 0 gr. 20
Eucalyptol }

Pour une capsule. N° 50.

4° Le soir, en se couchant, prendre une des pilules suivantes :

℥ Masse de cynoglosse opiacé . . 4 gr.
F. s. a. Vingt pilules.

5° Au point de vue de l'hygiène, faire tous les matins en se levant une lotion sur le corps avec de l'eau tiède légèrement alcoolisée, suivie d'une vigoureuse friction avec une lingesec et chaud.

S'abstenir de tabac.

Faire une saison tous les ans à Eaux-Bonnes, Cauterets ou au Mont-Dore.

IV. — Bronchite fétide.

1° Faire toutes les deux heures des inhalations avec la solution suivante :

| | |
|-----------------------------|--------|
| ℥ Eucalyptol | 10 — |
| Teinture de benjoin | 10 gr. |
| Alcool à 90° | q. s. |
| Eau | 200 — |

(Placer ce liquide dans un flacon dont le bouchon porte deux tubes ; un tube droit plongeant dans le liquide servant à faire pénétrer l'air dans le flacon, — et un tube coudé, prolongé par un tube en caoutchouc, qui permet d'aspirer l'air imprégné de vapeurs médicamenteuses.)

2° Chaque jour prendre la potion suivante ;

| | |
|----------------------------------|-------|
| ℥ Hyposulfite de soude | 4 gr. |
| Julep gommeux | 80 — |

3° Prendre chaque jour quatre des pilules suivantes :

| | |
|------------------------------|-----------------|
| ℥ Créosote de hêtre. | } à à 0 gr. 05. |
| Terpine. | |
| Iodoforme. | |
| F. s. a. une pilule. N° 50. | |

4° Alimentation substantielle et fortifiante.

Vie au grand air.

Faire chaque année une saison aux eaux d'Uriage ou de Caunterets.

BRONCHITE CAPILLAIRE

A. *Chez l'enfant* (de 2 à 5 ans).

1° Tenir l'enfant au lit, les jambes enveloppées dans de la ouate que l'on renouvelera matin et soir.

Faire évaporer dans la chambre de l'eau à laquelle on ajoutera une pincée de feuilles d'eucalyptus.

2° Donner, dès le début, le vomitif suivant :

| | |
|----------------------------|----------|
| ℥ Poudre d'ipéca | 0 gr. 50 |
| Sirop d'ipéca | 50 — |

Une cuillerée à café toutes les cinq minutes jusqu'à effet vomitif.

3° Appliquer en arrière de la poitrine, au niveau des bronches atteintes, un vésicatoire de la grandeur d'une pièce de deux francs ; le laisser en place pendant deux heures et le remplacer par un cataplasme d'amidon. Ouvrir la vésicule avec une aiguille bien propre, ne pas enlever l'épiderme. Pansement deux fois par jour avec de la vaseline boriquée étendue sur du papier.

4° Matin et soir, appliquer en avant de

la poitrine un cataplasme sinapisé qu'on laissera en place de cinq à dix minutes, jusqu'à ce que la peau rougisse.

Si l'oppression est trop vive, dix à quinze ventouses sèches.

5° Toutes les heures, donner une cuillerée à café de la potion suivante :

| | |
|-----------------------------------|-------|
| ℥ Benzoate d'ammoniaque | 2 gr. |
| Vin de Malaga | 20 — |
| Eau de menthe | 40 — |
| Sirop de capillaire | 60 — |

6° Comme alimentation : lait et bouillon. Tisane pectorale. Grog.

Forme grave. Catarrhe suffocant :

1° Plonger l'enfant toutes les trois heures, nuit et jour, dans un *bain sinapisé* tiède. Frictions dans le bain et rouler ensuite l'enfant dans une couverture de laine.

2° Pratiquer chaque jour une injection hypodermique d'un centimètre cube avec la solution suivante :

| | |
|----------------------------|----------|
| ℥ Caféine | 0 50 cg. |
| Benzoate de soude. | 2 gr. |
| Eau distillée | 10 — |

3° Donner toutes les heures une cuillerée à café de la potion :

| | |
|---------------------------------|-------|
| Carbonate d'ammoniaque. | 4 gr. |
| Eau de vie vieille | 10 — |
| Sirop d'éther | 20 — |
| Sirop de digitale. | 10 — |
| Infusion de mélisse | 80 — |

B. Chez le vieillard.

1° Appliquer 40 ventouses sèches en arrière de la poitrine.

Renouveler cette application tous les deux ou trois jours.

2° Toutes les deux heures, prendre une cuillerée à soupe de la potion suivante :

| | |
|-------------------------------|-------|
| ℥ Caféine | 1 gr. |
| Benzoate de soude. | 4 — |
| Sirop de digitale. | 20 — |
| Sirop de quinquina | 40 — |
| Hydrolat de mélisse | 60 — |

3° Le soir prendre un cachet contenant :

| | |
|-------------------------------|----------|
| ℥ Sulfate de quinine. | 0 gr. 20 |
| Poudre de Dover. | 0 — 30 |

4° Alimentation : lait et bouillon, jus de viande, Grog.

ASTHME (1).

A. Pendant l'accès.

1° Faire respirer fortement six à dix gouttes de *pyridine* versées sur un mouchoir.

(1) Pour prévenir l'accès, on peut, selon M. Laborde, essayer avec succès les *tractions rythmées*

Fumer dans une pipe le mélange suivant :

℥ Feuilles de datura }
 Feuilles de belladone . . . } àâ.

ou bien fumer une cigarette Espic.

2° Badigeonner les fosses nasales avec la solution suivante :

℥ Chlorhydrate de cocaïne . . . 1 gr.
 Eau distillée bouillie 10 —

3° Prendre toutes les dix minutes une cuillerée à soupe de la potion suivante :

℥ Sirop thébaïque 30 gr.
 Sirop de belladone 20 —
 Bromure de strontium 2 —
 Eau de laurier-cerise 10 —
 Hydrolat de tilleul 60 —

4° Si la crise persiste, faire une injection hypodermique à l'aide de la seringue de Pravaz avec la solution suivante :

℥ Chlorhydrate de morphine . . . 0 gr. 10
 Eau bouillie 10 —

de la langue pratiquées par le malade sur lui-même, tout au début, ou mieux encore au moment de l'avertissement prodromique habituel. — Les tractions linguales exécutées avec la main armée d'un linge, d'un mouchoir par exemple, de 18 à 20 fois par minute, en imitant, par un mouvement de va-et-vient, le rythme respiratoire, rétablissent celui-ci et peuvent faire avorter l'accès. Ces mêmes tractions, opérées alors par l'intervention d'un aide, peuvent également se montrer efficaces à la période asphyxique et cyanique de la crise.

B. En dehors des accès.

A. Chez les gouteux.

1° Prendre matin et soir, pendant vingt jours par mois, une cuillerée à café de la solution suivante :

℥ Iodure de strontium 5 gr.
 Teinture de lobélie 15 —
 Teinture d'opium 10 —
 Eau de tilleul 100 —

2° Toutes les semaines prendre un verre d'eau purgative de Montmirail.

3° Surveiller l'alimentation. Eviter les mets épicés ; ne pas manger de gibier, de charcuterie, ni de viandes faisandées.

Pas d'alcool ni de tabac.

4° Chaque année faire une saison à Royat.

B. Chez les herpétiques.

1° Pendant vingt jours par mois, prendre avant le principal repas une cuillerée à soupe de la solution suivante :

℥ Arséniate de soude 0 gr. 10
 Bromure de strontium 10 —
 Eau distillée 250 —

2° Couper la boisson, au moment des repas, avec de l'eau de la Bourboule.

3° Tous les matins prendre une douche froide ou bien faire des lotions froides sur