

Diète la veille.

2° Le matin, administrer un lavement simple pour débarrasser le tube digestif.

Puis prendre, en quatre fois, les vingt capsules suivantes, cinq capsules toutes les cinq minutes :

℥ Extrait éthéré de bourgeons  
frais de fougère mâle . . . 0 gr. 50  
Calomel. . . . . 0 — 05  
F. s. a. une capsule. N° 20.

3° Deux heures après la prise de ces capsules, prendre le purgatif :

Huile de ricin. . . . . 30 gr.

4° Aller à la selle dans un seau plein d'eau tiède ; ne pas tirer sur le ver.

Examiner le ver après son expulsion ; si la tête n'est pas rendue, une nouvelle intervention sera nécessaire *trois mois* plus tard.

A la seconde intervention :

1° Prendre le matin à jeun, en deux fois à un quart d'heure d'intervalle :

℥ Ecorce de racines fraîches de grenadier. . . . . 60 gr.

Faire macérer pendant vingt-quatre heures dans 300 grammes d'eau et aromatiser avec cinq gouttes d'essence de citron.

2° Lorsque les coliques se font sentir, prendre ;

℥ Eau-de-vie allemande . . 15 gr.  
Sirop de nerprun . . . . 30 —

b). *Chez l'enfant.*

1° La veille, diète lactée.

2° Le matin, à jeun, faire prendre à l'enfant :

℥ Semences de courges mon-  
dées . . . . . 60 gr.  
Looch blanc . . . . . 60 —

3° Une heure après, faire prendre une cuillerée d'huile de ricin.

Si cette médication ne réussit pas, intervenir de la façon suivante :

Ecorce de racines de grenadier. 50 gr.

Faire macérer vingt-quatre heures dans 100 grammes d'eau, passer et ajouter :

℥ Extrait éthéré de fougère  
mâle . . . . . 3 gr.  
Teinture de vanille. . . . 2 —  
Gomme arabique. . . . . 2 —  
Sirop de menthe . . . . . 25 —

A prendre en une fois.

4° Pour prévenir la reproduction du *tænia* et tuer les œufs, faire usage du *sulfate* ou du *phosphate de strontium*, aux doses de 2 à 4 grammes par jour, en cachet, avant le repas.

**B. Lombrics.**

Prendre, le matin à jeun, pendant trois



jours consécutifs, deux des paquets suivants, dans un peu de miel ou de confiture :

℥ Semen-contrà . . . . . 1 gr.  
Calomel . . . . . 0 — 10

Ou bien :

℥ Santonine . . . . . 0 gr. 10  
Calomel . . . . . 0 — 10  
Poudre de sucre . . . . . 0 — 20

Pour un paquet. N° 10.

Un paquet chaque jour pendant trois jours consécutifs.

### C. Oxyures

1° Donner, pendant trois jours consécutifs, quatre pastilles contenant :

Santonine . . . . . 0 gr. 02

2° En même temps, donner chaque jour un lavement dans lequel on aura fait infuser :

Feuilles d'absinthe . . . 10 gr.

3° Laver soigneusement chaque jour les parties anogénitales, surtout chez les petites filles.

4° Un bain salé toutes les semaines.

## HÉMORROÏDES

### A. Hémorroïdes flasques.

1° Régime alimentaire frugal, pas de mets

épicés, de gibier, de liqueurs. Eviter la constipation.

Vie active au grand air ; exercices modérés ; pas d'équitation ni de bicyclette. Eviter les excès sexuels.

Chaque matin, faire des lavages à l'eau froide de la région anale ; lotions sur tout le corps à l'eau alcoolisée, suivies d'une friction sèche.

2° Pendant quinze jours par mois, prendre aux deux principaux repas deux pilules contenant :

℥ Extrait sec d'hamamelis . . 0 gr. 05  
— de capsicum . . . . . 0 — 20

Miel . . . . . q. s.

F. s. a. une pilule. N° 50.

3° Aux repas, couper la boisson avec de l'eau de Miers.

### B. Hémorroïdes fluentes.

a). *Externes.*

1° Repos dans la position horizontale ; laver fréquemment la région avec de l'eau boriquée froide ; bains de siège.

2° Si la douleur est intense, faire des onctions sur les tumeurs avec la pommade suivante :

℥ Onguent populeum . . . . . 30 gr.  
Extrait de ratanhia . . . . . 1 —  
Extrait de belladone . . . . . 0 — 50  
Chlorhydrate de cocaïne . . . 0 — 20



3° Administrer chaque jour un lavement dans lequel on ajoutera deux cuillerées de miel.

4° Si l'hémorragie est trop forte, tamponner avec de l'ouate hydrophile imbibée de la solution suivante :

℥ Perchlorure de fer . . . . .	1 gr.
Glycérine . . . . .	50 —
Eau . . . . .	250 —

b). *Internes.*

1° Réduire les hémorroïdes procidentes à l'aide d'une éponge trempée dans l'eau froide.

2° Le soir, placer un suppositoire contenant :

℥ Beurre de cacao . . . . .	4 gr.
Extrait de ratanhia . . . . .	1 —
Extrait thébaïque . . . . .	0 — 05
Extrait de belladone . . . . .	0 — 01

F. s. a. un suppositoire. N° 5.

3° Si les hémorroïdes deviennent une gêne trop grande, intervenir chirurgicalement, soit par la *dilatation forcée*, soit par l'*extirpation*.

## MALADIES DU FOIE

### CONGESTION HÉPATIQUE

#### 1. — Congestion d'origine gastro-intestinale.

1° Administrer pendant deux jours consécutifs trois des paquets suivants, à prendre le matin, à une demi-heure d'intervalle, dans un peu de lait :

℥ Poudre de calomel . . . . .	0 gr. 30
Poudre de sucre . . . . .	0 — 20

Pour un paquet. N° 6.

2° Régime lacté absolu ; boire une tasse de lait toutes les deux heures, coupée par moitié avec de l'eau de Vichy (Grande-Grille).

3° En dehors des accès, manger peu et s'abstenir de toute alimentation excitante, pas de gibier, ni de viandes faisandées, pas de crustacés, ni de mollusques, peu d'épices, pas d'alcool.

Faire chaque année une cure à Vichy, à Miers ou à Carlsbad.