

3° Administrer chaque jour un lavement dans lequel on ajoutera deux cuillerées de miel.

4° Si l'hémorragie est trop forte, tamponner avec de l'ouate hydrophile imbibée de la solution suivante :

℥ Perchlorure de fer	1 gr.
Glycérine	50 —
Eau	250 —

b). *Internes.*

1° Réduire les hémorroïdes procidentes à l'aide d'une éponge trempée dans l'eau froide.

2° Le soir, placer un suppositoire contenant :

℥ Beurre de cacao	4 gr.
Extrait de ratanhia	1 —
Extrait thébaïque	0 — 05
Extrait de belladone	0 — 01

F. s. a. un suppositoire. N° 5.

3° Si les hémorroïdes deviennent une gêne trop grande, intervenir chirurgicalement, soit par la *dilatation forcée*, soit par l'*extirpation*.

MALADIES DU FOIE

CONGESTION HÉPATIQUE

1. — Congestion d'origine gastro-intestinale.

1° Administrer pendant deux jours consécutifs trois des paquets suivants, à prendre le matin, à une demi-heure d'intervalle, dans un peu de lait :

℥ Poudre de calomel	0 gr. 30
Poudre de sucre	0 — 20

Pour un paquet. N° 6.

2° Régime lacté absolu ; boire une tasse de lait toutes les deux heures, coupée par moitié avec de l'eau de Vichy (Grande-Grille).

3° En dehors des accès, manger peu et s'abstenir de toute alimentation excitante, pas de gibier, ni de viandes faisandées, pas de crustacés, ni de mollusques, peu d'épices, pas d'alcool.

Faire chaque année une cure à Vichy, à Miers ou à Carlsbad.

4° Chaque jour prendre, pendant huit jours consécutifs, au moment des deux principaux repas, un des cachets suivants :

℥ Salol	} à à 0 gr. 30
Benzonaphtol	
Salicylate de soude	

Pour un cachet. N° 16.

II. — Congestion d'origine cardiaque.

1° Régime lacté absolu.

2° Prendre, pendant quatre jours consécutifs, cinq des pilules suivantes :

℥ Poudre de scille	} à à 0 gr. 05
— de scammonée	
— de digitale	
Podophyllin	5 milligr.

Pour une pilule. N° 20.

3° Faire toutes les deux heures des frictions légères au niveau de la région hépatique avec le liniment suivant :

℥ Huile de jusquiame	80 gr.
Laudanum de Sydenham	10 —
Chloroforme	5 —

4° Appliquer deux *ventouses scarifiées* au niveau de l'hypochondre droit.

5° Administrer chaque jour un grand lavement d'eau fraîche.

INFECTIONS BILIAIRES

A. Ictères infectieux bénins.

1° Régime lacté absolu. Toutes les deux heures boire une tasse de lait écrémé que l'on coupera par moitié avec de l'eau de Vichy (source de l'Hôpital).

2° Prendre le matin, pendant trois jours consécutifs, trois des paquets suivants, à une demi-heure d'intervalle :

℥ Poudre de calomel	0 gr. 15
-------------------------------	----------

Pour un paquet. N° 10.

3° Dans l'après-midi, prendre toutes les heures une cuillerée à soupe de la potion suivante :

℥ Salicylate de soude	2 gr.
Benzonaphtol	1 —
Julep	120 —

4° Prendre chaque jour, pendant toute la durée de l'ictère, un grand bain tiède.

B. Ictères graves.

1° Administrer matin et soir un grand lavement froid (15°) d'une contenance d'un litre ; le conserver pendant une durée de cinq à dix minutes.

2° Toutes les deux heures, donner pendant toute la journée un cachet contenant :

℥ Salicylate de quinine . . 0 gr. 20
 Benzonaphtol 0 — 15
 Pour un cachet. N^o 20.

3^o Pratiquer matin et soir une injection hypodermique d'un centimètre cube avec la solution :

℥ Caféine 1 gr.
 Benzoate de soude 3 —
 Eau distillée 10 —

4^o Chaque jour, faire des injections hypodermiques de 10 centimètres cubes avec :

℥ Chlorure de sodium pur 6 gr.
 Phosphate de soude à à 0 — 50
 Sulfate de soude
 Eau bouillie 100 —

CIRRHOSSES

A. Période de début.

1^o Régime lacté mixte. Lait, œufs, viandes blanches grillées. Eviter les aliments gras et sucrés. Pas d'alcool, ni thé, ni café.

2^o Pendant trois jours par semaine, prendre tous les matins un paquet contenant :

Calomel 0 gr. 10

3^o Les quatre autres jours, prendre une cuillerée à soupe de la solution suivante :

℥ Iodure de strontium 10 gr.
 Eau distillée 250 —

4^o Faire tous les jours des onctions au niveau du foie avec :

Baume de Fioravanti 200 gr.

B. Période ascitique.

1^o Régime lacté absolu : une tasse de lait toutes les deux heures ; couper avec de l'eau de Vichy si l'estomac ne supportait pas ce traitement.

2^o Boire chaque jour deux grands verres de la tisane suivante :

℥ Nitrate de potasse } à à 5 gr.
 Acétate de potasse }
 Sirop des cinq racines 100 —
 Décoction de baies de
 genièvre 900 —

3^o Tous les huit jours, prendre le purgatif suivant, dans un pain azyme :

℥ Gomme-gutte } à à 0 gr. 10
 Calomel }
 Poudre de jalap 0 — 30

4^o Lorsque l'épanchement ascitique s'accroît, ponctionner à l'aide d'un appareil à aspiration ; laver soigneusement et aseptiquement la région abdominale, flamber le trocart et ponctionner vers le milieu d'une ligne qui irait de l'épine iliaque antérieure et supérieure à l'ombilic ; éviter les veines superficielles ; laisser écouler lentement le liquide et surveiller le cœur du malade ; s'il

y a tendance à la syncope, arrêter l'évacuation; fermer l'ouverture avec de la ouate et du collodion salolé.

Répéter les ponctions lorsque le liquide se reproduit.

LITHIASE BILIAIRE

A. Colique hépatique franche

1° Pratiquer une injection sous-cutanée de morphine avec la solution suivante :

℥ Chlorhydrate de morphine	0 gr. 10
Sulfate d'atropine	0 — 01
Eau distillée de laur.-cerise	10 —

Renouveler les piqûres toutes les demi-heures jusqu'à cessation complète de la douleur.

2° Toutes les demi-heures donner un verre à bordeaux d'huile d'olives pure, additionnée de jus de citron.

3° Frictionner la région hépatique avec une flanelle imbibée du liniment suivant :

℥ Huile de jusquiame	80 gr.
Chloroforme	} à 10 —
Laudanum de Sydenham	

4° Toutes les deux heures prendre une cuillerée à soupe de la potion suivante :

℥ Teinture de boldo	XX gouttes.
Valérianate d'amyle	0 gr. 80
Huile d'amandes douces	10 —
Gomme arabique pulvérisée	5 —
Sirop de coings	30 —
Eau distillée	90 —

5° Faire sucer de la glace et boire par gorgées du champagne.

B. Colique hépatique fruste et prolongée.

1° Prendre tous les matins, pendant quinze jours par mois, deux des paquets suivants dans un verre d'eau de Vichy (Grande-Grille) :

℥ Salicylate de soude	1 gr.
---------------------------------	-------

Pour un paquet, N° 10.

2° Le soir en se couchant, prendre une pilule contenant :

℥ Evonymine	0 gr. 03
Podophyllin	0 — 02
Extrait de jusquiame	0 — 01
Conserves de roses	q. s.

3° Les dix jours suivants, prendre tous les jours dix gouttes de :

Teinture de boldo	15 gr.
-----------------------------	--------

4° Chaque jour, prendre un grand bain d'une durée d'une heure.

C. En dehors des accès.

1° Vie au grand air, exercices physiques, marches, chasse, escrime. Pas de travail intellectuel forcé, ni de préoccupations morales.

Manger surtout des viandes blanches (poulet, lapin, agneau, veau) plutôt que des viandes rouges (bœuf, mouton) ou noires (gibier, pigeon, canard, oie); peu de charcuterie et de poissons gras.

Après le repas prendre une *infusion de feuilles de boldo*.

Eviter les aliments acides, surtout l'oseille et les tomates; les autres légumes verts sont permis (haricots verts, artichauts, asperges, salades); peu de sucre et de féculents; pas de graisses; peu d'œufs.

Boire, au repas, du vin coupé avec de l'eau d'Évian. Eviter les boissons gazeuses, l'alcool et les liqueurs. Promenade après les repas.

Tous les matins faire des lotions sur le corps avec de l'eau froide légèrement alcoolisée et frictionner ensuite au gant de crin.

2° Pendant dix jours tous les mois, prendre au moment du repas deux pilules de:

Valérianate d'amyle. 0 gr. 20

3° Maintenir la laxité du ventre et prendre pendant dix jours consécutifs par

mois, au repas, un verre à bordeaux d'eau de Miers.

4° Tous les ans, faire une saison à Vichy, à Miers ou à Carlsbad.

Cure de raisin et de petit-lait.

MALADIES DU PÉRITOINE

PERITONITES AIGUES

A. Péritonite simple.

1° Appliquer quatre ventouses scarifiées au niveau de la région la plus douloureuse.

2° Faire, plusieurs fois dans la journée, des frictions légères avec le liniment suivant :

℥ Huile de jusquiame	80 gr.
Laudanum de Sydenham {	ââ 10 —
Chloroforme	}

3° Maintenir sur le ventre une vessie de glace légèrement suspendue et séparée de la paroi abdominale par une flanelle mouillée.

4° Toutes les deux heures, prendre un cachet contenant :

℥ Benzonaphtol	0 gr. 15
Poudre d'opium brut.	0 — 01

5° Pratiquer dans le flanc une injection

sous-cutanée de 10 cc. de la solution suivante :

℥ Chlorure de sodium	6 gr.
Phosphate de soude	} ââ 0 — 50
Sulfate de soude	
Eau distillée stérilisée.	100 —

6° Diète lactée. Boissons glacées. Champagne.

B. Péritonite par perforation

1° Diète absolue. Sucrer de petits morceaux de glace.

2° Prendre toutes les heures une pilule de :

℥ Extrait d'opium	0 gr. 02
-----------------------------	----------

Pour une pilule, N° 20.

3° Intervenir chirurgicalement par la laparotomie ; rechercher la perforation, faire la suture intestinale, laver la cavité abdominale avec de l'eau bouillie et drainer.

PERITONITE TUBERCULEUSE

A. Forme aiguë.

1° Faire des onctions sur l'abdomen, matin et soir, avec la pommade suivante :

℥ Axonge benzoïnée	40 gr.
Laudanum de Sydenham.	4 —
Chloroforme	3 —
Extrait de belladone	2 —
Extrait de ciguë	1 —

2° Maintenir sur le ventre une vessie de glace.

3° Tous les deux jours, faire dans le flanc une injection hypodermique de 2 centimètre cubes avec :

℥ Gaïacol	5 gr.
Eucalyptol	10 —
Huile d'olives stérilisée.	100 c.c.

4° Régime lacté. Boire toutes les deux heures une tasse de lait.

B. Forme chronique.

1° Alimenter le malade avec du lait, des crèmes, des purées de viande.

Donner deux cuillerées à soupe par jour de *sirop iodo-tannique phosphaté*.

2° Deux fois par semaine, faire dans le flanc une injection hypodermique de 2 centimètres cubes avec :

℥ Gaïacol	5 gr.
Eucalyptol	10 —
Huiles d'olives stérilisée	100 c.c.

3° Tous les deux jours, faire également une injection hypodermique de 5 centimètres cubes avec du *sérum de sang de chien ou d'âne immunisé*.

4° Si l'ascite est trop considérable et détermine de la dyspnée, pratiquer une ponction à l'aide de l'appareil Dieulafoy.

Si une amélioration ne survient pas, et s'il n'y a pas généralisation de la tuberculose dans les poumons, pratiquer la *laparotomie* et faire un lavage avec de l'eau bouillie.