

compresse de tarlatane recouverte de taffetas gommé, de *salicylate de méthyle* au niveau des régions endolories, ou encore pratiquer des injections hypodermiques avec cette solution.

#### B. Rhumatisme cérébral.

1° Toutes les deux heures un bain froid à 20°, d'une durée de dix minutes à un quart d'heure.

2° Pratiquer chaque jour une injection hypodermique d'un centimètre cube de :

Salicylate de méthyle. . . 20 gr.

3° Si l'agitation est trop violente, donner toutes les heures une cuillerée à soupe de la potion suivante :

℥ Bromure de strontium. . . 4 gr.  
Sirop de chloral. . . . . 40 —  
Sirop de quinquina . . . . 40 —  
Eau de menthe . . . . . 40 —

4° S'il y a tendance au coma, pratiquer toutes les heures une injection hypodermique d'un centimètre cube avec :

℥ Sulfate de spartéine. . . 0 gr. 10  
Caféine. . . . . 1 —  
Benzoate de soude. . . . . 3 —  
Eau bouillie . . . . . 10 cent. cubes.

#### C. Rhumatisme subaigu.

1° Prendre chaque jour, le matin, dans

un verre d'eau de Royat, une cuillerée à café de :

Salicylate de lithine effervescent.

2° Badigeonner les articulations douloureuses avec de la *teinture d'iode* et recouvrir avec une bande de flanelle.

Si le gonflement articulaire persiste, toutes les semaines pratiquer des *pointes de feu* au niveau des jointures malades.

3° Prendre une cuillerée chaque jour de la solution suivante :

℥ Arséniate de soude. . . . . 0 gr 10  
Iodure de potassium . . . . . 10 —  
Eau distillée. . . . . 300 —

#### Convalescence.

1° Après la cessation des douleurs articulaires, continuer l'usage du salicylate de soude, durant dix jours au moins en diminuant progressivement la dose du médicament, de quatre à un cachet par jour de :

℥ Salicylate de soude. . . . . 0 gr. 50  
Pour un cachet. N° 10.

2° Au moment de chaque repas, prendre un granule de :

℥ Arséniate de fer. . . . . 1 milligr.  
N° 50.

3° Prendre deux fois par semaine une *fumigation* ou un *bain sulfureux*. Massages des articulations.

Tous les ans faire une saison à Aix, Barèges ou Bourbonne.

### IMPALUDISME

#### I. — Fièvre intermittente simple.

1° Deux heures avant l'accès, prendre, à une demi-heure d'intervalle, trois à quatre des cachets suivants :

℞ Chlorhydro-sulfate de quinine. 30 centigr.  
Pour un cachet. N° 20.

2° S'il y a embarras gastrique, prendre en trois fois, à dix minutes d'intervalle, le vomitif suivant, dans un verre d'eau sucrée.

℞ Poudre d'ipéca. . . 1 gr. 50  
Tartre stibié. . . 0 — 05

3° Continuer l'usage des cachets de quinine jusqu'à la cessation complète des accès fébriles.

Suspendre pendant trois jours, puis pendant trois autres jours donner, aux mêmes heures, deux des cachets précédemment prescrits.

Continuer ainsi, pendant un mois, trois jours de traitement quinqué et trois jours de repos.

4° Pendant les jours de repos quinqué,

prendre, au moment des deux principaux repas, deux granules de :

Arséniate de fer. . . 1 milligr.

5° Alimentation : Pendant toute la période fébrile, lait, limonade citrique, champagne, infusion de feuilles d'eucalyptus.

#### II. — Accès pernicieux.

1° Pratiquer, toutes les heures, jusqu'à abaissement de la température, une injection hypodermique d'un centimètre cube avec la solution suivante :

℞ Sulfate de spartéine. . . . . 0 gr. 05  
Chlorhydro-sulfate de quinine . . . . . 5 —  
Eau bouillie . . . . . 10 cc<sup>3</sup>.

2° Faire des frictions vigoureuses sur le corps avec du *baume de Fioravanti*.

3° Boissons chaudes. Grogg ; thé au rhum ; champagne.

4° Si l'agitation est trop violente, administrer le lavement suivant :

℞ Hydrate de chloral . . . . . 4 gr.  
Bromure de strontium. . . . . 5 —  
Laudanum Sydenham. . . . . X gouttes.  
Eau. . . . . 250 gr.

#### III. — Impaludisme chronique.

1° Prendre chaque jour, trois fois par jour, au moment du repas, deux des pilules suivantes :

℥ Arséniate de fer. . . . . 2 milligr.  
 Extrait de quinquina. . . . . 0 gr. 10  
 Excipient . . . . . q. s.  
 F. s. a. une pilule. N° 20.

2° Tous les matins, faire sur le corps des lotions à l'eau alcoolisée, suivies d'une vigoureuse friction au gant de crin.

3° Tous les ans faire une saison à la Bourboule ou Vichy.

#### IV. — Prophylaxie.

Éviter d'habiter ou de traverser les pays marécageux, s'éloigner des bassins ou des canaux que l'on nettoie. Si l'on ne peut se soustraire à habiter des régions à fièvres, prendre une alimentation fortifiante et boire après chaque repas une *infusion d'écorce de quinquina et de feuilles d'eucalyptus*.

Enduire, matin et soir, les narines avec la pommade suivante :

℥ Résorcine . . . . . 0 gr. 50  
 Vaseline. . . . . 30 —

Se rincer la bouche plusieurs fois dans la journée avec la solution suivante, dont on versera quelques gouttes dans un verre d'eau.

℥ Menthol. . . . . 4 gr.  
 Acide phénique . . . . . 10 —  
 Teinture d'eucalyptus. . . . . 100 —

Assainir les marécages par des plantations d'eucalyptus et le drainage du sol.

Se garer des moustiques qui peut-être inoculent le germe, faire évaporer de l'essence de térébenthine ou griller du café dans les chambres habitées et s'oindre les parties découvertes du corps avec de l'*huile phéniquée* ou *mentholée*.

### SYPHILIS

#### I. — Chancre induré.

1° Laver l'ulcération plusieurs fois dans la journée avec la solution suivante :

℥ Sublimé. . . . . 1 gr.  
 Alcool à 90° . . . . . 100 —  
 Eau distillée. . . . . 900 —

2° Saupoudrer ensuite avec une pincée de :

Salol. . . . . 30 gr.

3° Recouvrir avec une très légère couche de ouate hydrophile.

4° S'abstenir de tout rapport sexuel et de toute excitation génitale.

Nourriture substantielle, mais non excitante, s'abstenir d'alcool.

Un bain simple tous les deux jours.

#### II. — Accidents secondaires.

1° Pendant trois mois consécutifs, pren-

dre vingt jours chaque mois une pilule à chaque repas (trois chez l'homme, deux chez la femme) de :

℥ Protoiodure d'hydrargyre. . . . .	0 gr. 03
Extrait de gentiane . . . . .	0 — 05
— de ratanhia . . . . .	0 — 04
— de thébaïque. . . . .	0 — 01

F. s. a. une pilule. N° 100.

Se reposer de ce traitement pendant un mois ; puis le reprendre pendant deux mois consécutifs, interrompre un mois et reprendre ainsi jusqu'à la fin de la première année de maladie, deux mois de traitement et un mois de repos.

Durant la seconde année, suivre le même traitement pendant un mois à chaque changement de saison.

2° Se rincer la bouche deux fois par jour avec la solution suivante et boire ensuite une gorgée de cette même solution :

℥ Chlorate de potasse. . . . .	30 gr.
Eau. . . . .	1 litre.

3° S'il survient des plaques muqueuses dans la bouche, toucher légèrement tous les quatre jours, jusqu'à disparition, avec un *crayon de nitrate d'argent*.

4° Alimentation fortifiante ; pas d'excès ni de surmenage physique ou intellectuel. Vie au grand air. Deux bains simples par semaine.

### III. — Accidents oculaires ; — sarcocèle ; — périostites ; — syphilides ulcéreuses.

1° Deux fois par jour, au moment du repas, prendre une cuillerée à soupe de la solution suivante :

℥ Sublimé . . . . .	0 gr. 20
Iodure de potassium. . . . .	20 —
Sirop de quinquina. . . . .	50 —
Eau. . . . .	450 —
Alcool. . . . .	q. s.

2° Appliquer un *emplâtre de Vigo* au niveau des syphilides.

3° Faire une saison à Luchon ou Cauterets.

### IV. — Accidents tertiaires.

1° Prendre de une à trois cuillerées à soupe de la solution suivante, au moment du repas, dans du lait ou de l'eau anisée :

℥ Iodure de potassium. . . . .	20 gr.
Eau distillée . . . . .	250 —

2° Un bain sulfureux par semaine.

### V. — Syphilis cérébrale.

1° Pratiquer chaque jour au niveau des plis articulaires des frictions avec gros comme une noisette de la pommade suivante :

℥ Onguent napolitain. . . . .	30 gr.
Extrait de belladone . . . . .	3 —

2° Faire prendre, dans du lait, trois à cinq cuillerées à soupe par jour de :

℥ Iodure de potassium . . . . .	20 gr.
Sirop d'écorces d'oranges . . . . .	50 —
Eau . . . . .	200 —

#### VI. — Syphilis infantile.

1° Pendant la grossesse, faire prendre à la mère pendant dix jours par mois une pilule de :

℥ Biiodure d'hydrargyre . . . . .	0 gr. 02
Extrait de gentiane . . . . .	0 — 05
Extrait thébaïque . . . . .	0 — 01

F. s. a. une pilule, n° 50

2° A la naissance de l'enfant, si celui-ci présente des marques de syphilis, faire chaque jour une friction au niveau des plis articulaires en changeant chaque jour de place, avec gros comme un pois de la pommade suivante :

Onguent napolitain . . . . . 30 gr.

3° A l'âge de trois mois, donner chaque jour à l'enfant, en deux fois, une cuillerée à café de :

℥ Biiodure d'hydrargyre . . . . .	0 gr. 10
Iodure de potassium . . . . .	10 —
Sirop de quinquina . . . . .	300 —

4° Ne pas faire allaiter l'enfant par une nourrice ; la mère peut donner le sein sans inconvénient ; ou bien élever l'enfant au biberon.

### CHANCRE MOU

#### A. Chancre simple.

1° Pendant deux ou trois jours consécutifs, toucher, le matin, l'ulcération avec un tampon d'ouate hydrophile imbibé de la solution suivante :

℥ Menthol . . . . .	0 gr. 20
Acide phénique . . . . .	1 —
Alcool à 90° . . . . .	15 —

2° Saupoudrer ensuite avec une pincée d'*aristol* et recouvrir avec une mince couche d'ouate hydrophile sèche.

*Aristol* . . . . . 10 gr.

3° Laver plusieurs fois dans la journée avec de l'*eau boriquée* et renouveler aussitôt après le pansement avec la poudre d'*aristol*.

4° Éviter toute fatigue et tout frottement au niveau de l'ulcération.

Alimentation substantielle et tonique.

#### B. Chancre phagédénique.

1° Toucher l'ulcération dans toutes ses parties avec la solution suivante :

℥ Chlorhydrate de cocaïne . . . . .	1 gr.
Tartrate ferrico-potassique . . . . .	15 —
Eau distillée . . . . .	100 —

2° Saupoudrer ensuite avec :

℥ Iodoforme . . . . . 20 gr.  
Menthol . . . . . 0 — 50

3° Prendre à chaque repas une des pilules suivantes :

℥ Tartrate ferrico-potassique. . . . . 0 gr. 15  
Extrait de quinquina. . . . . } àà 0 — 10  
Extrait de gentiane. . . . . }  
F. s. a. une pilule. N° 50 .

#### C. Bubon.

1° Repos à la chambre ou au lit.

2° Appliquer au niveau de la grosseur la pommade suivante :

℥ Onguent napolitain. . . . . 30 gr.  
Extrait de belladone . . . . . 3 —

3° S'il y a de la fluctuation, inciser perpendiculairement au pli de l'aîne, laver avec une solution de sublimé au 1/2000 ; insuffler dans la plaie de la poudre d'iodoforme ; panser avec de la gaze iodoformée et de l'ouate, et comprimer avec des bandes de toile. Renouveler le pansement tous les deux jours.

### BLENNORRHAGIE

#### I. — Début. Traitement abortif.

1° Pratiquer dès les premières heures de l'écoulement une injection uréthrale avec

la solution suivante ; comprimer le méat et laisser séjourner le liquide cinq minutes :

℥ Nitrate d'argent. . . . . 0 gr. 50  
Eau distillée . . . . . 25 —  
Laudanum de Sydenham V gouttes

#### II. — Période d'état.

1° Prendre un bain simple tous les deux jours.

2° Trois fois par jour, au moment du repas, prendre un cachet contenant :

℥ Benzoate de soude. . . . . 0 gr. 50  
Salol. . . . . 1 —  
Pour un cachet. N° 40.

3° Laver la verge plusieurs fois dans la journée avec une solution de *sublimé* au 2/1000.

Recouvrir ensuite le gland avec une légère couche d'*ouate hydrophile* sèche que le prépuce suffira à maintenir en place.

4° Boire abondamment ; couper le vin au repas avec de l'eau de Vals. Pas de mets épicés, ni asperges, ni tomates ; pas de vin pur, ni de liqueurs, pas de bière.

Éviter les fatigues, les marches et s'abstenir de tout rapport sexuel.

Porter un suspensoir.

Se laver soigneusement les mains chaque fois que l'on aura touché la verge ; éviter

surtout de porter au contact des yeux les doigts ou les linges souillés.

5° Si les érections nocturnes sont trop fréquentes et douloureuses, prendre le soir deux pilules de :

℥ Bromure de camphre	0 gr. 40
Extrait thébaïque . . .	0 — 01
Conserves de roses. . .	q. s.

Pour une pilule. N° 20.

### III. — Période de décroissance.

1° Au bout de trois semaines environ, lorsque l'écoulement est moins verdâtre, que le pus est filant, faire trois fois par jour des injections uréthrales de vingt centimètres cubes à canal ouvert, après avoir préalablement uriné, avec la solution suivante :

℥ Permanganate de potasse.	0 gr. 50
Eau bouillie. . . . .	1 litre.

2° Prendre trois fois par jour, au moment du repas, quatre capsules de :

℥ Essence de santal . . . . .	0 gr. 30
F s. à. une capsule, n° 50.	

3° Continuer ce traitement pendant quinze jours, suspendre ensuite pendant quatre jours.

Si l'écoulement persiste ou si l'urine contient des filaments avec des gouttelettes de

pus, faire matin et soir une injection chaude avec :

℥ Liqueur de Van Swieten. . .	50 gr.
Eau bouillie . . . . .	100 —

### IV. — Blennorrhagie chronique.

1° Reconnaître avec une bougie à boule le point malade de l'urèthre postérieur ; instiller à ce niveau, à l'aide d'une seringue graduée, quinze gouttes de la solution :

℥ Nitrate d'argent . . . . .	1 gr.
Eau distillée. . . . .	30 —

2° Répéter ces instillations tous les trois jours et ne pas s'effrayer de la recrudescence momentanée de l'écoulement.

3° Si l'affection résiste à ce traitement, pratiquer la dilatation du canal de l'urèthre à l'aide des sondes Béniqué.

4° Régime fortifiant. Douches.

### V. — Blennorrhagie chez la femme. Vaginite.

1° Faire trois injections vaginales par jour avec la solution suivante, un paquet par litre d'eau bouillie :

℥ Sublimé . . . . .	0 gr. 50
Acide tartrique . . . . .	1 —
Indigo . . . . .	q. s.

Pour un paquet, n° 30.

2° Insuffler ensuite une pincée de la poudre suivante :

℥ Alun . . . . .	30 gr.
Tanin . . . . .	20 —

3° Le soir, placer dans le vagin un *ovule à la glycérine solidifiée* contenant :

℥ Résorcine . . . . .	1 gr.
Glycérine pure solidifiée.	q. s.
F. s. a. un ovule. N° 10.	

## COMPLICATIONS DE LA BLENNORRHAGIE

### I. — Orchite blennorrhagique.

1° Pendant toute la période inflammatoire, *repos au lit*, les bourses soutenues par une planchette ou un carton échancré reposant sur les cuisses.

2° Tenir constamment appliquées sur les bourses des *compresses humides froides* et enduire au préalable avec le liniment suivant :

℥ Salicylate de méthyle . .	40 gr.
Huile de jusquiame . . .	60 —
Extrait thébaïque . . .	} aa 2 —
Extrait de belladone . .	

3° Dès le troisième ou cinquième jour, appliquer un *pansement compressif ouaté*. Envelopper les bourses sous une épaisse

couche d'ouate simple et comprimer fortement à l'aide de bandes; le testicule ne doit pas être sensible au doigt qui percute sur le bandage.

4° Alimentation habituelle. Boire abondamment du lait.

Maintenir la régularité des selles par de légers purgatifs.

### II. — Arthrite blennorrhagique.

1° Faire des onctions sur l'articulation malade avec le liniment suivant :

℥ Salicylate de méthyle . .	40 gr.
Extrait thébaïque . . .	} aa 2 —
— de jusquiame . . .	
— de belladone . . .	
Glycérine . . . . .	60 —

2° Immobiliser dans un *appareil plâtré* ou *silicaté*.

3° Lorsque toute inflammation a disparu, pratiquer des massages méthodiques de l'articulation et prendre chaque jour une *douche sulfureuse*.

4° Faire une saison à Aix (en Savoie).

### III. — Conjonctivite blennorrhagique.

1° Pratiquer toutes les deux heures de grands lavages (un litre) avec la solution suivante :



℥ Permanganate de potasse. 0 gr. 30  
Pour un paquet. N° 20.  
Un paquet par litre d'eau bouillie.

2° Matin et soir, toucher la conjonctive —  
la paupière étant retournée — avec un pin-  
ceau imbibé de la solution suivante :

℥ Nitrate d'argent. . . . 1 gr.  
Eau distillée de roses. . . 30 —

## MALADIES DE LA NUTRITION

---

### DIABÈTES

#### I. — Glycosurie simple.

1° Suivre rigoureusement l'hygiène ali-  
mentaire suivante :

Potage : bouillon gras et soupes maigres  
aux choux, à l'oignon, aux poireaux et  
pommes de terre. Ces potages seront pris  
sans pain et sans pâtes alimentaires.

Insister sur les aliments gras, conserves  
(sardines à l'huile, thon à l'huile), etc.; foies  
gras, rillettes, gras de jambon, charcuterie,  
beurre, etc.

Toutes les viandes sont permises : viandes  
de boucherie, gibiers, volaille. Poissons ;  
crustacés et mollusques.

Pas de sauces.

Oufs.

Légumes verts permis : choux, choux-  
fleurs, choux-de-Bruxelles, épinards, laitue,  
chicorée, pissenlit, artichauts, haricots verts,