

MALADIES DE LA PEAU

I. — AFFECTIONS PARASITAIRES

A. Affections cutanées produites par des parasites animaux.

GALE

1° Faire pendant vingt minutes des lotions chaudes sur tout le corps avec du savon de toilette et frictionner avec une brosse au niveau des points malades.

2° Prendre aussitôt après un bain de son d'une durée d'une demi-heure et continuer les frictions dans le bain.

3° Appliquer ensuite, en frictionnant avec la brosse, la pommade suivante qu'on laissera pendant vingt-quatre heures au niveau des lésions :

℥	Glycérine	200 gr.
	Fleur de soufre.	100 —
	Carbonate de soude.	50 —
	Gomme adragante.	1 —
	Essence de menthe.	q. s.

4° Le lendemain et les jours suivants,

prendre un bain de son, et poudrer ensuite le corps avec de l'amidon.

5° Changer de vêtements qu'on fera passer à l'étuve.

Chez l'enfant et la femme à peau délicate.

1° Le matin donner un bain de son.

2° Faire matin et soir des frictions au niveau des points malades avec la pommade suivante :

℥	Huile de camomille.	100 gr.
	Onguent styrax.	25 —
	Baume du Pérou.	5 —
	Essence de menthe.	1 —

M. s. a.

PHTIRIASE

A. — Poux de la tête.

1° Chez l'enfant, couper les cheveux ras et savonner la tête tous les jours avec du savon au goudron.

2° Chez l'adulte ou les fillettes, si les cheveux doivent être conservés, savonner la tête avec une décoction de bois de Panama, puis lotionner matin et soir avec la solution suivante :

℥	Sublimé.	1 gr.
	Vinaigre antiseptique	500 —

3° Passer chaque jour les cheveux au

peigne fin en trempant celui-ci dans le vinaigre.

Saupoudrer la tête avec de la *poudre de staphysaigre*.

B. — *Poux du pubis* (morpions).

Savonner la région, puis frictionner avec de l'*onguent gris* ; deux heures après prendre un bain de son.

Répéter ce traitement pendant trois jours consécutifs.

Ou bien :

Laver matin et soir avec la solution suivante :

∓ Sublimé 1 gr.
Vinaigre antiseptique 300 —

B. Affections cutanées produites par des champignons parasites.

TRICOPHYTIE

a). **Tricophytie du cuir chevelu** (*teigne tondante*).

1° Couper les cheveux ras et épiler, avec la pince, tous les huit jours, sur une étendue de un centimètre au pourtour de toutes les plaques atteintes.

2° Laver chaque jour la tête au savon de goudron et faire une lotion avec la solution suivante :

Liquueur de van Swieten 500 gr.

3° Enduire ensuite chaque plaque avec la préparation suivante :

∓ Acide salicylique 0 gr. 50
Alcool à 90° 1 —
Ether sulfurique 5 —
Fleur de soufre 10 —
Collodion élastique 40 —

4° Maintenir la tête recouverte d'un bonnet et éviter la contagion par les échanges de coiffures, la communauté des divers objets de toilette et de literie.

b). **Tricophytie de la barbe** (*sycosis trycophytique*).

1° Couper les poils ras avec des ciseaux, et avoir soin après chaque tonte de flamber l'instrument.

2° Savonner matin et soir les parties malades avec du savon naphtolé puis appliquer de la *teinture d'iode*.

3° Si les poils sont atteints, pratiquer l'épilation puis appliquer la pommade suivante, après avoir lotionné avec une solution de liqueur de van Swieten :

∓ Fleur de soufre 4 gr.
Camphre 1 —
Vaseline 30 —

FAVUS

TEIGNE FAVEUSE

1° Couper les cheveux ras et appliquer

des cataplasmes de fécule jusqu'à ce que les croûtes soient tombées.

2° Epiler la plaque malade et le pourtour sur une étendue d'un centimètre. Pratiquer cette opération en plusieurs fois.

Renouveler l'épilation quand les cheveux ont repoussé et tant que le cuir chevelu reste rouge et le cheveu malade.

3° Appliquer au niveau des plaques la pommade suivante après avoir lavé avec de l'eau oxygénée.

℥ Turbith minéral 1 gr.
Axonge 50 —

4° Relever l'état général et faire prendre à cet effet deux cuillerées à soupe par jour de :

℥ Sirop d'iodure de fer. . . }
Sirop de glycéro-phosphate de chaux . . . } àâ 250 gr.
Alcoolature de zestes d'oranges 5 —

PELADE

1° Raser chaque plaque peladique et son pourtour sur une étendue d'un centimètre ; si les plaques sont multiples raser toute la tête.

Renouveler la rasage deux ou trois fois par semaine.

2° Pratiquer chaque jour des savonnages de la tête avec le savon au goudron.

3° Frictionner ensuite les plaques avec le mélange révulsif suivant :

℥ Chloroforme 15 gr.
Alcoolat de Fioravanti . . . }
Teinture de cantharide . . . } àâ 5 —
Teinture d'iode }
Acide acétique cristallisable 5 —

M. s. a.

4° Le soir frictionner tout le cuir chevelu avec la pommade suivante :

℥ Acide salicylique } àâ 1 gr.
Résorcine }
Soufre précipité 10 —
Vaseline 100 —

5° Plus tard, lorsque les poils reparaissent, modérer la révulsion, et faire les frictions avec :

℥ Alcoolat de Fioravanti 100 gr.
Teinture de pyrèthre } àâ 10 —
Teinture de quinquina }
Huile de ricin 10 —

6° Le soir, appliquer sur les parties malades la pommade suivante :

℥ Huile de bouleau 10 gr.
Soufre } àâ 2 —
Turbith minéral }
Vaseline 90 —

M. s. a.

7° Traiter l'état général : si le sujet est nerveux, ordonner une douche froide tous les jours ; s'il y a dépression nerveuse, prendre au moment du repas un granule d'un milligramme d'*arséniate de strychnine*.

8° *Prophylaxie*.— Isoler le malade dans la mesure du possible.

9° Eviter le changement de coiffure et la communauté des objets qui auraient été en contact avec les parties malades.

Maintenir les précautions prophylactiques pendant au moins deux mois après la guérison.

PITYRIASIS VERSICOLOR

1° Matin et soir laver les points malades avec de l'eau chaude et du savon noir.

2° Lotionner ensuite avec la solution suivante :

∓ Sublimé. 1 gr.
Vinaigre antiseptique. 500 —

3° Désinfecter les vêtements et si des récidives se produisent faire une saison à Bagnères, Cauterets ou Luchon.

C. Affections cutanées produites par des parasites microbiens.

TUBERCULOSE CUTANÉE

Traitement général.

1° Chaque jour, prendre de une à trois cuillerées à soupe et plus s'il est possible, d'*huile de foie de morue*.

2° Au moment de chaque repas, prendre une cuillerée à soupe de la préparation suivante :

∓ Arséniate de soude. 0 gr. 10
Glycéro-phosphate de chaux. 20 —
Sirop iodo-tannique. 500 —

3° Faire tous les ans une saison, soit à Salins ou Salies-de-Béarn, soit à Chelles ou Bagnères.

Traitement local.

a) Gommés tuberculeuses et ulcérations tuberculeuses de la peau.

1° Si la gomme est au début, tenter la résolution en appliquant chaque jour la pommade suivante :

∓ Iodure de potassium . . . 4 gr.
Extrait de ciguë 1 —
Axonge benzoïnée 30 —

2° Lorsque la gomme se ramollit, faire

dans l'intérieur de la poche des injections d'*ether iodoformé*.

3° Lorsque la peau menace de s'ulcérer, ouvrir au bistouri et toucher la surface, après avoir bien lavé antiseptiquement, avec la solution suivante et renouveler ces cautérisations tous les deux jours :

℥ Chlorure de zinc 1 gr.
Eau distillée 50 —

4° Panser ensuite avec de la *poudre d'iodoforme*.

b) **Tuberculose verruqueuse.**

1° Détruire la lésion en pratiquant des pointes de feu très rapprochées les unes des autres à l'aide du thermo-cautère ou du galvano-cautère.

Si la lésion est trop étendue, pratiquer le raclage avec la curette tranchante.

2° Après la cautérisation ou le raclage, appliquer pendant les deux ou trois jours qui suivent des pansements humides à l'eau boriquée.

Puis pansements secs avec la *poudre d'iodoforme* ou de *salol*.

LUPUS

1° Pratiquer tous les huit jours des cautérisations d'une partie circonscrite de la lésion en dépassant les tissus malades, à

l'aide de piqûres profondes très rapprochées avec la pointe du galvano-cautère.

Ou bien, pour éviter les cicatrices défectueuses, pratiquer des *scarifications linéaires quadrillées* à l'aide du scarificateur de Vidal.

2° Appliquer ensuite des pansements humides à l'eau boriquée, puis lorsque l'inflammation a disparu recouvrir avec un *emplâtre de Vigo*.

IMPÉTIGO

1° Pendant la période inflammatoire du début appliquer tous les soirs un cataplasme d'amidon.

2° Le matin, laver avec une *infusion de fleurs de sureau* à laquelle on ajoutera par tasse une pincée d'*acide borique*.

3° Saupoudrer ensuite avec :

℥ Acide borique 5 gr.
Poudre de talc 10 —
Poudre d'amidon 25 —

4° Lorsque les croûtes seront tombées, appliquer la pommade suivante, en l'étendant sur de la tarlatane :

℥ Acide salicylique 0 gr. 30
Oxyde de zinc 3 —
Vaseline 30 —

5° Relever l'état général et faire prendre tous les jours une cuillerée d'huile de foie de morue ou une cuillerée à soupe du sirop suivant :

℥ Sirop d'iodure de fer.	} àà 250 gr.
Sirop de glycéro-phosphate de chaux	
Alcoolature de zestes d'oranges.	5 —

6° Soins minutieux de propreté. Eviter la contagion par le contact direct.

ECTHYMA ET RUPIA

1° Alimentation substantielle et fortifiante. Donner aux enfants du *sirop d'iodure de fer* et du *sirop de quinquina*.

2° Pendant la période pustuleuse éviter les grattages, laver à l'eau boriquée et saupoudrer avec :

℥ Salol	5 gr.
Poudre d'amidon.	45 —

3° Laver les ulcérations avec la liqueur de van Swieten, puis appliquer la pommade suivante :

℥ Tanin.	4 gr.
Vaseline.	30 —

II. — DIFFORMITÉS CUTANÉES

ICHTYOSE

1° Prendre deux fois par semaine un bain d'amidon ou de glycérine d'une durée d'une heure.

2° Le soir faire une onction sur les parties malades avec la préparation suivante ;

℥ Acide salicylique	} àà 1 gr.
Acide tartrique	
Glycérolé d'amidon	30 —

3° Pendant quatre jours par semaine, prendre le soir en se couchant une tasse d'*infusion de jaborandi* dans laquelle on ajoutera cinq à dix gouttes de liqueur de Fowler.

LENTIGO

1° Éviter l'exposition au soleil. Sortir avec des chapeaux à larges bords et munis de voilettes épaisses.

2° Tous les matins lotionner les parties atteintes avec une solution de sublimé à 1/500.

3° Dans la journée appliquer le fard suivant :

℥ Carbonate de magnésie	4 gr.
Glycérine.	4 —
Kaolin	4 —
Vaseline	10 —

III. — AFFECTIONS CUTANÉES DE
CAUSES INDÉTERMINÉES

ÉRYTHÈMES

1° Repos à la chambre. Diète lactée.
Couper le lait avec de l'eau de Vals (Perle
n° 5).

2° Prendre le purgatif suivant, le matin
à jeun :

℥ Sulfate de soude. . . { àà 25 gr.
Sulfate de magnésie }

3° Faire des lotions sur le corps matin et
soir avec de l'eau de guimauve ou de
sureau ; s'il y a des démangeaisons ajouter
par tasse de décoction une cuillerée à soupe
de la solution suivante :

℥ Menthol. 0 gr. 50
Hydrate de chloral. . . 5 —
Alcool. q. s.
Eau. 500 gr.

4° Poudrer ensuite avec de l'amidon ou
avec le mélange :

℥ Acide salicylique 1 gr.
Oxyde de zinc. 10 —
Poudre de talc. 40 —

5° S'il y a suintement, lotionner avec un
décoction de feuilles de noyer, étendre la
pommade suivante, puis envelopper de
ouate :

℥ Acide salicylique 1 gr.
Oxyde de zinc 2 —
Glycérolé d'amidon. . . 30 —

6° S'il y avait un peu de fièvre, faire
prendre matin et soir un cachet contenant :

℥ Salicylate de quinine. . 0 gr. 20
Pour un cachet. N° 4.

PRURIT ET PRURIGO

1° Surveiller l'alimentation, ne pas man-
ger de charcuterie, de poissons et de
coquillages ; pas de crustacés ni de conser-
ves ; pas de gibier ni de truffes ; pas de
fromages salés et fermentés ; pas d'épices ;
pas de tomates ni d'oseille, ni choux, pas
de fraises.

Ne manger que des viandes blanches
rôties et grillées, des légumes verts cuits et
des fruits cuits.

Eviter de prendre du thé, du café et des
liqueurs alcooliques. Couper la boisson
(vin rouge) avec de l'eau de Vals, ou bien
boire du lait.

Maintenir la régularité des garde-robes.

Eviter les émotions vives, les préoccupa-
tions morales et intellectuelles, les fatigues.

2° Prendre tous les deux jours un grand
bain amidonné d'une durée d'une heure.