

TERCER ORDEN

LOS TREPADORES

Este orden se compone de aves cuyo dedo esterno se dirige atrás como el pulgar, de donde resulta un apoyo mas sólido, que algunos géneros aprovechan para trepar á los árboles. De esta circunstancia se ha tomado su nombre, que, rigorosamente, no conviene á todos, y que podría aplicarse á aves de órdenes diversos, á los trepantes, por ejemplo, que hemos visto entre los gorriones. Las aves de este orden anidan en general en los troncos de los árboles viejos; su vuelo es mediano. Su alimento consiste en insectos y frutas.

Los Picos son aves bien caracterizadas por su pico largo, recto, anguloso, comprimido en forma de cuña en su estremidad y propio á hendir la corteza de los árboles; por su lengua delgada, armada hácia su estremidad de puntas corvas atrás y que puede salir mucho fuera del pico; finalmente por su cola, compuesta de diez grandes plumas de tallos rígidos y elásticos, que los sostienen como apoyo al trepar á los árboles. Son las aves trepadores por excelencia: marchan en todas direcciones sobre la corteza de los árboles, que hieren con su pico, y en las hendiduras y los agujeros de la cual hunden su larga lengua, cubierta de un jugo viscoso, suministrado por grandes glándulas salivares, para tomar las larvas de los insectos de que se nutren. Tímidos y astutos, viven en general solitarios. Anidan una vez por año, en los agujeros de los árboles, y los dos sexos empollan alternativamente.

Los TORCECUELLOS tienen la lengua contráctil, como los picos, pero desprovista de puntas; su pico recto y puntiagudo no presenta ángulos

sensibles y no es bastante fuerte para atacar los árboles y levantar la corteza; la cola no tiene mas que grandes plumas de forma ordinaria. Viven de insectos como los picos, pero son menos trepadores. Es un pájaro solitario, amigo de los bosques montañosos, llega entre nosotros en mayo y parte en setiembre, pone, sin hacer nido, en los agujeros de los árboles, poco tiempo despues de su llegada.

Los CUCLILLOS tienen el pico mediano, bastante hendido y ligeramente arqueado, los tarsos cortos, la cola larga, compuesta de diez grandes plumas. Son aves viajeras que viven de insectos. Son célebres por la costumbre singular de depositar sus huevos en el nido de otras aves insectívoras. Parece que ponen en tierra y trasportan sus huevos con el pico ú las garras. No introducen sino uno en cada nido, pero los depositan todos en nidos vecinos, y no cesan de vigilarlos. El ave en cuyo nido el huevo del cuclillo ha sido introducido, lo empolla como los suyos propios, aun cuando el cuclillo, lo que no es raro, ha comenzado por

destruírselos. Continúa sus cuidados al joven cuclillo, hasta el momento en que es bastante fuerte para salir del nido. En esa época el extranjero vuela y se reúne á sus padres, con los cuales permanece hasta que su educación está terminada.

Los PAPAGAYOS tienen el pico duro, grueso, sólido, redondo en todos sentidos, rodeado en su base de una membrana en que se hallan las ventanas de la nariz; la lengua casi siempre gruesa, carnuda y redonda. Parecen ser las mas favorecidas de todas las aves bajo el aspecto de la inteligencia, y la conformacion de sus patas les permite tomar los objetos con mucha facilidad; su habilidad y su inclinacion á imitar la voz de los otros animales y la del hombre, los han hecho célebres desde há mucho tiempo.

Tienen eminentemente el carácter del orden en que se hallan colocados, es decir, que sus dedos, constantemente en número de cuatro y robustos, son opuestos dos á dos, y armados de uñas sólidas y ganchosas, aunque menos sin

embargo que las uñas de las aves de rapiña; los dos dedos anteriores están reunidos en su base por una membrana, y los posteriores absolutamente libres. Los tarsos son cortos, en casi todos, se alargan en algunas especies, y están siempre cubiertos, así como los dedos, de una piel escamosa. Las alas son generalmente cortas; la cola varía mucho en su longitud y su forma; los colores del plumaje son casi siempre brillantes y puros, estremadamente diversos; á veces las hembras difieren de los machos bajo el concepto del brillo y de lo puro de los colores, y los jóvenes presentan frecuentemente tambien, aun despues de las primeras mudas, caracteres que les son propios. En general, el verde es el color dominante; despues viene el rojo, el azul, y finalmente, el amarillo.

Estas aves son casi siempre originarias de la zona tórrida, tanto en el antiguo como en el nuevo continente, y en las islas de la Oceanía.

Son animales eminentemente trepadores; cuando marchan por tierra, lo hacen con lentitud, y ponen frecuentemente en el suelo la

punta ó la parte superior de su pico, para apoyarse. Cuando trepan, el gancho que forma este pico les es tambien muy útil.

Las alas de los papagayos siendo generalmente cortas y su cuerpo un poco grueso, tienen algun trabajo en elevarse; pero despues vuelan bien y á veces con mucha rapidez, recorriendo espacios bastante largos. Casi todos permanecen en los grandes bosques espesos y á veces en los confines de los lugares desmontados, cuyos productos atacan y destruyen.

Su alimento consiste en frutas pulposas, tales como el plátano, el café, el limon, los dátiles, etc., y sobre todo en almendras. Casi siempre no atacan la pulpa de la fruta sino para llegar al núcleo. Una vez tomado este, lo vuelven y revuelven en el pico, por medio de la lengua, hasta que la cisura de la corteza corresponda á la orilla cortante de la mandíbula inferior. Entonces el ave, obrando con fuerza, rompe y monda la almendra, arroja todas las cubiertas y traga sucesivamente los fragmentos despues de haberlos palpado con su lengua.

En el estado doméstico, muestran el mismo gusto á las semillas de los vegetales, y en general se alimenta muy bien con cañamon. Los papagayos beben poco, pero frecuentemente; lo verifican levantando la cabeza, pero menos que las otras aves.

Fuera del tiempo de la cria, viven en parvas mas ó menos grandes, duermen al ponerse el sol y despiertan con la aurora. Para dormir doblan la cabeza sobre el dorso; tienen un sueño muy ligero; á veces dan algunas gritos durante la noche.

Su vida es muy larga, y se calcula, al menos para los papagayos propiamente dichos, la duracion media en cuarenta años, si bien se citan algunos individuos que han vivido en el estado doméstico noventa y aun cien años y mas. Las cotorras víven, segun se dice, veinticinco años.

Las aves de este género son monógamas; hacen su nido en los agujeros de los árboles podridos, ó en las cavidades de las rocas, y lo componen de restos y polvo de madera carco-

mida en el primer caso, y de hojas secas en el segundo, ponen comunmente tres ó cuatro huevos en cada anidada, y las anidadas se renuevan muchas veces en el año. Los pollos al nacer están desnudos, y su cabeza es tan grande, que el cuerpo parece no formar mas que un apéndice, y permanecen mucho tiempo sin tener bastante fuerza para moverla; despues se cubren de plumion, y solo al cabo de dos ó tres meses están completamente revestidos de plumas. Permanecen con sus padres hasta la primera muda, y entonces se alejan para aparearse.

Las especies de los papagayos, que son mas de doscientas, se dividen en seis secciones. Así, se han nombrado :

I. *Guacamayos*. Los que tienen la cola graduada, mas larga que el cuerpo, el pico muy fuerte, la cara desnuda enteramente ó marcada con pequeñas líneas de plumas. (Todos son de América.) Tal es :

El *guacamayo ararauna* ó *guacamayo azul*, uno de los que se ve con mas frecuencia en

Francia, en donde se ha reproducido en el estado doméstico. Todas las partes superiores, esto es, la cima de la cabeza, la parte posterior del cuello, el dorso, la rabadilla, las alas y toda la parte superior de la cola, son de un azul celeste brillante. El espacio desnudo de las mejillas es considerable y de color blanco rosado, con tres pequeñas líneas horizontales de un ancho collar verdoso.

II. *Cotorras*. Los que tienen la cola graduada, ora mas larga que el cuerpo, ora igual al cuerpo, ora un poco mas corta, el pico mediano, la cara comunmente emplumada. (Todas son de la zona tórrida.)

Se han hecho cuatro divisiones de ellas :

1° Las *cotorras-guacamayas* son las que tienen el contorno de los ojos desprovisto de plumas. Tal es :

La *cotorra-arapavuana* ó *cotorra-pavuana*. Es de un hermoso verde, con la cima de la cabeza de un azul verdoso, la cara inferior de las alas y la cola de un amarillo verdoso; las cubiertas inferiores del ala de un hermoso rojo; su cola,

graduada igualmente, es casi tan larga como el cuerpo; el pico muy grueso, blanquecino en su base, pardusco en su pata; las patas morenas, los ojos de un rojo moreno, las uñas negras. Algunos individuos tienen plumas rojas esparcidas en las plumas verdes de la cabeza del cuello y de las mejillas; otros las tienen en la garganta y algunas veces en las piernas. Las *cotorras* amarillas tienen la cabeza verde, y las cubiertas inferiores de las alas de un rojo anaranjado. Se encuentra muy comunmente esta *cotorra* en la Guyana y en las Antillas. Permanece en grandes parvas durante el dia en las selvas, y se acerca á los prados y á los rios en la tarde y la mañana. Hace grandes estragos en los plantíos de café, porque es muy amiga de la pulpa que rodea este grano. Aprende á hablar fácilmente.

2° Las *cotorras sagitíferas* ó *de cola en forma de flecha* tienen el contorno de los ojos emplumado; las dos grandes plumas intermedias de la cola muy largas y aventajando mucho á las otras. A esta division pertenecen :

La *cotorra de collar*, conocida con el nombre de *cotorra del Senegal*. Bonita especie, de un verde prado uniforme; el macho lleva un collar color de rosa que le ciñe la parte posterior del cuello, se estiende hasta los costados, y donde es contiguo á otro collar negro que abraza toda la garganta; la mandíbula superior es roja, con su punta negra; la inferior de un negro que tira al rojo; las patas y las uñas pardas; los ojos de un blanco pardo. El macho joven es enteramente verde, no lleva collar roado detrás del cuello, ni placa negra en la garganta; su pico es negruzco. A los tres años toma los signos de su sexo. La hembra permanece siempre semejante al macho joven. Esta especie aprende muy bien á hablar.

La *cotorra de Alejandro*, confundida frecuentemente con la anterior, pero se diferencia por su mayor tamaño, su collar mas ancho, mejor marcado en la garganta, de un rosado mas vivo en el cuello, sus hombros de un rojo oscuro, su pico y sus ojos de un rojo vivo. Plinio y otros antiguos han hablado de esta especie,

que vive en las Indias orientales y fué traída á Europa por Alejandro el Grande.

3º Las *cotorras propiamente dichas* tienen la cola larga, graduada, sin que las dos grandes plumas intermedias sean mucho mas largas que las otras; el contorno de los ojos emplumado. En esta division se encuentra:

La *cotorra sincialo*, que se llama sencillamente la *cotorra*, de doce á catorce pulgadas de largo, cuya cola comprende mas de la mitad. Las partes superiores, esto es, la cabeza, el cuello, el dorso, el ovispillo, las alas y las cubiertas superiores de la cola son de un hermoso verde prado; el pecho, los costados y el vientre de un verde amarillento; las plumas de las partes inferiores completamente amarillas; la cola es en su parte media, superiormente, del mismo verde que el dorso, un poco amarilla empero en sus orillas; todas sus grandes plumas muy puntiagudas, azules en su estremidad. El pico es rojizo, las patas de un rojo claro, los ojos de un amarillo naranjado, la piel que los rodea, así como la de la base

del pico, color de carne. Esta cotorra es muy comun en las Antillas.

En esta division se encuentran las especies llamadas *cotorras avispadas*, que tienen los tarsos altos, las uñas redondas, mas rectas que las de las otras especies; el pico corto, medianamente arqueado; el cuerpo delgado, largo, la cola larga, el plumaje comunmente verde. En general no posan en los árboles y corren con velocidad.

Las *cotorras laticaudas* ó *de cola ancha*, son aquellas cuya cola es larga, mas ancha en su estremidad que en su base.

III. *Psitáculos*, aquellos cuya cola es mucho mas corta que el cuerpo, redonda ó puntiaguda, el pico mediano, la cara emplumada, el tamaño comunmente pequeño. (Son muy comunes en la zona tórrida.)

IV. *Papagayos propiamente dichos*, los que tienen la cola corta y cuadrada, el pico muy grueso y encorvado, la cara emplumada, la cabeza grande, el cuerpo grueso. (Muy comunes en la zona tórrida.) Tal es

El *papagayo pardo* ó *joco*, ceniciento, de cola roja. Es originario de Africa, y muy estimado á causa de su mansedumbre, de su adhesion á su señor y de la facilidad con que se le aprende á hablar.

Se da en particular el nombre de *papagayos amazones* á los que son de gran tamaño, de cuerpo robusto y de plumaje verde.

V. *Kakatoes*, los que tienen la cola corta, cuadrada, el pico muy grande, grueso y encorvado como gancho, el contorno del ojo desnudo, la cabeza provista de una cresta de plumas largas y que se enderezan á voluntad del pájaro. (Viven en la Nueva Holanda ó en las Indias orientales, y residen en los lugares pantanosos.)

VI. Finalmente, *papagayos de trompa* ó *microglosos*, aquellos cuya cola es cuadrada, el pico muy grueso y arqueado, la cabeza provista de una borla compuesta de plumas estrechas, la cara desnuda, la lengua pequeña, en forma de bellota, y soportada por una base cilindrica y larga. (Son de Asia.)