Si elle est *idiopathique*, mêmes soins généraux; prévenir l'afflux du sang au cerveau en comprimant les carotides ; bains tièdes; toutes les 2 h. 1 des paquets suivants dans 1 cuill. d'eau ou de confitures :

℞	Extrait de jusquiame noire	0gr,20
	Oxyde de zinc	0gr,10

Lavements antispasmodiques avec asa fœtida (2 à 4 gr.); teinture de musc (0,20 à 0,40 dans une potion gommeuse; sirop d'éther, sirop diacode 15 à 30 gr.; potion antispasmodique :

℞	Eau distillée de tilleul	āā 40 gr.
	— — de feuilles d'oranger	
	Liqueur anodyne d'Hoffmann	1 gr.
	Sirop simple	30 —

Si elle est *sympathique*, faire vomir en cas d'indigestion; incision cruciale de la gencives ou friction avec le mélange suivant en cas de dentition difficile :

℞	Poudre de safran	āā 10 gr.
	Miel	

bains de pieds sinapisés; grands bains tièdes; lavements laxatifs, en cas de constipation; applications émollientes et narcotiques en cas de piqûres; air frais, en cas de chaleur trop forte; bains tièdes en cas de froid.

Si elle marque le début d'une fièvre éruptive, pas d'émissions sanguines; révulsifs cutanés; bains chauds et compresses froides sur le front; poudre de James (0,30 à 0,50 en plusieurs prises).

S'il y a faiblesse générale, pas d'émissions sanguines, pas de purgatifs à moins de constipation; frictions alcooliques avec l'eau de Cologne, l'eau-de-vie camphrée, le baume Fioraventi; inspirations d'ammoniaque, d'acide acétique: à l'intérieur quelques cuillerées de vin d'Espagne.

43. **Épilepsie.** — Symptômes. — *Précurseurs :* Irritabilité; étouffement; constrictions; *aura epileptica*.

Attaque : 1° *Absence*, se manifestant par un trouble momentané et très-court de l'intelligence et du sentiment.

2° *Vertige épileptique*, ou *petit mal :* Le malade s'assied, tombe ou fléchit; face pâle, immobile, yeux hagards; tremblements des membres supérieurs et de la face; mouvements, actes involontaires; retour rapide de l'intelligence après 2 à 3 minutes de vertige.

3° *Grand mal, haut mal* : Cris et perte subite de connaissance, de sensibilité, d'intelligence; roideur tétanique des muscles; arrêt de respiration; respiration stertoreuse; congestion de la face, des veines; pouls faible. Alternatives de contraction et de relâchement; crachotement de mousse écumeuse; retour de la respiration, de la couleur normale de la face, puis de l'intelligence, suivi de fatigue musculaire, de céphalalgie, d'hébétude. Très-souvent trouble mental consécutif.

Ne pas confondre avec hystérie (44), congestion cérébrale (125).

Traitement. — 1° *De l'attaque* : Exhausser la tête; desserrer les vêtements du malade, veiller à ce qu'il ne se blesse pas; le faire maintenir par des aides; lotions fraîches sur la face, la tête; saignée de 300 à 400 grammes, combattre l'asphyxie par ces moyens et par les inhalations de chloroforme, par la compression des carotides; flexion aussi énergique que possible de l'un des deux gros orteils (Brown-Sequard); compression du bulbe en appuyant fortement dans la fosse sous-occipitale, avec le pouce de la main droite, les deux tempes étant comprimées par la main gauche (G. Borelli).

2° *Des accidents consécutifs* : Combattre les congestions céphaliques par les émissions sanguines; sangsues derrière les oreilles, à l'anus et aux malléoles, pédiluves sinapisés, sinapismes. Combattre la susceptibilité nerveuse par les grands bains, par les antispasmodiques, par la valériane en extrait ou en poudre (de 1 gr. à 8 gr.), par les lavements à l'asa fœtida (2 à 4 gr.)

Contre le délire simple : Vésicatoires à la nuque, sulfate de quinine, digitale, calomel.

Contre le délire maniaque : Curare en injections hypodermiques. Préparer instantanément la solution de curare (0,15 et plus pour le contenu de la seringue hypodermique), filtrer à travers le papier Berzelius et injecter dans le tissu cellulaire de l'avant-bras (A. Voisin) : à continuer pendant plusieurs jours.

Contre les hallucinations terrifiantes: Extrait de haschich (1 à 3 gr.).

3° *Curatif* : Saignées générales; antispasmodiques, valériane en poudre (4 à 20 gr. par jour); oxyde de zinc (1 à 4 gr.);

℞	Oxyde de zinc	3 gr.
	Poudre de valériane	6 —
	Castoreum	0gr,60

M. et div. en 9 doses; 1 le matin, 1 à midi, 1 le soir; continuer longtemps.

Datura stramonium (0,05 à 1 gr.); extrait de belladone, valérianate acide d'atropine en granules.

℞ Extrait de belladone..... 4 gr. Poudre de gomme..... 2 — F. s. a. 120 pil.; 1 à 6 par jour.	℞ Valérianate acide d'atropine. 0gr,02 Conserve de roses..... 2 gr. F. s. a. 40 pil.; 1 à 4 par jour avec précaution et temps d'arrêt.

Bromure de potassium, 5 à 10 gr. par jour progressivement, avant le repas : ne pas augmenter la dose, dès qu'on a supprimé la nausée reflexe (Voisin); continuer pendant des années : de temps en temps diurétiques pour éviter l'accumulation du bromure.

℞ Bromure de potassium..... 20 gr.
Eau distillée..... 300 —
1 cuill. à bouche matin et soir dans 1 tasse de tisane ; augmentez de 1 cuill. tous les 4 ou 5 jours.

Sulfate de cuivre ammoniacal en pil. 1 heure après le repas : au-dessous de 10 ans, 0,005 à 0,01 : au-dessus de 10 ans, 0,02, à 0,04 ; adultes, 0,40 à 0,60.

℞ Extrait de valériane..... 2gr,50
Extrait de belladone..... 2 gr.
Sulfate de cuivre ammoniacal..... 1 —
F. s. a. 56 pil.; 2 à 10 par jour.

Nitrate d'argent cristallisé 0,01 à 0,30 par jour; cuivre porphyrisé, 0,01 à 0,05 par jour. Ammoniaque (15 gouttes en potion).

Vomitifs, tartre stibié (0,30 à 1 gr. en potion) ; grands bains exutoires.

4° *Etiologique* : Chercher la cause probable de l'épilepsie et agir en conséquence ; chercher si elle tient à une tumeur cérébrale, à une maladie du cerveau, à une intoxication syphilitique, saturnine, à des vers intestinaux, etc.

44. **Hystérie.** — Symptomes. — 1° *Forme convulsive* : Début brusque ou précédé d'un peu de malaise, douleurs violentes dans les diverses parties du corps; boule hystérique, clou hystérique, face vultueuse, respiration inégale, irrégulière; peau chaude, moite; yeux hagards, gonflement des jugulaires, grincement de dents; convulsions plus ou moins violentes; quelquefois perte de la parole et de l'intelligence; cris déchirants; sanglots; rire convulsif ; délire gai ou furieux ; extase ; paralysie ; anesthésie ou hypéresthésie ; quelquefois exaltation de sensibilité locale, à l'utérus, aux parois abdominales, aux reins, à la vessie, à la mamelle, etc. ; exaltation ou diminution des fonctions des sens, des facultés morales ou affectives; bizarreries

de caractère, névralgies, etc. Troubles — circulatoires : palpitations; — respiratoires : dyspnée ; — digestifs : météorisme, éructations, émissions abondantes d'urines claires, pâles, etc.

2° *Forme non convulsive* : Mêmes symptômes, mais moins intenses que dans la forme convulsive : boule hystérique, suffocations, etc., mais absence de convulsions.

Ne pas confondre avec épilepsie (43).

Traitement. — 1° *Des accès* : Desserrer les vêtements des malades ; prévenir les coups, les chutes ; donner accès à un air frais ; eau froide à la face, sur la tête, sur les tempes ; faire inspirer des sels anglais, de l'eau de Cologne, de l'eau-de-vie, du vinaigre, du chloroforme, de l'ammoniaque, de l'acide acétique. Antispasmodiques, éther, sirop d'éther; liqueur anodine d'Hoffmann (10 à 20 gouttes sur du sucre ou dans de l'eau); valériane (1 à 2 gr.); asa fœtida (2 à 4 gr.); musc, castoreum (0,50); ingestion forcée d'eau fraîche dans l'estomac pendant la perte de connaissance; lavement d'eau froide et glacée ; ligature des membres.

2° *Curatif et prophylactique* : Eviter tout ce qui peut éveiller les désirs vénériens, le séjour prolongé au lit ; travaux corporels, exercices, promenades; bains, affusions, douches d'eau fraîche ; hydrothérapie. S'assurer que les organes génitaux, que l'utérus sont en bon état ; traiter les lésions utérines ; surveiller la menstruation ; guérir l'état chloro-anémique (29).

℞ Asa fœtida..... 2 gr. Acétate d'ammoniaque.... 4 — Diss.; 40 à 50 gouttes, 4 fois par jour.	℞ Chlorure de zinc..... 15 gr. Alcool rectifié..... 30 — Éther sulfurique..... 60 — Diss.; 2 à 4 gouttes, 2 fois par jour, dans 1/2 verre d'eau.

℞ Camphre..... } āā 12 gr.
Asa fœtida..... }
Extrait de belladone..... 4 —
Extrait thébaïque..... 1 —
Sirop de gomme..... q. s.
F. s. a. 120 pil.; 1 à 6 par jour.

3° *Symptomatique* : *Contre les points névralgiques* (voir 39); — *Contre les douleurs générales* : Opiacés, sirop de morphine, sirop diacode : **bains** tièdes en cas d'éréthisme ; douches froides en cas d'atonie. — *Contre les coliques* : Cataplasmes chauds, compression, massage.— *Contre les vomissements* : Narcotiques, glace pilée, potion de Rivière, eau de Seltz, lavements laudanisés, eau magnésienne.

45. **Vertiges.** — Symptomes. — Confusion des idées, des sons; perte d'équilibre; quelquefois terreurs, sensations bizarres; mouvements confus d'élévation, d'abaissement des objets placés autour du malade ou du malade lui-même qui craint de tomber; sensation vertigineuse; quelquefois étourdissements, sentiment de vide dans la tête; vue troublée; le malade croit voir tous les objets tourner autour de lui (*gyrosa*); les couleurs sont confondues en une sorte de brouillard (*tenebricosa*); le vertige existe quelquefois la nuit, même pendant le sommeil (*nocturna*); ou bien les objets semblent monter et descendre (*nutatio*). Nausées, vomissements; douleurs d'estomac; flatuosités; dyspepsie; constipation ou diarrhée.

Chercher si le vertige dépend d'un *trouble digestif* (vertige stomacal), ou d'*inanition*, ou bien s'il est *idiopathique*.

Ne pas confondre ces différentes variétés ensemble, ni avec congestion cérébrale (125).

Traitement. — Toniques; amers; quinquina, sous toutes les formes (vins, extraits); gentiane, quassia amara avant les repas; bicarbonate de soude (1 à 2 gr. avant le repas); carbonate de magnésie (1 cuil. à café); liqueur ou élixir de pepsine; lotions froides sur le corps, sur l'épigastre; compresses d'eau sédative sur l'épigastre. Eaux alcalines, Vals, Vichy, Pougues.

46. **Migraine.** — Symptomes. — 1° *Généraux* : Malaises, frissons, inaptitude au travail, nausées, anorexie, quelquefois vomissement.

2° *Locaux* : Céphalalgie tantôt circonscrite à un petit espace, œil, sourcil, front, tempes, occiput d'un seul côté; vague et légère au début, la douleur augmente peu à peu et rend insupportables le bruit, la lumière, et se complique souvent de vomissements.

Ne pas confondre avec Rhumatisme cérébral (24), Méningite.

Traitement. — 1° *Local* : Compresses imbibées d'eau fraîche, d'eau sédative, d'eau de Cologne, vinaigrée, ou dans

℞	Cyanure de potassium	0gr,10 à 0gr,50
	Alcool, éther ou eau	30 gr.

ou bien enduire le front et les cheveux avec gros comme deux œufs de pigeon de cette pommade :

℞	Chloroforme	12 gr.
	Cyanure de potassium	10 —
	Axonge	60 —
	Cire	q. s.

recouvrir la tête d'un bonnet ciré (*voir Névralgies*, 39)

Repos au lit; silence et obscurité.

2° *Général* : Infusion chaude de trèfle des marais, de genièvre, de centaurée, de mélisse; café à l'eau, thé.

℞	Sulfate de quinine	1gr,50
	Extrait de digitale	0gr,50
	Chlorhydrate de morphine	0gr,15

F. s. a. 20 pil., 4 par jour. (Corlieu.)

℞	Sulfate de quinine	3 gr.
	Poudre de digitale	1gr,50
	Sirop de sucre	q. s.

F. s. a. 30 pil., une chaque soir pendant 3 mois. (Serre, Debout.)

℞	Nitrate d'argent	0gr,30
	Sel ammoniac	0gr,60
	Extrait de gentiane	q. s.

F. s. a. 10 pil.; 2 ou 3 en 24 h. (Socquet.)

chercher si la migraine n'est pas occasionnée par la menstruation, les miasmes paludéens, etc.

47. **Paralysie générale.** — Symptomes. — Embarras de la parole, surtout quand le malade est intimidé ou ému; parole traînante; tremblement et mouvements convulsifs de l'orbiculaire des lèvres; langue agitée, tremblotante, sans déviation; tremblement des mains, des bras, des jambes; marche saccadée, gauche, trébuchante, chancelante; incertitude, incoordination des mouvements, puis impossibilité de marcher; quelquefois roideur, contracture des membres; paralysie. Incontinence ou rétention d'urines; paresse de l'œsophage, du pharynx; constipation. Anesthésie passagère ou permanente; hypéresthésie exceptionnellement; engourdissement, fourmillement. Affaiblissement lent et graduel de l'intelligence, de la mémoire; changement de caractère; perversion des facultés morales et affectives; délire ambitieux, quelquefois délire hypochondriaque avec un fond de démence. Inégalité pupillaire; affaissement des traits de la face; mâchonnement; grincement des dents, mouvement de dégustation; troubles des sens; allanguissement des fonctions génitales; selles et urines involontaires.

Variétés : Congestive; — paralytique; — mélancolique; — expansive.

Ne pas confondre avec apoplexie (165).

Traitement. — Bonnes conditions hygiéniques; dérivatifs sur l'intestin; pilules purgatives de Bontius, d'Anderson, aloès; sulfate de magnésie; eau de Pullna, eau de Sedlitz; vésicatoires au bras; cautères à la nuque, au bras, à la jambe; séton à la nuque.

Dans la forme mélancolique : Amers, quinquina, fer, bains

sulfureux, liqueur de Pearson (10 à 20 gouttes) pendant 2 ou 3 mois.

Dans la forme expansive : Bains tièdes prolongés avec eau fraîche sur la tête.

Dans la forme congestive : Sangsues à l'anus, légères saignées; révulsifs.

48. **Ataxie locomotrice.** — Symptomes. — *Première période* : Paralysie des muscles moteurs de l'œil; strabisme, diplopie; amaurose complète ou incomplète; troubles visuels; à l'ophthalmoscope, atrophie plus ou moins complète de la papille du nerf optique. Vertiges, céphalalgie. Troubles des fonctions génératrices, priapisme, spermatorrhée, anaphrodisie. Douleurs profondes, térébrantes, localisées dans un membre, quelquefois changeant de place; hypéresthésie cutanée: constriction pénible et douloureuse aux tempes, au cou, à la ceinture, à l'abdomen. Constipation; incontinence nocturne des urines.

Deuxième période : Après un temps assez long, vertiges; défaut de coordination des mouvements; hésitation dans la marche, faiblesse des jambes; conservation de la contractilité musculaire par la faradisation; soubresauts, contractions spasmodiques des muscles, tremblements fibrillaires; douleurs aiguës, profondes; engourdissement, fourmillements, puis anesthésie cutanée et musculaire.

Troisième période : Diminution et abolition des mouvements volontaires et artificiels. Perte des sensations tactiles, gustatives; aphonie. Asphyxie par paralysie du diaphragme; conservation des facultés intellectuelles. Amaigrissement.

Ne pas confondre avec paralysie (165), chorée (41), paralysis agitans, tremblements, spasmes, crampes, alcoolisme (voir *Intoxications*).

Traitement. — Exclusivement symptomatique : bains sulfureux, hydrothérapie; eaux minérales de Néris, Bourbon-l'Archambault, Baréges, la Malou, Wiesbaden; nitrate d'argent en pilules (0,01 à 0,15) à doses progressives et en tâtant la susceptibilité du malade (Wunderlich); phosphore.

℞ Huile phosphorée	4 gr.	℞ Chloroforme	50 gr.
Eau de menthe	60 —	Phosphore	0gr,05
Sirop simple	30 —		

1 à 4 cuill. à café par jour, en commençant par une.

Faire incorporer cette solution dans des capsules de gélatine, 10 centigr. par capsule : 1 à 10 capsules progressivement.

Soutenir les forces; calmer les douleurs, faradisation des nerfs spinaux.

49. **Atrophie progressive.** — Symptomes. — 1° *Locaux* : Faiblesse musculaire, crampes, contractions fibrillaires continues ou intermittentes, soubresauts, puis amaigrissement, déformation : presque toujours c'est par le membre supérieur que l'atrophie commence.

2° *Généraux* : Nul trouble à moins que l'atrophie n'ait envahi les muscles de l'abdomen et du thorax.

Ne pas confondre avec Paralysie générale (47), hémiplégie (165).

Traitement — Electricité par les courants constants; iodure de potassium (?); eaux sulfureuses d'Aix, Bonnes, Barèges.

50. **Folie, manie, démence, idiotie, imbécillité, crétinisme.** — Symptomes. — Trouble général ou partiel des facultés psychiques, — c'est-à-dire de l'intelligence, de la sensibilité, de la volonté.

Variétés : 1° Délire *général* avec excitation (*manie*); général avec dépression (*mélancolie*); s'il y a conservation du jugement (*mélancolie simple*); perte du jugement (*lypémanie*); inertie, hébétude (mélancolie stupide, stupeur *stupide*).

2° Délire *partiel* avec excitation ou avec dépression (*monomanie*).

3° Affaiblissement progressif de l'intelligence, de la sensibilité, de la volonté (*démence*).

4° Succession des états mélancolique et maniaque (*folie circulaire* ou *à double forme*).

5° Folie se développant dans le cours de la grossesse chez les nouvelles accouchées ou chez les nourrices (*folie puerpérale*).

6° Folie se développant chez les ivrognes (*folie alcoolique*, *delirium tremens*).

7° Folie se développant dans le cours de certaines maladies des nerfs, des organes digestifs, génitaux, etc., de la fièvre typhoïde, etc. (*folie sympathique*).

8° Arrêt de développement congénital ou acquis, complet ou incomplet des facultés intellectuelles et morales (*idiotie*, *imbécillité*).

9° Arrêt de développement plus ou moins complet des facultés intellectuelles et morales avec dégénérescence physique et cachexie goîtreuse (*crétinisme*).

- Délire
  - général
    - avec excitation.... (Manie).
    - avec dépression... Mélancolie, lypémanie, stupeur.
  - partiel ou monomanie
    - avec excitation.... Folie ambitieuse. Folie de persécution. Démonomanie. Folie homicide.
    - avec dépression... Nostalgie. Folie suicide. Hypochondrie.
- Démence
  - incomplète
  - complète
    - avec excitation.
    - avec dépression.
    - avec paralysie générale.

Folie à double forme, ou circulaire, caractérisée par la succession répétée des états mélancolique et maniaque.

Folie puerpérale.
Folie alcoolique, delirium tremens.
Folie sympathique.
Idiotie, imbécillité, crétinisme.

Ne pas confondre les variétés entre elles, ni le délire avec l'agitation nerveuse ; chercher si le délire se rattache à une altération cérébrale, — ou à une névrose, telle que épilepsie (43), hystérie (44); — ou à des maladies d'organes étrangers au système nerveux, comme rhumatismes (22, 23, 24), péritonites 446, 447, ou à des maladies fébriles générales, comme fièvres typhoïde (13), éruptive (3 à 12); ou à un empoisonnement (voir *Intoxications*).

Traitement. — 1° *Moral* : Éloigner la cause occasionnelle ; exhortations, raisonnement; ne pas isoler les malades ; ménagement avec les personnes délicates, impressionnables; volonté ferme avec les gens grossiers ou apathiques; ne pas condescendre aux idées des malades quand elles ne sont pas raisonnables ; mettre en activité toutes les facultés restées saines; récréation, travaux variés, manuels; exercice à l'air ; gymnastique ; ne pas les laisser oisifs.

2° *Physique et physiologique.* — Saignées générales ou locales en cas de surexcitation et de congestion cérébrale, de pléthore ; laxité du ventre ; pilules purgatives d'Anderson, de Bontius, de Morisson, écossaises; aloès, résine de jalap, scammonée, coloquinte ; séné, café (10 gr. de chaque en infusion); révulsifs, antispasmodiques ; peu ou pas d'opiacés; bains prolongés, tièdes, froids; douches ; glace sur la tête ; bains de surprise; affusions froides, camisole de force au besoin ; faire manger.

3° *Spécial* : Dans la mélancolie, dans la manie, antiphlogistiques, toniques, antispasmodiques, douches froides, etc. Traiter le moral, le physique et la cause déterminante chez les hypochondriaques. Combattre le delirium tremens par le chloroforme (5 à 40 gouttes en potion), l'ammoniaque (15 gouttes dans un verre d'eau), la teinture de digitale (5 à 15 gr. en potion).

CHAPITRE II

MALADIES DE LA PEAU.

Exanthèmes. Érysipèle. Érythème. Urticaire.
Vésicules. Eczéma. Herpès. Gale. Miliaire.
Bulles. Pemphigus. Rupia.
Pustules. Acné. Sycosis. Impétigo. Ecthyma. Teigne. Favus.
Papules. Lichen. Prurigo.
Squames. Pityriasis. Psoriasis. Ichthyose.

51. **Érysipèle.** — Symptomes. — 1° *Locaux* : Rougeur, tuméfaction de la peau ayant une étendue peu considérable ; transition brusque des parties malades aux parties saines par une sorte de bourrelet érysipélateux; chaleur vive, douloureuse. Plaques d'un rouge clair, vif, jaunâtre (*E. bilieux*) ; — disparaissant momentanément par la pression ; puis vésicules miliaires, phlyctènes, bulles (*E. phlycténoïde, bulleux, phlegmoneux*). — Infiltration du tissu cellulaire sous-cutané (*E. œdémateux*).— Engorgement des ganglions voisins ; diminution du 7e au 9e jour ; desquamation. — Autour d'une plaie, douleurs locales ; rougeur des bords de la plaie; surface sèche, brûlante ; suppuration séreuse; engorgement des ganglions voisins (*E. traumatique*).

2° *Généraux* : Prodromes ; frissons ; céphalalgie ; nausées ; vomissements ; constipation ou diarrhée ; pouls dur, fréquent; induration douloureuse des ganglions placés dans le voisinage de la partie où apparaîtra l'érysipèle ; durée 2 ou 3 jours avant l'exanthème.

L'érysipèle peut être fixe, — ambulant, — épidémique, — sporadique, — bénin, — malin.

Ne pas confondre avec inflammation accidentelle de la peau, érythème (52), urticaire (11), scarlatine (12), angioleucite (75).

Traitement. — 1° *Général* : Repos ; boissons délayantes acidulées ; saignée générale ou sangsues loin du siége de l'érysipèle