avec excitation... (Manie). général..... avec dépression... Mélancolie, lypémanie, stupeur. Folie ambitieuse. Folie de persécution. Délire avec excitation Démonomanie. Folie homicide. partiel ou monomanie Nostalgie. avec dépression ... Folie suicide. Hypochondrie. I avec excitation. (incomplète..... Démence | avec depression. avec paralysie générale. Folie à double forme, ou circulaire, caractérisée par la succession répétée des états mélancolique et maniaque.

Folie puerpérale.
Folie alcoolique, delirium tremens.
Folie sympathique.
Idiotie, imbécillité, crétinisme.

Ne pas confondre les variétés entre elles, ni le délire avec l'agitation nerveuse; chercher si le délire se rattache à une altération cérébrale, — ou à une névrose, telle que épilepsie (43), hystérie (44); — ou à des maladies d'organes étrangers au système nerveux, comme rhumatismes (22, 23, 24), péritonites 446, 447, ou à des maladies fébriles générales, comme fièvres typhoïde (13), éruptive (3 à 12); ou à un empoisonnement (voir Intoxications).

TRAITEMENT. — 1º Moral: Éloigner la cause occasionnelle; exhortations, raisonnement; ne pas isoler les malades; ménagement avec les personnes délicates, impressionnables; volonté ferme avec les gens grossiers ou apathiques; ne pas condescendre aux idées des malades quand elles ne sont pas raisonnables; mettre en activité toutes les facultés restées saines; récréation, travaux variés, manuels; exercice à l'air; gymnastigue; ne pas les laisser oisifs.

2º Physique et physiologique. — Saignées générales ou locales en cas de surexcitation et de congestion cérébrale, de pléthore; laxité du ventre; pilules purgatives d'Anderson, de Bontius, de Morisson, écossaises; aloès, résine de jalap, scammonée, coloquinte; séné, café (10 gr. de chaque en infusion); révulsifs, antispasmodiques; peu ou pas d'opiacés; bains prolongés, tièdes, froids; douches; glace sur la tête; bains de surprise; affusions froides, camisole de force au besoin; faire manger.

3º Spécial: Dans la mélancolie, dans la manie, antiphlogistiques, toniques, antispasmodiques, douches froides, etc. Traiter le moral, le physique et la cause déterminante chez les hypochondriaques. Combattre le delirium tremens par le chloroforme (5 à 40 gouttes en potion), l'ammoniaque (15 gouttes dans un verre d'eau), la teinture de digitale (5 à 15 gr. en potion).

CHAPITRE II

MALADIES DE LA PEAU.

Exanthèmes. Érysipèle. Érythème. Urticaire.
Vésicules. Eczéma. Herpès. Gale. Miliaire.
Bulles. Pemphigus. Rupia.
Pustules. Acné. Sycosis. Impétigo. Ecthyma. Teigne. Favus.
Papules. Lichen. Prurigo.
Squames. Pityriasis. Psoriasis. Ichthyose.

51. Érysipèle. — Symptomes. — 1° Locaux: Rougeur, tuméfaction de la peau ayant une étendue peu considérable; transition brusque des parties malades aux parties saines par une sorte de bourrelet érysipélateux; chaleur vive, douloureuse. Plaques d'un rouge clair, vif, jaunâtre (E. bilieux); — disparaissant momentanément par la pression; puis vésicules miliaires, phlyctènes, bulles (E. phlycténoïde, bulleux, phlegmoneux).

— Infiltration du tissu cellulaire sous-cutané (*E. œdémateux*).— Engorgement des ganglions voisins; diminution du 7° au 9° jour; desquamation. — Autour d'une plaie, douleurs locales; rougeur des bords de la plaie; surface sèche, brûlante; suppuration séreuse; engorgement des ganglions voisins (*E. traumatique*).

2º Généraux: Prodromes; frissons; céphalalgie; nausées; vomissements; constipation ou diarrhée; pouls dur, fréquent; induration douloureuse des ganglions placés dans le voisinage de la partie où apparaîtra l'érysipèle; durée 2 ou 3 jours avant l'exanthème.

L'érysipèle peut être fixe, — ambulant, — épidémique, — sporadique, — bénin, — malin.

Ne pas confondre avec inflammation accidentelle de la peau, érythème (52), urticaire (11), scarlatine (12), angioleucite (75).

Traitement. — 1º Général: Repos; boissons délayantes acidulées; saignée générale ou sangsues loin du siége de l'érysipèle selon l'intensité des symptômes et la force du sujet; purgatifs, eau de Sedlitz, limonade purgative, huile de ricin; en cas d'embarras gastrique, émétique (0,05 à 0,10) ou éméto-cathartique.

24	Sulfate de soude	20 gr.
	Tartre stibié	0gr,05 à 0gr,10

2º Local: Onctions avec l'huile d'olive, la glycérine, l'axonge récente, la pommade camphrée; compresses imbibées de décoction de fleurs de sureau, de graine de lin, de laitue, de pavots, de morelle; cataplasmes froids de graine de lin ou d'amidon; collodion élastique, quand l'épiderme n'est pas déchiré; solution de sulfate de fer (érysipèle traumatique).

24	Sulfate de protoxyde de fer	30 gr.
	Eau	500 -

Vésicatoire, onguent mercuriel, cautérisation linéaire ou ponctuée, incisions, mouchetures. Saupoudrer avec amidon, sous-nitrate de bismuth, poudre de riz.

24	Amidon pulvérisé	60 gr.
of Children	Camphre	2 à 10

Chez les enfants, badigeonner avec un pinceau trempé dans

24	Camphre	10 gr.
en terne	Tannin	5 —
	Éther culturique	25 -

Si la douleur est vive, extrait thébaïque (0,02 à 0,03) toutes les 4 heures. S'il y a délire nerveux, potion calmante :

24	Potion gommeuse	100 gr.
,	Extrait thébaïque	0sr,10 à 0sr,20
	Teinture de musc	i gr.
	Sirop simple	30 —

ou bien alcoolature d'aconit (2 à 4 gr.) dans un julep; alcoolé de fer chloruré (15 à 20 gouttes toutes les 2 heures).

Si l'érysipèle est phlegmoneux, émissions sanguines générales et locales; cataplasmes; bains; pas de topiques irritants; incisions prématurées; compression; quelquefois sulfate de quinine.

52. Érythème. — Symptomes. — 1° Locaux: Rougeurs légères, superficielles, mal circonscrites, avec ou sans saillie, disparaissant sous la pression; peu ou pas de chaleur; pas de gonfle-

ment; quelquefois suintement par suite d'excoriations (Erythème superficiel). — Plaques saillantes, peu étendues, rouges, violacées (É. papuleux). — Mêmes symptômes, mais persistance des plaques (É. tuberculeux). — Taches plus élevées, ayant de 1 à 3 centimètres de diamètre, durant 10 à 12 jours, et se manifestant surtout aux jambes, quelquefois aux bras (É. noueux).

2º Généraux: Le plus souvent nuls, excepté dans la forme noueuse où existent des symptômes gastriques et arthritiques.

Ne pas confondre avec érysipèle (51), scarlatine (51), urticaire (11).

TRATEMENT. — Lotions émollientes; bains amidonnés ou alcalins, ou de son; boissons acidulées; saupoudrer de lycopode, d'amidon, de poudre de riz, de vieux bois; purgatifs, émétocarthartiques dans la forme noueuse.

53. Eczéma aigu. — Symptomes. — 1° Locaux: Vésicules petites, aplaties, nombreuses, agglomérées, ou bien pustules, papules, fissures, squames se manifestant sur des surfaces enflammées, quelquesois avec suintement séreux, séro-purulent, puis desquamation épidermique (E. simple ou vésiculeux). — Inflammation cutanée prodromique; surface rouge, tumésiée; puis vésicules dont le suintement excorie la peau; formation de squames dont la chute met à découvert une surface rouge, humide, enflammée; durée, 15 à 20 jours, puis passage à l'état chronique (E. rubrum). — Phlegmasie plus intense; vésicules pustuleuses, jaunâtres, squames plus épaisses (E. impétigineux). — Fissures épidermiques, avec sécrétion séreuse dans les fissures, puis squames accompagnées de douleurs, cuissons, démangeaison.

Dans tous les cas, chaleur et démangeaison plus ou moins intenses.

Ne pas confondre avec herpès (55), impétigo (62), érythème (52), pemphigus, (57), psoriasis (68), lichen (65).

2º Généraux: Nuls, excepté dans la forme impétigineuse.

TRAITEMENT. — Cataplasmes de fécule de pommes de terre; lotions émollientes, glycérolé d'amidon; poudre d'amidon, de riz, de sous-nitrate de bismuth; bains émollients, gélatineux.

24	Colle de Flandre	500 à 1000 gr.
11	Eau chaude	10 litres.

F. dissoudre à chaud et mélangez avec l'eau du bain : bains de son (2 kilogr.). — Boissons acidules, rafraîchissantes, limonade. — Un ou deux purgatifs salins, eau de Sedlitz, de Pullna,

de Friedrichshall, Kissingen, Hombourg, etc., limonade purgative: puis au déclin, boissons amères, houblon, pensées sauvages, fumeterre; bains alcalins (sous-carbonate de soude, 125 à 250 gr.): lotions alcalines. Régime adoucissant et léger. Pas de pommades à cette période. Contre l'eczéma ajou généralisé et récent, eaux sulfureuses faibles, Saint-Gervais, Baden en Suisse, Bagnols de l'Orne, La Roche-Posay, etc. (Bazin).

54. Eczéma chronique. — Symptomes. — Locaux : Sécrétion abondante: surfaces rouges, excoriées ou bien squameuses: ces éruptions se succèdent avec exacerbations. D'autres fois. sécrétion à peine sensible ou nulle; squames sur une surface sèche, fendillée: prurit intense avec exacerbations le soir ou

à la suite de causes diverses.

Siège principal : 1º Cuir chevelu chez les enfants (teigne amiantacée, furfuracée); 2º oreilles, surtout chez la femme et les enfants: 3º organes génitaux, scrotum, grandes lèvres, anus, cuisses; 4º mamelles, chez les nourrices; 5º mains, chez les épiciers.

Ne pas confondre avec herpès (55), gale (56), lichen (65), pso-

riasis (68), impétigo (62).

TRAITEMENT. - Bains simples, émollients, gélatineux; envelopper les parties malades dans la toile vulcanisée pour les soustraire à l'air (Colson); bains de vapeur quand l'eczéma est sec; douches de vapeur; bains alcalins. Quand il y a absence d'inflammation, bains sulfureux (sulfure de potasse, 60 à 125 gr.; acide chlorhydrique, 5 à 8 gr. pour un grand bain); lotions alcalines.

Contre les démangeaisons souvent intolérables, lotions avec solution de sublimé, d'acide phénique, de borax.

4	Sublimé Alcool Eau Diss. pour lotion.	0,10 à 0,20 gr. 2/ 5 - 100 à 300 -	Acide phénique Alcool Eau Diss. pour lotion.	0,10 gr. 0,10 — 100 —
24	BoraxEauDiss. pour lotion,	2 à 10 gr. 24 500 —	Cyanure de potas- sium	0,10 à 0,25 gr. 30 —

Combattre la sécheresse de la peau et en prévenir les gerçures avec les lotions émollientes tièdes, le cérat, la glycérine, le glycérolé d'amidon, les pommades camphrée, mercurielle, au goudron (2 à 4 gr.), à l'oxyde de zinc (0,50 à 1 gr.), à l'huile de cade (2 à 10 gr.).

24 Cérat frais ou cold cream. 30 gr. Précipité blanc 0sr, 25 à 4 —	7 Cérat frais ou cold cream. 30 g. Sublimé 95°,05 à 0,10
$\frac{2\ell}{\ell}$ Cérat frais ou cold cream. 30 gr. Protonitrate de mercure . 0sr,05 à 0,10 .	27 Cérat frais ou cold cream. 30 gr. Cétine

Contre l'eczéma ancien, lichénoïde, partiel : eaux sulfureuses

· fortes de Barèges, Luchon, Cauterets (Bazin).

Chercher si l'eczéma est sous l'influence d'une diathèse scrofuleuse, herpétique, arthritique ou syphilitique, et prescrire un traitement général approprié.

S'il est scrofuleux : Tisane amère et sirop antiscorbutique; huile de morue, sirop d'iodure de fer ; vin, sirop de quinquina ; un ou deux verres d'eau de Sedlitz tous les 4 ou 5 jours, ou bien

4	Pensées sauvages	8 à 15 gr.
	Follicules de séné	4 à 10 —
	Eau bouillante	3 à 4 verres.

S'il y a herpétisme : préparations arsenicales : solutions de Fowler (4 à 25 gouttes), de Pearson (10 à 40 gouttes); granules d'acide arsénieux de 0,001 (2 à 10 par jour) : pilules de Dioscoride (5 à 15).

24	Arséniate de soude ou d'ammoniaque	0gr,10
	Sirop amer	350 gr.
	4 à 9 cuill	

1 ou 2 pilules asiatiques (ac. arsénieux); pilules d'arséniate de fer chez les lymphatiques :

4	Arséniate de fer	0gr,50
	Extrait de douce-amère ou conserve de roses	5gr.
	F. s. a. 50 pil.; 2 à 12 par jour (Hardy).	

S'il y a arthritisme : Saponaire, pensées sauvages, sirop de fumeterre, d'orme pyramidal. Avant les repas, 1 cuillerée du siron suivant : bicarbonate, lactate, benzoate de soude, magnésie, eau de chaux.

4	Sirop de fumeterre ou de saponaire	500	gr.
	Bicarbonate de soude	5	à 8

Eaux de Vichy, aux repas. S'il y a syphilis, voir (29).

Régime sévère ; éviter les excès alcooliques et autres.

Au déclin, eaux sulfureuses faibles en boissons ou en bains, Enghien, Pierrefonds, Barèges, Luchon, Uriage, Saint-Gervais.— S'il y a complication de rhumatisme, de névralgies, Royat, Plombières. — S'il y a catarrhe, Mont-Dore, la Bourboule, Cauterets, Louesche.

55. Hernès. - Symptomes. - Locaux : Eruption de vésicules grosses comme un grain de millet, réunies en groupe sur une base enflammée, et occupant une ou plusieurs surfaces bien circonscrites, séparées entre elles par des intervalles sains; cuisson, fourmillements, brûlures; au bout de 4 ou 5 jours. résorption ou desquamation. Dans quelques cas les vésicules sont plus grosses et en groupe plus considérable (H. phlycténoide); - elles siègent aux lèvres (H. labialis); - au prépuce (H. preputialis, avec ou sans desquamation, qu'on ne confondra pas avec le chancre (27, 28); — sur une moitié du thorax (H. zona); autour de taches circulaires sont de petites vésicules globuleuses, puis des squames (H. circiné); — groupe de vésicules entourées d'anneaux érythémateux de nuances diverses (H. iris): - à la tête et au cuir chevelu, plaques arrondies couvertes de petites vésicules qui s'étendent excentriquement et auxquelles succède la desquamation; chute des cheveux; durée longue (H. tonsurant).

Ne pas confondre avec eczéma (53), dont toute la surface est rouge; pemphigus (57), chancre (27, 28), lichen (65), favus (64).

TRAITEMENT. — 1º État aigu: Repos; tisanes rafraíchissantes, eau d'orge, Iimonade; régime non excitant. Dans les cas très-aigus, saignée générale ou locale; lotions émollientes; lotions avec l'eau de Goulard étendue; saupoudrer avec l'amidon; collodion élastique dans quelques cas de zona. En cas d'escarres, poudre de quinquina, de tan, de charbon; lotions vineuses, alcooliques.

2º Etat chronique: Pommade au calomel (54); lotions et bains alcalins, sulfureux, etc. Combattre la diathèse (54).

Contre l'H. phlycténoide : Antiphlogistiques.

Contre l'H. preputialis: Injections mucilagineuses, à la glycérine, entre le gland et le prépuce. Eaux d'Enghien, Eaux-Bonnes à l'intérieur; charpie entre le prépuce et le gland pour prévenir le phimosis.

Contre l'H. zona: Collodion; amidon; vésicatoires opiacés en cas de douleurs vives consécutives.

Contre l'H. tonsurant: Pommade au calomel, au borax (2 gr.), au tannin (2 gr.), au sulfure de chaux.

56. Gale. — Symptomes. — 1º Locaux: Petites vésicules transparentes au sommet, avec prurit intense, dues à la présence de l'acarus, existant dans l'intervalle des doigts, aux poignets, aux

bras, aux aisselles, sur le ventre, etc., presque toujours écorchées par les malades; petit sillon où loge l'acarus.

2º Généraux: Le plus souvent nuls, quelquesois intenses. Ne pas confondre avec eczéma (53, 54), lichen (65), prurigo

Ne pas confondre avec eczéma (53, 54), lichen (65), prurigo (66); ne pas oublier que la gale se complique quelquefois de ces affections.

TRAITEMENT. — Exclusivement local: Tuer l'insecte et ses œufs en ouvrant le sillon; frictions générales pendant une demiheure avec le savon noir, puis grand bain, et ensuite frictions avec la pommade d'Helmerich:

4	Axonge 60 gr. Soufre sublimé 15 — Sous-carbonate de po-	27 Savon de potasse 40 gr. Soufre sublimé 10 — Essence de citron 1 —
	tasse 8 -	

Continuer pendant deux jours. Frictions avec l'essence de térébenthine (une seule) ou avec l'huile de pétrole, ou avec le sulfure de calcium liquide.

57. Pemphigus aigu ou Pompholix. — Symptomes. — 1°Locaux: Bulles séreuses de 4 à 5 centimètres développées sur des surfaces rouges et enflammées, puis, après 3 ou 4 jours, croûtes épaisses, excoriations superficielles; quelquefois retour successif de ces symptômes.

2º Généraux : Malaise; soif; inappétence; frissons.

TRAITEMENT. — 1º Local: Eviter l'excoriation, préserver du frottement; poudre d'amidon; pansement simple des excoriations.

2º Général: Diète légère; laxatifs au besoin; boissons acidules, limonade; repos.

58. Pemphigus chronique. — Symptomes. — 1º Locaux: Larges bulles contenant une sérosité citrine ou sanguinolente, se rompant au bout de 10 à 12 h. et faisant place à des excoriations suivies de croûtes; retour successif de ces phénomènes. Dans le pemphigus foliacé, le corps est tout couvert de croûtes lamelleuses ayant quelque ressemblance avec la pâtisserie feuilletée; dans le pemphigus prurigineux, papules et prurigo, quelquefois une seule bulle solitaire.

Ne pas confondre avec rupia (59), ecthyma (63). Chez les enfants, se méfier du pemphigus syphilitique qui siége à la paume des mains, à la plante des pieds.

TRAITEMENT. — 1º Local: Bains simples, amidonnés, prescrits avec réserve pour ne pas trop macérer la peau. Si le pemphigus est limité, cataplasmes saupoudrés de charbon et de quin-

MALADIES DE LA PEAU

quina; saupoudrer abondamment d'amidon sec, surtout dans la variété foliacée

2º Général: Toniques: ferrugineux: eau vineuse: café de

glands; amers. Régime reconstituant.

Chez les enfants nouveau-nés: Liqueur de Van Swieten (4 cuill. à café par jour dans de l'eau sucrée); bains avec 2 à 5 gr. de sublimé. Iodure de potassium (1 à 3 gr. par jour) à la nourrice.

59. Rupia. — Symptomes. — Locaux: Bulles plus ou moins volumineuses de 1 centimètre environ, isolées, aplaties, renfermant un liquide d'abord séreux, puis purulent (il est séreux dans le pemphigus); puis croûtes souvent très-épaisses; puis ulcérations plus profondes (elles sont superficielles dans le pemphigus), et empreintes consécutives d'une couleur rouge livide (R. simplex).

Quelquefois, bulles plus grosses, croûtes plus épaisses, ulcérations plus profondes; inflammation circonscrite de la peau; puis soulèvement de l'épiderme par un liquide noirâtre, épais, qui se concrète en croûte : plusieurs bulles se succèdent à la même place, donnant un aspect d'écaille d'huître; sous ces

croûtes, ulcère blafard, arrondi (R. prominens).

Chez les enfants cachectiques, taches livides, proéminentes, au cou, à la poitrine, à l'abdomen, aux bourses ; bulles séreuses ou sanguinolentes; ampoules entourées d'une aréole violacée. contenant un liquide noirâtre: ulcérations gangréneuses fétides (R. escharotica).

Ne pas confondre avec pemphigus (57), ecthyma (63), qui est

pustuleux.

• TRAITEMENT. - 1º Local: Ouvrir les bulles; panser avec le linge fenêtré et cératé; après la chute des croûtes, lotions aromatiques, saupoudrer avec la crème de tartre: lotions émollientes en cas de douleurs. Dans le rupia prominens, cautérisation avec le nitrate d'argent, avec le nitrate acide de mercure. avec la pommade au protoiodure ou au deutoiodure de mercure:

24	Protoiodure de mer-		24 Deutoiodure de mer-	4286 41178
	cure	1 à 2 gr.	cure	0gr, 60 à 1 gr.
	Axonge purifiée	30 - 1	Axonge purifiée	30 —

2º Général: Bonne alimentation; bonne nourriture; amers; sirop de quinquina; repos; grand air.

Chercher s'il y a lymphatisme ou syphilis; dans ce dernier cas, sirop de deutoiodure de mercure ioduré.

• 24	Deutoiodure de mercure	0gr,10
Eu Tu	Iodure de potassium	5 gr.
	Eau	5
	Sirop de sucre	250 —

F. s. a. Une à deux cuill, à dessert

60. Acné. — Symptomes. — 1º Locaux : Affection pustuleuse siégeant dans les glandes sébacées de la peau et caractérisée par l'hypertrophie de ces petites glandes, avec altération de la matière sébacée, qui tantôt est retenue dans la cavité, tantôt épanchée au dehors; existant au front, à la face, sur les épanles, reposant sur une base un peu enflammée; sans chaleur ni douleur (acne simplex). - Quelquefois apparition de points noirâtres, saillants au sommet de la petite pustule (A. punctata). - Peu ou pas de suppuration; induration de la pustule et de sa base : rougeur livide (A. indurata). - Hypersécrétion des follicules sébacés, surtout à la face, peau huileuse; la matière sébacée est liquide (A. sebacea fluens), ou bien concrète, dure, squameuse, croûteuse (A. sebacea crustata). - Couleur violacée du nez, de la face ; peau rugueuse surtout après les excès de boissons, les repas; lignes bleuâtres variqueuses (A. rosacea ou couperose). - Tumeurs rouges violacées sillonnées de veines hypertrophiées; siégeant principalement au nez qui est considérablement augmenté de volume (A. hypertrophique). - Petites pustules existant sur le cuir chevelu ou dans la barbe. à base saillante, à sommet ombiliqué et souvent traversée par un poil, puis desquamation de la pustule; souvent picotement. démangeaisons et chute des poils (A. pilaris). - Petites tumeurs cutanées indolentes, présentant au centre un point noin par lequel sort la matière sébacée, avec ou sans pédicule, ressemblant à un grain de variole (A. varioliforme). - Volume d'un gros pois, coloration normale, tumeur arrondie, rénitente, quelquefois flasque (Molluscum).

Ne pas confondre avec impétigo (82), lichen (65), sycosis (61),

ni l'A. pilaris avec syphilis (28, 29).

TRAITEMENT. - 1º Local: Variable selon les formes.

Contre l'A. simplex : Lotions émollientes, d'eau de son, de guimauve, de graine de lin, de glycérine, de semences de coings; fumigations émollientes; cold cream.

Contre l'A. sebacea : Lotions d'eau chaude additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque, lotions sulfureuses; onctions d'huile de cade, d'huile de noix d'acajou. Lotions alcalines, sur le déclin astringentes.

60

4	Sous-carbonate ou borate de soude Eau commune	5 à 10 gr 300 —	
	Diss. (Hardy).		

Contre l'A. punctata, l'A. indurata : Lotions excitantes de roses rouges, de petite sauge, de lavande, d'eau alcoolisée, d'eau de Gowland, lotions alcalines.

24	Bichlorure de mercure ou sublimé		
olri nat	Alcoel Eau distillée	q. s. 100 —	
	Diss. Une cuill. à café dans un verre d'eau chaude pour lotions.	sh tix	

lodure de chlorure mercureux : pommades mercurielles :

24 Axonge ou onguent rosat.	30 gr. 24	Axonge	30 gr.
Protoiodure de mercure.		Biiodure de mercure.	0sr,05 à 0sr,50.
The books of the books of			200013 25 110

Insister sur les douches de vapeur prolongées.

Contre l'A. rosacea: Lotions chaudes matin et soir, avec eau pure ou additionnée de teinture de benjoin, eau de Cologne, liqueur de Van Swieten; si l'acné est ancienne, pommades mercurielles ci-dessus.

2º Genéral: Régime doux; boissons acidules, limonade; pas d'alcooliques; laxatifs au besoin; empêcher ou prévenir l'afflux du sang dans la partie supérieure du corps; pédiluves sinapisés; quelquefois saignées, sangsues; surveiller la menstruation; eaux minérales sulfureuses de Barèges, Luchon, Louesche, Schlangenbad, etc., en bains, en douches.

61. Sycosis ou mentagre. — Symptomes. — 1° Locaux: Petites pustules acuminées se rompant spontanément et formant une croûte; puis éruption successive et plus ou moins abondante, avec tension douloureuse, rougeur, induration, pouvant amener la chute des poils de barbe.

2º Généraux : Nuls.

Ne pas confondre avec acné (61), impétigo (62).

TRAITEMENT. — Local: Applications émollientes, glycérine, décoction de graine de lin; cataplasmes de fécule; boissons acidules; ne pas irriter la peau; cesser l'usage du rasoir; douches de vapeur; lotions de sublimé quand la période aigu est passée; voir Acne punctata (60).

24	Sublimé	0sr,50 à 1	gr.
Age of the	Alcool	10	_
	Eau distillée	500	1000

62. Impétigo. - Symptomes. - 1º Locaux : Sur des faches rouges, saillantes, douloureuses, apparition de petites pustules confluentes donnant lieu à la formation de croûtes molles, jaunâtres, couleur de miel, épaisses, irrégulières, se renouvelant par la dessiccation d'un suintement plus ou moins abondant et laissant après elles des empreintes persistantes : engorgement des ganglions correspondants. — Quelquefois les pustules reposent sur des taches érysipélateuses (I. erysipelatodes). -Elles sont disséminées, éparses, occupant les membres (I. sparsa). - Donnant issue à un liquide ichoreux, brunâtre. fétide (I. scabida, mélisagre dartreuse). — Elles occupent le cuir chevelu, accompagnées d'inflammation, de démangeaison, de suintement, de croûtes brunâtres, à odeur nauséabonde, avec présence de poux nombreux (I. granulata, porrigo). - Elles occupent le visage des jeunes enfants (I. larvalis), la tête (croittes de lait). — Dans d'autres cas, démangeaison, dépression, suintement : cicatrice centrale, déprimée, froncée, lisse, s'étendant de l'angle interne de l'œil aux côtés du nez, ou bien gagnant en profondeur (I. rodens).

2º Généraux: Nuls, ou bien malaise, inappétence, céphalalgie. Ne pas confondre avec herpès (55), eczéma (53, 54), pemphi-

gus (57, 58), rupia (59), ecthyma (63).

TRAITEMENT. — 1º Local: Cataplasmes de fécule; lotions émollientes, calmantes; glycérine, huile d'amandes douces; poudre d'amidon; glycérolé d'amidon; bains tièdes; couper les cheveux, lotions d'eau tiède et de lait.

Contre l'impetigo rodens: Toucher avec la teinture d'iode, le nitrate d'argent, les caustiques de Vienne, de Canquoin, de

Filhos; loctions chlorurées, vineuses.

2º Général: Boissons rafraîchissantes, acidules, limonade; repos; régime; émissions sanguines au besoin (?), laxatifs légers (53).

A l'état chronique: Bains sulfureux; bains de mer; douches de vapeur, douches sulfureuses. Combattre la diathèse dominante (54).

63. **Ecthyma.** — Symptomes. — Locaux: Pustules larges, arrondies, à base rouge, enflammée, dure, auxquelles succèdent des croûtes brunes, épaisses et une cicatrice (E. aigu). —

Plus larges, moins circonscrites, ayant une aréole rouge violacé, contenant une humeur purulente, noirâtre, se convertissant en croûtes brunâtres au-dessous desquelles est une cicatrice. S'observe surtout aux jambes, chez les sujets cachectiques (E. chronique, infantile, livide, cachectique).

Ne pas confondre avec rupia (59), impétigo à l'état chroni-

que (62).

TRAITEMENT. — 1º Local: Nul à l'état aigu; toniques, aromatiques, lotions de quinquina, de feuilles de noyer, cautérisation.

2º Général Bains, boissons délayantes, acidules, laxatifs à l'état aigu. Amers, ferrugineux, toniques, quinquina à l'état chronique. Combattre la diathèse.

64. Teigne, favus, porrigo. — Symptomes. — Locaux : Petites pustules du cuir chevelu jaunâtres, déprimées en godets appelés godets faviques, traversées par un cheveu dont le diamètre va en augmentant, isolées ou confluentes, à odeur caractéristique, accompagnées de rougeur de la peau, de prurit et amenant l'alopécie.

Ne pas confondre avec impétigo (62), porrigo larvalis (62); herpès

tonsurant ou porrigo scutulata (55), pityriasis (67).

TRAITEMENT. — Local: Epilation avec une petite pince à mors, après avoir frictionné pendant quelques jours avec une pommade à l'huide de cade (2 gr.), à l'huile de noix d'acajou (0gr,50 à 1 gr., axonge 30 gr.), une pommade alcaline; renouveler l'épilation 4 ou 5 fois en moyenne Immédiatement après l'épilation, lotion savonneuse et imbiber avec:

24	Sublimé ou bichlorure de mercure	3 à 5	gr.
	Eau	500	_

Continuer pendant 3 ou 4 jours, puis pommade avec :

4	Axonge	1 -	15 gr.
	Huile d'amandes	aa	2 -
	Turbith minéral		0gr,50

65. Lichen. — Symptomes. — 1º Locaux: Eruption simultanée ou successive de papules, petites, agglomérées, ayant la couleur de la peau ou une couleur plus ou moins rouge, avec prurit, chaleur, suivies de desquamation (L. simple aigu). — Papules ayant conservé la couleur de la peau, et formant de petites saillies appréciables au toucher; épaississement et exfoliation de la peau (L. simple chronique). — Sur une surface érythémateuse, très-nombreuses papules rouges, enflammées, saillantes, luisantes, avec chaleur ardente, cuisson et démangeaisons; puis

petites ulcérations sur les papules, surface chagrinée, squames (L. agrius).

2º Généraux: Nuls ou peu prononcés, excepté dans le lichen agrius où le moral s'affecte.

Ne pas confondre avec prurigo (66), eczéma (54).

TRAITEMENT. — 1º Local: Fomentations, lotions, bains émollients, mucilagineux, narcotiques; lotions alcalines, mercurielles (13). Pommades alcalines, au goudron, glycérolé de goudron; en duire avec un pinceau trempé dans l'huile de cade pure; pommade avec:

24	Axonge	30 gr.
150005	Calomel	4 -
	Camphre	-

lotions vinaigrées; cautérisation au nitrate d'argent.

2º Général : Régime sévère ; limonade, pas d'alcooliques ni de café : bonne hygiène.

66. Prurigo. — Symptomes. — Locaux: Papules un peu plus larges que celles du lichen, isolées, sans changement de couleur à la peau, avec prurit plus ou moins intense et surmontées d'une croûte noire de sang coagulé, produite par le grattage (P. mitis on formicans). — Se manifestant chez les vieillard (P. senilis). — A la marge de l'anus (P. podicis). — Au pourtour de la vulve (P. pudendi ou prurit de la vulve). — Au pubis produit par des morpions (P. pubis ou pedicularis).

Ne pas confondre avec lichen (65), dont les papules sont plus petites, eczéma (53, 54), gale (56), qui a son sillon caractéristique.

Traitement. 1º Local: Bains alcalins, narcotiques, sulfureux, à une température élevée; bains, douches de vapeur; bains de sublimé (sublimé 16 gr., alcool 100 pour un bain); fumigations mercurielles (cinabre 30 à 60 gr. sur des charbons ardents); pommade camphrée, ou cyanure de potassium (2 gr.), ou borate de soude (3 à 4 gr. pour 30), ou goudron (2 à 4 gr. pour 30); glycérolé de goudron; pommmade d'Helmerich.

2º Général: Amers, toniques, ferrugineux, hon régime si la constitution est mauvaise; pilules de Méglin, sulfate de qui-

nine, préparations arsenicales (54).

67. Pityriasis. — Symptomes. — Locaux: Exfoliation incessante, farineuse de l'épiderme avec ou sans démangeaison, la peau étant plus rouge (P. rubra), — jaunâtre (P. versicolor), — noirâtre (P. nigra), — ou bien restant normale (P. alba), — se manifestant au cuir chevelu (P. capitis), au menton, dans les parties couvertes de barbe, pouvant amener la chute des poils.

Ne pas confondre avec lichen (65), eczéma (53, 54) ichthyose (69).

TRAITEMENT.—1° Local: Eviter d'irriter les cheveux ou la barbe avec le peigne ou le rasoir; se servir de brosses et de ciseaux, lotions alcalines (sous-carbonate de potasse, 4 gr. pour 500 d'eau); lotions émollientes; glycérine; lotions de sublimé; pommades:

4			30 gr. 24	Axonge Turbith minér	ral	30 gr. 0sr,50à2sr.
	4	Axonge			30 gr.	aleksaku kep

2º Général: Boissons acidulées; laxatifs; régime non excitant; bains simples, sulfureux.

68. Psoriasis. — Symptomes. 1º Locaux: Squames épidermiques, sèches, lamelleuses, épaisses, d'un blanc terne, argenté, nacré, imbriquées, de forme et d'étendue variables, adhérentes à la peau, recouvrant une surface épaisse, saillante, d'une couleur rouge foncée, avec ou sans démangeaison: selon la forme, le psoriasis se montre en saillies ponctuées (P. punctata); — en points isolés plus considérables (P. guttata); — en disposition rubanée (P. gyrata); — en disques plus ou moins réguliers, le centre restant sain (P. circiné ou lèpre vulgaire); — en forme irrégulière (P. diffusa); — aux mains, aux ongles, aux pieds, au prépuce, aux lèvres, aux paupières.

2º Généraux: Peu prononcés ou nuls. Ne pas confondre avec eczéma (53, 54).

TRATTEMENT. — 1º Local: Pommades sulfureuses, alcalines, mercurielles (53, 54); pommade au goudron (4 gr. pour 30); pommade à l'iodure de soufre (1 gr. à 1 gr. 50 pour 30); pommade à l'huile de cade (0 gr. 50 à 5 gr. pour 30); pommade au précipité blanc (4 gr. pour 30); bains émollients, sulfureux, de sublimé (56), alcalins (sous-carbonate de polasse, 125 à 150 gr.); bains, douches de vapeur.

2º Général: Indispensable pour obtenir la guérison; tisane de salsepareille additionnée de daphné mézéréum (1 gr.); décoction de Zittmann; sirop de Peyrille, une à quatre cuil. par jour.

24	Sous-carbonate d'ammoniaque		
	Sirop sudorifique		_

Préparations arsenicales (54) excellentes dans cette maladie; solution de Pearson (arséniate de soude), solution de Biett (ar-

séniate d'ammoniaque) 0,50 à 2 gr. par jour, moitié matin et soir; solution de Fowler (arsénite de potasse), de 3 à 10 gouttes : pilules de Dioscoride (acide arsénieux), 5 à 15.

Pilules asiatiques, 1 à 3; surveiller les préparations arsenicales. Chercher la diathèse herpétique, arthritique, syphilitique, etc. (54); ferrugineux en cas de chlorose; régulariser les fonctions digestives; baume de copahu; opiat de copahu et magnésie, parties égales; eaux minérales sulfureuses ou alcalines selon les indications.

69. Ichthyose. — Symptomes. — Locaux: Peau sèche, squameuse, épaisse, fendillée, rugueuse, sans douleur ni démangeaison.

Ne pas confondre avec pityriasis (67), eczéma (53, 54), lichen (67).

Traitement. — Local: Lotions mucilagineuses, bains émollients, bains de vapeur.

CHAPITRE III

EMPOISONNEMENTS ET ASPHYXIES

I. — Empoisonnements. — Présomption d'empoisonnement. — Division des poisons. — Symptômes généraux. — Traitement général. — Des poisons en particulier et de leurs contre-poisons.

II. — Asphyxies. — Asphyxie en général. — Pendaison ou étranglement. — Submersion et asphyxie des noyés. — Asphyxie par les gaz méphitiques, gaz de l'éclairage, vapeurs de charbon, air vicié, fermentation alcoolique, etc. — Asphyxie par la chaleur. — Asphyxie par le froid.

SECTION I.

EMPOISONNEMENTS.

70. **Présomption d'empoisonnement.** — Quand une personne bien portante est prise tout à coup de coliques, d'envies de vomir ou de vomissements, à la suite d'ingestion de boissons ou d'aliments, on devra soupçonner un empoisonnement