Narcotiques pour calmer la toux, extrait thébaïque (0,03 à 0,15) en potion ou pilules; sirop diacode, de morphine, de codéine; sirop de lactucarium: looch.

Emplâtres de poix de Bourgogne, de diachylon sur le côté douloureux; large vésicatoire camphré quelques jours après le début; cataplasmes laudanisés; sur le déclin, badigeonnage avec la teinture d'iode.

Émétique (0,05 à 0,10,) en cas d'embarras gastrique ; maintenir le ventre libre.

24	Calomel	i gr.
	Scille	0gr,50
	Digitale	0gr,25
F.	s. a 10 pilules: une matin et soir	

Repos au lit; température douce; silence; diète au début; laitage. En cas de suffocation imminente, thoracentèse (265).

316. Pleurésie chronique. — Symptomes. — Douleur locale obtuse, fugace; respiration gênée; dyspnée en rapport avec la quantité de l'épanchement; toux sèche; dilatation du côté malade; immobilité des côtes; absence de vibration thoracique; matité étendue; pas de bruit respiratoire à la base; égophonie. Fièvre lente avec redoublement; amaigrissement; pâleur; œdème souvent borné au membre supérieur du côté affecté.

Ne pas confondre avec pneumonie chronique (369), phthisie (311).

TRAITEMENT. — Toniques, quinquina, lichen; vésicatoires volants, cautères, moxas; pommade stibiée; opiacés pour calmer la toux; mercuriaux en frictions; calomel; huile de foie de morue; teinture d'iode sur la poitrine; diurétiques:

24	-Vin blanc	750 gr.
1121	Baies de genièvre	50 —
	Feuilles de digitale	10 —
	Scille	5 —
F	aites macérer pendant 4 jours et ajoutez :	
	Acétate de potasse	15 grammes.
Filt	rez. Deux à trois cuill, à bouche chaque jour (Troi	isseau).

THORACENTÈSE. — Indications: Épanchement assez considérable pour suffoquer le malade; syncopes. Contre-indications: tubercules, cancer. (Pour l'opération, voir 265.) Pour la ponction, préférer un trocart presque capillaire (Blachez). Appareil Dieulafoy. La ponction faite, s'il ne sort pas de liquide: faire respirer largement le malade; introduire un stylet ou une

aiguille à tricoter dans la canule pour rompre les brides ou obstacles; ou bien faire une nouvelle ponction.

Contre les quintes de toux, incliner la canule pour éviter son contact avec la plèvre.

Contre les épanchements purulents, injections d'abord aqueuscs, puis aromatiques, puis vineuses ou iodées :

24	Teinture d'iode	50 pr.
188)	Iodure de potassium	3 -
	Eau distillée	100 -
M	langer cette solution avec égale quantité d'eau tie	ède.

317. Asthme. — Symptomes. — Invasion presque toujours subite, le soir ou au milieu du sommeil, le plus souvent à la même heure; dyspnée plus ou moins considérable, parfois précédée de troubles gastriques, de pandiculations, de congestions oculaire, nasale, bronchique; gêne, oppression considérable; attitudes bizarres prises par le malade qui cherche à lutter contre la suffocation; tête en arrière, bouche entr'ouverte; sueurs froides, face congestionnée; toux sèche au début, écumeuse à la fin; retour à la santé après une, deux, trois heures: absence de fièvre et de symptômes généraux; pouls petit; battements de cœur précipités.

Inspiration lente, pénible, sifflante; à l'auscultation, râles vibrants, sibilants, sonores, bullaires, sous-crépitants; en certains points, absence du murmure respiratoire. A la percussion, résonnance. Expectoration spumeuse, aérée, contenant des concrétions blanchâtres, quelquefois sanguinolentes, crachats perlés.

Ne pas confondre avec emphysème pulmonaire (304), catarrhe suffocant (302), dilatation bronchique (303), laryngite striduleuse (255, IV), angine de poitrine (318), hystérie (44).

Traitement. — 1º De l'accès: Placer le malade de façon à faciliter sa respiration; desserrer ses vêtements, donner accès à l'air. S'il est fort et vigoureux et atteint d'affection des poumons ou du cœur, saignée du bras; sinapismes sur les côtés de la poitrine, aux bras, aux jambes; teinture de lobélie ensiée (1 gr. en potion).

2º Préventif. Fumer les feuilles de datura stramonium, de sauge, de belladone, de jusquiame, de phellandre aquatique, introduites dans une pipe ou du papier, avoir soin d'inhaler la fumée; cigarettes Espic; cigarettes arsenicales (voir Emphysème visiculaire, 304), cigarettes nitrées; toucher le fond du pharynx avec un pinceau trompé dans

Eau distillée an 45 gr.

ou bien inspirer les vapeurs de cette eau ammoniacale; inhalation d'eau créosotée (créosote 1 gr., eau 500), d'eau phéniquée (acide phénique 1 gr., eau 500); inhalation d'air chargé d'acide carbonique, de vapeurs d'usine à gaz; quelquefois éther, chloroforme: faradisation; potions calmantes, éthérées; demi-layements avec l'asa fœtida (2 à 4 gr.), le camphre (2 gr., suspendus dans un jaune d'œuf; pilules de belladone (extrait de belladone et poudre de belladone aa 0,01) 1 à 4 chaque soir. pendant 10 jours : les 10 jours suivants, sirop ou capsules de térébenthine (1 à 4 par jour); les 10 autres jours, cigarettes arsenicales.

Si l'asthme est déterminé par une maladie du cœur (Bro-

mure de potassium 5 à 10 gr. voir : (330.)

Traiter la diathèse qui a déterminé l'asthme : Contre le lumphatisme, le scrofulisme (26), poudre de soufre sublimé et lavé, une cuillerée à café le matin dans du miel; bains sulfureux; eaux sulfureuses, Eaux-Bonnes, etc., bains de mer; séjour à la campagne; exercice modéré. (Voir 26).

Con're l'herpétisme: Préparations sulfureuses et surtout arse-

nicales; eaux du Mont-Dore, La Bourboule :

24 Sirop antiscorbutique.... 300 gr. 24 Arséniate de soude..... 0sr,05 Arséniate de soude..... 0sr,05 Une cuill. chaque matin.

Eau distillée..... 100 gr. Une cuill, à café avant chaque repas.

ou bien iodure de potassium (0,25 à 0,50) par jour. (Voir page 55.)

Contre l'asthme arthrisque ou goulteux : vomitifs, purgatifs drastiques (jalap, scammonée, aloès); chlorhydrate d'ammoniaque (1 à 4 gr. par jour en potion); expectorants, kermès; tisane d'hysope, de lierre terrestre, de marrube. (Voir Gouite, 25.)

Contre l'asthme syphilitique: Protoiodure de mercure quelquefois; iodure de potassium (1 à 2 gr.) par jour (voir 28, 29).

2º Prophylaxie et hygiène: Éviter l'air chargé de poussières végétales, le brouillard, l'air vif, le froid. Flanelle; vie sobre; pas d'alcooliques; quelques purgatifs; quelquefois exutoire au bras, comme dérivatif.

318. Angine de poitrine. — Symptomes. — Douleur subite, vive, déchirante, derrière le sternum, à la région précordiale, s'irradiant au cou, au bras gauche, dans toute la poitrine; respiration suspendue à cause de la douleur qu'elle provoque;

quelquefois, exceptionnellement, grandes inspirations; menace de suffocation, pâleur, pouls fréquent, petit, irrégulier ou régulier, selon l'état du cœur; éructations; courbature, Maladie se manifestant par accès up no nolvirsib ab orlaligne : sisterel

Ne pas confondre avec asthme (317), névralgies, maladies du cœur (320 et suiv.).

TRAITEMENT. - Pendant l'accis: Saignée s'il y a complication cardiaque, pléthore. Opium à haute dose; extrait thébaïque (0.10 à 0.20 en potion); pédiluves sinapisés; sinapismes dans le dos; inhalations de chloroforme; vésicatoires pansés avec la morphine; lavement avec asa fœtida (2 à 4 gr.); émétique (0,03). S'il y a complication gastrique, plonger le bras douloureux dans l'eau chande.

Pour prévenir l'accès : Toniques, ferrugineux: Antipériodiques, sulfate de quinine. Antispasmodiques; faradisation. Rappeler la goutte aux extrémités en cas de métastase goutteuse.

Prophylaxie: Vie tranquille; régime sévère; s'abstenir de vin, d'alcooliques, de café; usage de flanelle : liberté du ventre; bains de mer, de rivière, affusions froides; éviter la mar-

che contre le vent, ou l'ascension des montagnes.

319. Coqueluche. - Symptomes. 1º Locause et fonctionnels: Au début, bronchite simple, puis peu à peu quinteuse; quintes convulsives à intervalles plus ou moins rapprochés, se manifestant brusquement, pendant l'expiration, par une série trèsrapide de secousses de toux courtes et réitérées avec inspiraration sifflante; symptômes d'asphyxie; face violacée, yeux saillants, larmoyants; quelquefois sueurs froides pendant les quintes, accompagnées de vomissements, d'hémorrhagie nasale, de mouvements convulsifs. Retour plus ou moins fréquent des quintes de toux, surtout à la suite de cris, de pleurs, de contrariétés, et donnant lieu à une petite ulcération au frein de la langue; souvent glycosurie; douleurs pectorales après les accès de toux; convulsions; rougeur du fond de la gorge. A l'auscultation, absence de bruit respiratoire pendant les quintes.

2º Généraux: Nuls ou peu sensibles; quelquesois complications pulmonaires, emphysème, pneumonie, bronchite, tuberculisation, hémoptysie.

Ne pas confondre avec bronchite aiguë (300), laryngite striduleuse, (255, IV), tuberculisation des ganglions bronchiques.

TRAITEMENT. - Tisane pectorale, tilleul, feuilles d'oranger, serpolet, mauve, coquelicot, capillaire, etc.

S'il y a phleymasie bronchique ou congestion : vomitifs, tartre

stibié (0.05); poudre et siron d'inéca mélangés; ventouses sèches ou scarifiées sur la poitrine : rarement émissions sanguines: pédiluyes sinapisés, sinapismes; lavements émollients ou laxatifs: emplatre de diachylon ou quelquesois vésicatoires sur la poitrine; légers laxatifs, calomel (0.50 à 1 gr.), mauve, sirop de chicorée, rhubarbe.

Matin et soir, narcotiques, antispasmodiques, sirop diacode (15 à 50 gr.), sirop de morphine (5 à 20 gr.); extrait thébaïque (0.01 à 0.05); sirop de lactucarium; eau de laurier-cerise (1/2 cuill. à café); belladone, bromure de potassium (1 à 5 gr.) oupsions (and a spatial of agree temporal confidence

24 Poudre de racines ou de feuilles de belladone 0sr,25	24 Racine de belladone pul- vérisée0sr,05
Sucre pulvérisé 257,50	Opium pulvérisé 0sr,025
M et div. en 20 paq. 1 matin et soir.	Sucre blanc 4 gr.

4	Extrait de belladone	0gr,20
dur	Sirop d'opium	ãa 30 gr.

1 à 8 cuill, à café dans les 24 h. en augmentant insensiblement jusqu'à diminution des symptômes.

S'il v a contre-indication à l'usage interne des narcotiques, telle que arrêt des sécrétions, etc., frictions épigastriques ou axillaires avec la pommade à la belladone (0,60 pour 30).

A la fin de chaque repas une cuill, à café, ou à soupe, d'infusion chaude de bon café. Diminuer peu à peu l'alimentation. S'il y a lympha'isme: Toutes les 2 h. une cuill. de la potion:

4	Cochenille	24 Cochenille	0,25
	Sucre pulvérisé	Sucre	15
	Eau distillée		
	confront empolately the	Solution à chaud de la coc	henille

ou bien, looch blanc de 120 gr. additionné de sous-carbonate de fer (1 gr.). Soufre sublimé et lavé, une forte pincée toutes les 2 h. Sirop d'éther, chloroforme (6 à 8 gouttes) en potion ou dans une cuill. de sirop; oxyde de zinc (0,05 à 0,15) toutes les 3 h. ou:

4	Oxyle de zinc	ãa 0gr.10
2000	Sucre	
Un p	aquet toutes les 2 heures; cesser s'il survient de l	a diarrhée.

Asa fœtida (2 à 4 gr.); camphre (2 gr.) en lavement; alcoo-

lature d'aconit (1 à 2 gr.) en potion. Inhalations de vapeurs d'usine à gaz; inhalations de chloroforme; cautérisation pharyngienne : sulfate de quinine.

Précautions hygiéniques et prophylactiques : éloigner les enfants du fover épidémique; flanelle; sirop de belladone additionné d'alcoolature d'aconit (1 gr.); un peu de café noir.

SECTION II.

MALADIES DU COEUR.

320. Mesure du cœur par la percussion. - La grande figure ovalaire (fig. 113) indique la dimension normale du cœur (11à 12 centim.) transversalement, et verticalement de 9 centim. La netite figure ovale représente l'atrophie extrême chez l'adulte (8 centim. sur 5 ou 6). Les lignes courbes diversement nonctuées désignent les divers degrés d'augmentation de vo-




Fig. 113. - Dimension du cœur.

lume (Piorry). - La pointe du cœur correspond au 5e espace intercostal et bal entre la 5e et la 6e côte (Bouillaud), un peu en dedans d'une ligne verticale passant par le mamelon. Les orifices ventriculo-artériels sont situés au niveau du bord antérieur de la 3º côte, vers la réunion des cartilages costaux avec le sternum; les orifices auriculo-ventriculaires occupent l'espace compris entre la 3º et la 4º côte gauche.

32) bis. Tableau pathognomonique des bruits de souffic. (Cerlieu.) an interested of anotheleful exact someth

1. AVANT LA SYSTOLE OU PRÉSYSTOLIQUE Rétrécissem. auriculo-ventricul. / 1º A la base et à la pointe. I Chloro-anémie. 20 A la base avec propaga-tion dans les grosses ar-Lésion des valvules aortiques II. Systolique ou

tères.... (avec ou sans rétrécissement). 1er TEMPS..... Lésion de la valvule auriculo-30 A la pointe..... ventricu aire (avec ou sans inur par la percuezion.

III. DIASTOLIQUE OU A la base Insuffisance aor ique. 2° TEMPS..... A la pointe (se confond avec { Rétrécissement auriculo-ventri-le présystolique)...... culaire.

(ler temps. . | Rétrécissement aortique A la base IV. DEUX BRUITS DE 2º temps... | Insuffisance aortique. SOUFFLE..... (1er temps. . (Insuffisance auriculo-ventricul. anec Présystoliq. Rétrécissem. auricul.-ventricul.

1º Dans les Rétrécissements auriculo-ventriculaires, le maximum du bruit est à la pointe.

2º Dans les Rétrécissements aortiques, le maximum est à la base et se propage le long de l'aorte et dans les carotides.

3º Dans les Insuffisances aortiques, bruit au 2º temps avec maximum à la base.

4º Dans les Anémies, souffle léger au 1er temps, toujours à · la base et quelquesois en même temps à la pointe.

321. Endocardite aiguë simple. — Symptomes. — Souvent à la suite de refroidissement, de rhumatisme, de sièvre éruptive : douleur, voussure, matité précordiales dans un espace variant de 11 à 13 centimètres carrés, surtout quand il y a complication de péricardite, ce qui est presque constant. Impulsion du cœur forte, soulèvement de la paroi antérieure du thorax, frémissement vibratoire; battements de cœur ordinairement réguliers; pouls fort, sec au début, petit, misérable et intermittent à la fin. Murmure valvulaire; bruits sourds; bruits de soussle ou de râpe. Dyspnée.

Le bruit de souffle varie selon le siége précis de l'inflammation qui occupe le plus souvent la valvule mitrale ou gaucl e; et, si elle est assez considérable pour faire obstacle au cours du sang:


1° Obstacle ou rétrécissement à l'orifice auriculo-ventriculaire gauche (VM): bruit de souffle et de râpe.

2º Rétrécissement à l'orifice artériel présystolique ou aortique : bruit de souffle et de râpe pendant le premier temps et à sa base. In to consider start

3º Insuffisance des valvules aortiques ou sigmoïdes qui laissent refluer le sang dans le ventricule, nendant la dilatation cardiaque: bruit de souffle au second temps et à la base (320).

Ne pas confondre avec péricardite (336, 337), palpitations nerveuses (338).

Il est difficile de distinguer si la phlegmasie est à droite ou à gauche (Stokes); quatre fois plus fré- Fig. 114. - Coupe théorique du quente à gauche qu'à droite.



TRAITEMENT. - Mauve, tilleul, sureau, chiendent nitré, etc., en abondance: lait nitré ou coupé avec de l'eau de Vichy. Si l'oppression est considérable : saignées larges et répétées au besoin; 15 à 20 sangsues ou ventouses scarifiées sur la région précordiale, y revenir selon les indications: s'arrêter dès que le pouls s'affaiblit : en même temps, ou bien 2 à 3 pil. de digitale puly. (0,05); ou granules de digitaline, 1 à 6; teinture de digitale, 10 à 30 gouttes, progressivement; siron de digitale.

4		250 gr.
0000	Feuilles de digitale	1 à 2 gr.
	Nitrate de potasse	G G A BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR B
	Eau de laurier-cerise	10 à 15 gr.
	Sirop de guimauve	35 gr.
	Une cuill, toutes les heures.	A STREET,

Si l'endocardite est rhumatismale, alcalins à haute dose, combinés avec les potions stibiées (0,25 à 0,40). Fomentations émollientes et narcotiques sur le cœur; décoction de graine de lin, de têtes de pavot, de morelle, etc.: être très-réservé sur l'emploi des vésicatoires à la période d'acuité.

(*) A, aorte: AP, artère pulmonaire; VP, veines pulmonaires; OG, oreillette gauche; VM, valvule mitrale ou auriculo-ventriculaire gauche ou bicuspide; VG, ventricule gauche; VD, ventricule droit; VCI, veine cave inférieure; VT, valvule tricuspide ou auriculo-ventriculaire droite; OD, oreillette droite; VCS, veine cave supérieure. — Valvule sigmoïde à l'orifice aortique.

Maintenir la liberté du ventre, à l'aide de laxatifs légers, calomel (0,30 à 0,40), ou à dose réfractée (0,05 pour sucre 20 gr.) en 10 prises, 1 toutes les h.; limonade purgative, lavements laxatifs ou émollients. Poudre de Dower (0,30 à 0,50) le soir.

Diète absolue: repos au lit; éviter les émotions et les refroidissements. — S'il survient de l'adynamie, régime et médica-

tion tonique.

321 bis. Endocardite chronique. — Donne lieu à des altérations valvulaires, voir ces maladies (322, 329).

322. Rétrécissement auriculo-ventriculaire gauche ou mitral. — Symptomes. — Impulsion précordiale, frémissement cataire, coïncidant avec le second temps.

Souffle de râpe, de lime, de scie, d'aspiration un peu avant le premier temps ou présystolique, se prolongeant vers la pointe, où il est plus intense. (Quelques médecins considèrent la présystole comme la fin du second temps.)

Pouls petit, irrégulier, intermittent.

Congestions pulmonaires, dypsnée, orthopnée: veines jugulaires dilatées, pouls veineux, cyanose, anasarque.

Ne pas confondre avec rétrécissement aortique (326), insuffisance aortique (327), palpitations nerveuses (338).

TRAITEMENT. — Voir le traitement général de toutes les maladies du cœur (330).

323. Insuffisance auriculo-ventriculaire gauche ou mitrale. — Symptomes. — Bruit de souffle, de râpe, de scie, un peu avant ou pendant le premier temps, perçu à la pointe et se prolongeant jusqu'au commencement du second temps.

Pouls petit, irrégulier, intermittent; frémissement cataire. — Maladie n'existant qu'exceptionnellement à l'état simple, mais accompagnant presque toujours le rétrécissement mitral.

324. Rétrécissement auriculo-ventriculaire droit ou tricuspide. — Très-rare; n'existe que conjointement avec des altérations valvulaires mitrales, souffle présystolique à la base.

325. Insuffisance tricuspide ou auriculo-ventriculaire droite. — Presque toujours compliquée de rétrécissement aortique ou mitral.

Souffle au 1er temps, ayant son siège à la pointe dans la ré-

gion du ventricule droit.

Pouls petit, irrégulier, intermittent, perceptible aux jugulaires (caractéristique des maladies du cœur droit). — Congestions passives, hydropisies quand l'insuffisance est compliquée de rétrécissement mitral. 326. Rétrécissement aortique ou sigmoïde. — SYMPTOMES. — Bruit de souffle, de râpe, de scie pendant et à la fin du premier temps et quelquefois pendant le silence qui précède le second temps, ayant son maximum d'intensité à la base du cœur, se prolongeant quelquefois dans l'aorte et les vaisseaux carotidiens, nul vers la pointe.

Pouls petit, faible, fréquent, quelquesois irrégulier; frémissement cataire. Palpitations, dyspnée; quelquesois coloration de la face, douleur locale; hydropisies moins intenses et plus tardives; œdème local, puis général; exceptionnellement

pouls veineux.

Ne pas confondre avec insuffisance aortique (327), rétrécissement mitral (322), palpitations nerveuses (338).

TRAITEMENT. — Essentiellement tonique; pas d'émissions sanguines. Digitale en cas de battements très-précipités.

327. Insuffisance aortique ou sigmoïde. — Symptômes. — Début quelquefois lent et graduel, d'autres fois brusque.

Bruit de soufste au second temps, couvrant le second bruit qu'on peut cependant entendre distinctement dans le trajet de l'aorte, dans les carotides et les axillaires, ayant son maximum d'intensité un peu au-dessus de la base du cœur; double souffle intermittent au niveau de l'artère crurale.

Pouls large, développé, régulier, ondulant, perceptible dans le trajet des principales artères dont les superficielles battent à l'œil nu, surtout quand le malade élève le bras. Intervalle marqué entre le battement du cœur et la pulsation d'une aratère éloignée. Palpitations; impulsion forte, étendue; matité précordiale; dyspnée; orthopnée; face bleuâtre; pouls veineux; bourdonnements; éblouissements; vertiges; insomnie; œdème yers la fin de la maladie; quelquefois crachement de sang.

Ne pas confondre avec rétrécissement mitral (322), rétrécissement aortique (326), insuffisance mitrale (323) et tricuspide (324), palpitations nerveuses (338). Traitement. — Voir Anévrisme actif (334).

323. Insuffisance avec rétrécissement. — Symptômes. — Deux bruits de souffle qui se suivent immédiatement; mouvement de va-et-vient; le premier dur, rude, le second très-fort, mais doux, ayant son maximum à la base du cœur, s'entend plus ou moins sur le trajet de l'aorte.

Pouls moins large, moins développé, moins ondulant.

329. Angine de poitrine. — Symptomes. — Quelquefois signes précurseurs, malaise, bouillonnement dans le côté gau-

che; puis douleur poignante, pongitive, constriction derrière le sternum, un peu à gauche et en bas, s'étendant dans le cou, dans le bras, le long du nerf cubital, et quelquefois d'une mamelle à l'autre. Suspension momentanée de la respiration produite par la crainte de la douleur; respiration gênée; éructations; besoins d'uriner; pouls petit, régulier; anxiété, abattement: retour à la santé et rechutes.

Ne pas consondre avec asthme (317), névralgie brachiale,

lésion des valvules du cœur (322 à 327).

Tranquillité d'esprit; éviter les fatigues, les marches contre le vent, les excès de boissons ou d'aliments, les rapports vénériens, le froid, la constipation.

2º Médical: Opiacés à haute dose; extrait thébaïque (0,03 à 0,15) en potion; belladone (0,01 à 0,10); extrait de jusquiame (0,03 à 0,15); poudre de Dower (0,50); eau de laurier-cerise; digitale (0.05 à 0,10); solution de Fowler (6 gouttes, 3 fois par jour); quelquefois émétique (0,10); chloroforme en inhalation; sinapismes sur la colonne vertébrale.

4	Eau distillée de tilleul	100 gr.
A(0.1)	Extrait thébaïque	0gr 10
BHXS	Extrait de digitale	0gr 10
ole so	Eau de laurier-cerise	10 gr.
Seure.	Sirop simple	30 —

F. s. a. potion, à prendre par cuillerées.

Électricité (?); immersion du bras douloureux dans l'eau chaude; vésicatoires, sinapismes, cautères, moxas sur les points douloureux; combattre la diathèse goutteuse si elle existe (25).

330. Traitement des maladies du cœur. — Éviter les fatigues, les émotions, les excès, les rapports sexuels, les vêtements serrés.

1º Il existe encore des symptômes inflammatoires, sans hydropisie. — Tisane de chiendent avec addition de nitrate de potasse (1 à 5 gr.), mauve, pariétaire, reine-des-prés ou spirée ulmaire, fleurs de sureau, pervenche, queues de cerises, lait coupé, baies de genièvre, genêt à balai, racine de fraisier, busserole, etc.

Saignées du bras répétées selon les indications; sangsues, ventouses, loc. dol., surtout dans les cas de rétrécissement : peu ou pas de saignée dans l'insuffisance aortique.

Sirop, pilules, teinture de digitale, potion de digitale, p. 281; infusion de feuilles de digitale (0,25 à 0,50 pour 125 gr. d'eau ou 0,50 en macération froide dans un 1 litre d'eau); granules de digitaline. Sirop de pointes d'asperges.

Teinture de veratrum viride (Oulmont). Calomel, lavements

purgatifs. Diète, bouillon, laitage; repos du corps et de l'esprit.

2º Les symptômes inflammatoires sont peu prononcés, il n'y a pas d'ædème. — Même traitement; peu ou pas de saignées; vésicatoires volants, cautères, sétons, huile de croton sur la région précordiale.

3° Il y a hydropisie, ædime. — Mêmes tisanes, nitrate de potasse (2 à 5 gr.), bitartrate de potasse (15 gr.), acétate de potasse (1 à 10 gr.); petit-lait nitré; scille en poudre (0,20 à 0,30), en extrait (0,02 à 0,10), en teinture (4 gr. dans une potion), en oxymel (10 à 50 gr. en potion), en miel scillitique (10 à 50 gr.); en vin (10 à 50 gr.); vin amer scillitique ou diurétique de la Charité (10 à 100 gr.). Colchique, en teinture (1 à 5 gr.), vin de semences de colchique (5 à 20 gr.). Racine de caïnca (10 à 30 gr. en décoction).

24 Vin blanc	
Baies de genièvre	CLUBAN CHAPTER 50 CO CONTROLL
Feuilles de digitale	10007 em2010 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Scille	5 =mitomA
Faites macérer et ajoutez:	5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Acétate de potasse	15 grammes.
Filtrez: 2 à 3 cuill. par jour. (Tre	ousseau.)
24 Poudre de digitale	Sirop de nerprun 30 — Séné pulvérisé Racine de jalap pulvérisée Scammonée 4 — Scille, calomel, digi-
e el Feprestrophia (533, 33 D.	tale

Combiner les purgatifs et les diurétiques; purgatifs drastiques, pilules écossaises, de Bontius; résine de jalap (0,50 à 1 gr.), gomme gutte (0,50 à 1 gr.), scammonée (0,50 à 1 gr.); calomel (0,25 à 0,75), aloès (1 à 2 gr.), huile de croton (une goutte), eau-de-vie allemande et sirop de nerprun (â 20 à 30 gr.). Être sobre des drastiques chez les vicillards. — Diète lactée, oignons crus ou cuits. (Serre d'Alais.)

3º Il y a dyspnée convulsive: Antispasmodiques, calmants par la bouche ou en lavements, asa fœtida, camphre, teinture de musc (1 gr.), de castoreum (1 gr.), valériane; révulsifs cutanés, bains de bras, sinapismes aux cuisses, sur les côtés, vésicatoires volants répétés.

5º II y a congestion cérébrale: Sangsues aux apophyses mastoïdes et purgatifs.