TRAITEMENT. — Ouverture dès qu'il y a empâtement, fluctuation.

409. **Périnéphrite.** — SYMPTOMES. — Douleurs locales profondes; fièvre sans modification des urines; tuméfaction, œdème, abcès.

*Ne pas confondre avec* lombago (297), abcès par congestion ou froids (108), carie vertébrale (294), abcès des reins (408).

TRAITEMENT. — Saignées générales et locales; cataplasmes; bains; ouvrir l'abcès de bonne heure et largement.

409 *bis*. **Lombago, névralgie lombo-abdominale,** etc. (voir aux maladies de la région dorsale, 296, 297, 298).

---

# CHAPITRE XI

## MALADIES DE L'ESTOMAC ET DES INTESTINS.

*Maladies de l'estomac.* — Indigestion. — Embarras gastrique. — Hématémèse. — Gastrite aiguë, chronique. — Ramollissement gélatiniforme des enfants. — Ulcère simple. — Cancer. — Gastralgie. — Dyspepsie. — Vomissements nerveux.

*Maladies des intestins.* — Entérite aiguë, chronique. — Dysentérie. — Hémorrhagie intestinale. — Etranglement interne. — Invagination intestinale. — Entérotomie. — Anus artificiel. — Cancer de l'intestin. — Entéralgie. — Rhumatisme gastro-intestinal. — Constipation. — Vers intestinaux.

### SECTION I.

#### MALADIES DE L'ESTOMAC.

410. **Indigestion.** — SYMPTOMES. — 1° *Locaux* : Quelque temps après le repas, sensation de pesanteur; barre, plénitude, douleur, chaleur épigastrique; dégoût, hoquet, nausées, rapports acides, fétides, à odeur d'œufs pourris; tension de l'épigastre; sonorité ou matité; vomissements alimentaires, acides, aigres; borborygmes; évacuations abondantes.

2° *Généraux*: Pouls faible; respiration gênée; céphalalgie; douleurs contusives dans les membres; congestion cérébrale pouvant simuler l'apoplexie.

*Ne pas confondre avec* étranglement intestinal (425), congestion cérébrale (164), empoisonnement.



TRAITEMENT. — Faire vomir avec le doigt, par l'ingestion d'eau tiède, le tartre stibié (0,05 à 0,10) ou l'ipéca (1 à 2 gr.); calmer les coliques par les cataplasmes laudanisés, les lavements émollients ou laudanisés; infusion de thé, de camomille, de feuilles d'oranger.

411. **Embarras gastrique.** — SYMPTOMES. — 1° *Locaux* : Anorexie; bouche amère, fade, pâteuse; langue saburrale; haleine fétide; nausées, rapports aigres, nidoreux; régurgitations bilieuses; quelquefois vomissements; anxiété, gêne épigastrique; soif vive ou nulle; constipation ou selles fétides, muqueuses, bilieuses. Souvent les intestins sont affectés concurremment avec l'estomac.

2° *Généraux* : Pouls normal ou peu agité; céphalalgie frontale; courbature; insomnie; anéantissement, prostration; coloration jaunâtre des sclérotiques, des lèvres, du sillon nasolabial; urines rares, sédimenteuses.

*Formes* : muqueuse — bilieuse — congestive — typhoïde — asthénique.

*Ne pas confondre avec* gastrite (413), fièvres éphémère, continue, simple, typhoïde (1, 2, 3).

TRAITEMENT. — Vomitifs: tartre stibié (0,05 à 0,10); ipéca (1 à 2 gr.); éméto-cathartique.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | Tartre stibié..... | 0gr,05 à 0gr,10 |
| | Sulfate de soude ..... | 25 gr. |

Purgatifs : eau de Sedlitz; sulfate de magnésie (25 à 50 gr.); sulfate de soude (15 à 25 gr.); huile de ricin (30 gr.); limonade au citrate de magnésie (45 à 60 gr.). Thé purgatif ou apozème de santé. Tisanes amères, acidules, limonade au citron; sirop de cerises, eau vineuse; petite centaurée; thé léger, chicorée sauvage, bouillon à l'oseille. Diète; pas de sangsues à moins de douleurs très-vives.

412. **Hématémèse.** — SYMPTÔMES. — 1° *Précurseurs*: Chaleur, gêne, tension à l'épigastre; douleur, malaise, anxiété, troubles digestifs; goût de sang ou de sel dans la bouche; lipothymies, pâleur, refroidissement; sueurs froides, horripilations.

2° *Caractéristiques* et *concomitants* : Nausées et vomissement *sans toux* de sang noir ou rouge, en caillots ou liquide, quelquefois mélangé avec les substances alimentaires; syncopes. Sentiment de bien-être si l'hémorrhagie est supplémentaire; dépérissement si elle complique une maladie chronique de l'estomac: selles noirâtres, sanguinolentes avec ou sans coliques. Si l'*hémorrhagie* est *interne*, anxiété, malaise; horripila-

tions, refroidissement des extrémités ; sueurs froides; abattement: petitesse et fréquence du pouls ; lipothymies ; quelquefois matité gastrique.

*Ne pas confondre avec* hémoptysie (305), épistaxis (207), gastrorrhagie symptomatique d'un cancer (417), ulcère simple de l'estomac (416).

TRAITEMENT. — Débarrasser le malade de ses vêtements ; le coucher horizontalement, la tête haute, dans un appartement aéré ; pas d'émotions morales, ni de mouvements ni d'efforts.

Tisanes: limonades citrique, acétique, sulfurique (eau de Rabel, 25 à 30 gouttes pour un 1/2 litre) ; eau glacée, salée; eau de Seltz ; glace pilée. Lavements froids, émollients ou laxatifs.

Compresses froides ; vessies d'eau glacée sur l'épigastre, ou sur les testicules. — Sinapismes aux mollets, aux bras.

Potion opiacée, astringente, par cuillerées toutes les demi-heures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞ Eau distillée..... | 200 gr. | ℞ Eau distillée..... | 100 gr. |
| Alun..... | 1 — | Perchlorure de fer liquide à 30°.... | XX à XXX gtes. |
| Extrait thébaïque.. | 0gr,05 à 0gr,10 | Sirop de grande consoude..... | 30 gr. |
| Sirop de gomme.. | 50 gr. | | |

Saignée si le sujet est pléthorique. Combattre la cause; prévenir le retour ; combattre l'anémie consécutive.

413. **Gastrite aiguë.** — SYMPTOMES. — 1° *Locaux* et *fonctionnels :* Douleur épigastrique, exaspérée par la pression, spontanée, avec élancements ; constriction, brûlure, se propageant dans le voisinage; perte de l'appétit; vomissements bilieux avec ou sans nausées ; soif nulle ou vive ; langue le plus souvent large, humide, sale dans la gastrite simple et primitive, sèche, rouge dans la gastrite secondaire ; constipation.

2° *Généraux* : Frissons erratiques ; pouls accéléré ; chaleur ; respiration saccadée ; agitation.

*Variétés* : 1° Gastrite simple, primitive; — 2° gastrite secondaire ; — 3° gastrite toxique.

*Ne pas confondre avec* embarras gastrique (411), gastralgie (416), dyspepsie (419), fièvre typhoïde (3).

TRAITEMENT. — 1° *Local* : Fomentations émollientes, narcotiques tièdes ou chaudes sur l'épigastre ; suppositoires opiacés; morphine par la méthode hypodermique (voir *Névralgies*) ; 15 ou 20 sangsues à l'épigastre, renouvelées au besoin ; ventouses scarifiées.



2° *Général :* Boissons émollientes, acidules à une douce température ; solution de sirop de gomme, de guimauve ; lait bouilli, coupé avec l'eau de gruau additionnée de 1 ou 2 cuillerées d'eau de chaux officinale : sirop diacode (30 gr.) ; extrait thébaïque (0,02 à 0,05) : pilules de cynoglosse ; lavements émollients, laudanisés. Diète absolue ; puis, régime sévère : bouillons coupés froids ou chauds, potages légers ; lait coupé, fécules ; crème de riz ; poisson, gelées de viandes.

414. **Gastrite chronique.** — SYMPTOMES. — 1° *Locaux* et *fonctionnels :* Douleurs épigastriques spontanées ou provoquées, ou bien sensation d'embarras, de picotements, de constriction, de chaleur ; inappétence ; soif variable ; langue naturelle, ou un peu rouge à la pointe avec des villosités blanches ou roussâtres au centre, le plus souvent humide ; nausées ; vomissements bilieux.

2° *Généraux* : Peu prononcés ou nuls ; quelquefois accélération du pouls, dyspnée ; mélancolie, vertiges.

*Ne pas confondre avec* gastrite aiguë (413), gastralgie (418), dyspepsie (419), cancer (417), ramollissement (415).

TRAITEMENT. — Surveiller le régime ; bouillons légers ou consommés ; viande rôtie froide, maigre ; peu ou pas de viandes grasses, de sauces, de légumes ; laitage pur ou coupé avec l'eau de chaux ; alimentation progressive.

Avant les repas : bicarbonate de soude (0,50 à 1 gr.) ; sous-nitrate de bismuth (0,20 à 0,50) ; magnésie décarbonatée (2 à 5) ; nitrate d'argent en pilules (0,01 à 0,10).

Aux repas, vin vieux coupé avec les eaux de Vichy, Carlsbad, Ems, Seltz, Marienbad, Pougues, Spa, Condillac, Bussang, Vals ; liqueur ou élixir de pepsine (1 cuillerée à bouche).

*Contre les douleurs :* Extraits d'opium, de belladone, de jusquiame (0,02 à 0,05) ; cataplasmes laudanisés ; opiacés par la méthode hypodermique ; vésicatoires volants morphinés.

*Contre la constipation :* Lavements purgatifs ; purgatifs doux, manne, huile de ricin, pulpe de tamarin, rhubarbe, thé ou apozème purgatif ; extrait de rhubarbe composé ; pil. laxatives :

| | |
|---|---|
| ℞ Extrait de fiel de bœuf. Savon médicinal..... Rhubarbe pulvérisée... } ãã 2 gr. Extrait de pissenlit.... q. s. F. s. a. des pilules de 0,20 ; 2 à 5 par jour. | ℞ Ipéca pulvérisé..... 0gr,50 Rhubarbe pulvérisée..... 2 gr. M. et div. en 10 paquets, un avant chaque repas. |

hydrothérapie ; usage de flanelle ; exercice modéré ; air pur ; peu à peu usage des toniques.

415. **Ramollissement gélatiniforme des enfants.** — Symptomes. — 1° *Locaux et fonctionnels* : Troubles digestifs; dévoiement; dépérissement; soif vive; tension de l'épigastre; douleur locale; nausées, vomissements; toux avec régurgitation; selles liquides, à odeur putride.

2° *Généraux* : Peau froide; pouls irrégulier; face ridée; cris pénibles; respiration saccadée; agitation; puis prostration, insensibilité; insomnie; quelquefois grincement des dents; yeux demi-fermés, fixes; face cadavéreuse; émaciation; muguet.

*Ne pas confondre avec* muguet (191), entérite (421, 422).

Traitement. — 1° *Curatif* : Diminuer les boissons malgré l'avidité des enfants; bonne nourrice, ou bien lait récemment trait et tiède; lait d'ânesse, de vache, de chèvre, sucré et gommé. Bains chauds, émollients, toniques, aromatiques; frictions cutanées alcooliques; sirop diacode, laudanum de Syd. (1 goutte, 4 à 5 fois par jour).

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | Extrait thébaïque | 0gr,01 |
| | Sirop de gomme | 15 gr. |
| | Eau | 90 — |

2° *Prophylactique* : Ne pas sevrer avant un an ni brusquement; bouillon gras coupé avec du lait; repas réglés; pas de fruits; ni purgatifs ni vermifuges; combattre le dévoiement par lavements amidonnés.

416. **Ulcère simple.** — Symptômes. — Douleur sourde à l'épigastre augmentant par la pression; vomissement après l'ingestion des aliments; hématémèse; inappétence; dyspepsie; constipation; amaigrissement; anémie.

*Ne pas confondre avec* gastralgie (418), gastrite chronique (414), dyspepsie (419).

Traitement. — D'abord diète complète pendant 24 h.; sangsues à l'épigastre en cas de douleurs vives; bain prolongé. Le lendemain, diète lactée; lait tiède, chaud ou froid, pur ou coupé avec l'eau de chaux (1 à 2 cuill.), l'eau de gruau; diète gélatineuse ou féculente; bouillons de veau, de poulet; gelées; fécules de maïs, de riz, d'avoine, d'orge, de pomme de terre; tapioca, semoule; eau panée et gommée; un peu d'eau gazeuse; magnésie calcinée, décarbonatée; peu ou pas de sucre ni d'opium. Bains émollients, gélatineux (colle de Flandre, 1 kil.) prolongés plusieurs heures; sous-nitrate de bismuth (2 gr.) dans du sirop de guimauve, avant chaque repas; nitrate



d'argent en pilules (0,01) pendant quelques jours; puis revenir au bismuth.

417. **Cancer.** — Symptomes. — Troubles digestifs; pesanteur à l'épigastre après les repas; douleur locale; éructations acides, inodores, ou d'œufs pourris; quelquefois vomissements; diminution de l'appétit; constipation; dépression des forces. Plus tard, après les repas, vomissements plus fréquents de boissons, d'aliments, de glaires, rarement bilieux ou sanguinolents; douleur à l'épigastre; sensation d'une tumeur, qui peut changer de place; quelquefois rénitence; abdomen normal, rétracté ou météorisé; matité à la percussion; bruits de glouglou, de ballottement; langue pâle, humide ou sèche : soif nulle. A une époque plus avancée, amaigrissement notable; teinte jaune-paille; vomissements noirâtres, sanguinolents, couleur marc de café; langueur générale, dépérissement; pouls faible, ralenti; refroidissement et œdème des extrémités.

*Siége.* — 1° *Au pylore* : distension de l'estomac tout entier; vomissements plus considérables, quelquefois revenant à plusieurs jours d'intervalle, gargouillement.

2° *Au cardia* : épigastre déprimé, matité; les malades ne peuvent prendre que très-peu d'aliments à la fois; vomissements inodores après quelques heures.

3° *Sur la totalité de l'estomac* : ni vomissement ni tumeur.

4° *A la petite courbure* : hémorrhagies, vomissement; souvent complication d'ictère.

5° *A la grande courbure* : tumeur mobile, s'étendant souvent à l'épiploon.

6° *A la paroi postérieure* : pas de signes caractéristiques.

*Ne pas confondre avec* gastrite aiguë ou chronique (13, 414), ulcère simple (416), tumeur située dans les parois abdominales, à la région sus-ombilicale et occasionnée quelquefois chez les femmes par la pression du corset, dyspepsie (419).

Traitement. — Eaux de Vichy, de Seltz aux repas; pilules de ciguë : emplâtre de ciguë :

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | Extrait de ciguë | 4 gr. |
| | Poudre de ciguë | q. s. |
| | F. s. a. des pilules de 0,10; 2 à 20 par jour. | |

Moxa, cautères, pommade d'Autenrieth à l'épigastre.

*Contre les douleurs vives* : Vésicatoires morphinés; injections hypodermiques (voir *Névralgies*); extrait thébaïque (0,05 à 0,10) en pilules; sirop de morphine, de codéine.

*Contre les vomissements* : Eau glacée; glace pilée; potion de

Rivière, eau de Seltz, de Vichy (Célestins), Saint-Galmier, Renaison, Vals, Bussang ; sachets de glace sur l'épigastre ; petit-lait ou lait clair; extrait thébaïque.

*Contre le pyrosis:* Magnésie ; bicarbonate de soude ; opiacés.

*Contre la constipation :* Lavements laxatifs, purgatifs.

*Contre la diarrhée:* Lavements laudanisés; diascordium, etc.

*Régime* composé de substances légères; bouillon froid ou chaud ; consommés, potages, gelées de viandes ; viandes blanches ou noires, etc., selon le goût du malade et leur digestibilité. Exercice modéré, bains tièdes.

418. **Gastralgie.** — Symptomes. — Névrose douloureuse de l'estomac. Douleur spontanée presque toujours vive, atroce, rarement continue, se manifestant surtout après les repas ; ni provoquée ni exaspérée par la pression qui soulage quelquefois; sensations locales bizarres éprouvées par les malades; douleurs s'irradiant dans le voisinage. Appétit normal, ou augmenté, ou diminué, ou perverti ; bruit de glouglou des liquides ; nausées et vomissements rares ; rapports nidoreux, acides ou âcres, pyrosis; éructations ; hoquet; langue habituellement normale; constipation, flatuosités, coliques ; météorisme ; quelquefois selles liquides, muqueuses, âcres, sanguinolentes; urines limpides ; hypochondrie ; quelquefois ictère. Névrose continue ou bien se montrant sous forme d'accès irréguliers.

*Ne pas confondre avec* gastrite aiguë ou chronique (413, 414), ulcère de l'estomac (416), cancer (417), dyspepsie (419).

Traitement. — Tisanes de camomille, valériane, tilleul, feuilles d'oranger; sous-nitrate de bismuth pur ou uni à la magnésie, au charbon de Belloc, à l'extrait de belladone, à l'asa fœtida :

℞ Sous-nitrate de bismuth ... 10 gr.
Extrait de belladone..... 1 —
F. s. a. 40 pil. : 2 matin et soir.

℞ Sous-nitrate de bismuth .. 2 gr.
Asa fœtida..... 15 —
Huile de valériane..... 2 —
F. des pil. de 0,10 : 5 à 10 de deux en deux heures.

℞ Teinture de noix vomique..... } ãã 10 gr.
— de castoréum..... }
M. 10 à 12 gouttes pendant l'accès.

Valériane en extrait (0,10 à 2), en poudre (1 à 4 gr.) dans du pain azyme ; aconit ; oxyde de zinc (0,10 à 0,15), eau de laurier-cerise ; perles d'éther ; extrait thébaïque (0,02 à 0,10) ; sirop de morphine, de codéine ; laudanum :



℞ Sirop de fleurs d'oranger. 100 gr.
Extrait d'opium..... 0gr,15
Extrait d'aconit..... 0gr,10
Une cuill. à café après le repas.

℞ Eau distillée de tilleul... 100 gr.
Acétate de morphine..... 0gr,05
Sirop de fleurs d'oranger. 30 gr.
Une cuill. à café après ch. repas.

Opiacés par la méthode hypodermique, petits vésicatoires pansés avec le chlorhydrate de morphine (0,02 à 0,05) (voir *Névralgies*). Teinture d'iode morphinée.

*Si le malade est faible, chloro-anémique ;* excitants avant ou après les repas ; infusions de camomille, de menthe, de cannelle, de quassia amara ; sirop d'écorces d'oranges ; poudres de cannelle, de safran, de cubèbe, de coriandre, de columbo, seules ou mélangées.

℞ Magnésie décarbonatée .... 4 gr.
Safran pulvérisé..... 3 —
Cannelle pulvérisée..... 1 —
M. pour 10 paq., 1 avant ch. repas.

℞ Cannelle pulvérisée..... 15 gr.
Sucre pulvérisée..... 250 —
M. : 1 à 2 cuill. à café avant le repas.

Confection d'hyacinthe (5 à 10 gr.) ; extrait de quassia (1 à gr.), extrait de gaïac (1 à 5 gr.), extrait de fiel de bœuf (1 à 4 gr.), extrait d'absinthe (1 à 4 gr.) ; extrait de columbo (0,20 à 1 gr.).

℞ Extrait de fiel de bœuf.. }
Savon amygdalin..... } ãã 1 gr
Extrait de gaïac..... }
F. s. a. 30 pil. : 1 avant ch. repas.

℞ Extrait de quinquina..... 20 gr.
Sous-carbonate de fer.... 10 —
Poudre de cannelle..... 5gr,50
Pr. 20 paq ; 1 matin et soir.

Combattre la chlorose quand elle existe (29), et associer les ferrugineux aux amers, aux narcotiques, selon les indications :

℞ Limaille de fer..... 0gr,40
Soufre sublimé et lavé.... 30 gr.
Extrait sec de quassia..... 0gr,30
M. et div. en 24 paq. ; 3 par jour.

℞ Asa fœtida..... ... . }
Extrait de valériane.... } ãã 1 gr.
Thridace..... }
Limaille de fer..... 2 —
Savon de croton ..... 3 —
F. 48 pil. ; 3 par jour.

℞ Fiel de bœuf épaissi..... . ..... }
Extrait de gentiane..... ..... .... } ãã 5 gr.
Rhubarbe pulvérisée..... ... ... .. }
Sous-carbonate de fer..... 2 —
F. des pil. de 0,10 ; 8 à 12 par jour.

S'il y a éructations acides et pyrosis, conseiller le bicarbonate de soude, la magnésie, le charbon, le carbonate d'ammoniaque :

℞ Carbonate d'ammoniaque liquide..... 25 gr.
Eau de fleurs de camomille. 90 —
Sirop de fleurs de camomille..... 25 —
Par cuillerées à bouche.

℞ Carbonate de potasse. 0,20 à 0,30
Eau de chaux... .... 15 gramm.
A prendre deux fois par jour dans une petite tasse de lait.

Préparations arsenicales variées; acide arsénieux en granules de 1 milligr.; arséniate de soude, d'ammoniaque; liqueur de Fowler (5 à 10 gouttes), de Pearson (20 gouttes); 1 à 2 pilules asiatiques.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | Arséniate de soude..... | 0,gr,10 |
| | Alcool..... | 1 gr. |
| | Eau distillée ou sirop d'écorces d'orange..... | 80 — |

Une cuill. à bouche pur ou dans de l'eau avant le repas.

Pepsine amylacée (1 gr.) avant le repas; sirop, élixir, vin de pepsine (1 cuill. à dessert); iodure de potassium; eau sédative, lotions fraîches sur l'épigastre. Hydrothérapie. Combattre la constipation par les lavements purgatifs ou laxatifs.

*Eaux minérales.* — Vichy dans la gastralgie à retours éloignés et périodiques. — Dans la gastralgie continue ou habituelle : Plombières, Pougues, Saint-Alban, Ems. — Dans la gastralgie compliquée de dyspepsie : Plombières, Pougues, Sermaize, Bagnoles, Evian, Vals. — Dans la gastralgie rhumatismale : Néris, Plombières, Bains, eaux sulfureuses.

*Traiter la diathèse.* S'il y a dartre répercutée, diathèse herpétique; arsenic (voir 62). — S'il y a diathèse arthritique (alcalins, 20, 23). — S'il y a diathèse syphilitique (iodure de potassium, sulfureux, 25).

La gastralgie compliquant très-souvent la chlorose ou les maladies de l'utérus ou la leucorrhée, traiter la maladie principale (voir *Chlorose, Maladies de l'utérus*), bains de mer.

419. **Dyspepsie.** — Symptomes. — Bouche sèche ou pleine de salive, acide ou amère; haleine fade, mauvaise; inappétence, ou boulimie, malacia, pica; quelquefois polydipsie; quelquefois nausées, vomissements, pituite, éructations, borborygmes; crampes d'estomac, brûlure; quelquefois lienterie. Toux, dyspnée, névralgies intercostales; céphalalgie; vertige stomacal; somnolence; bâillements; affaiblissement; palpitations. Hypochondrie.

*Variétés* : *D. gastrique.* Digestion, pénible, dépendant d'altérations organiques de l'estomac ou de troubles fonctionnels, se manifestant d'une façon accidentelle ou habituelle, ayant son siége habituel dans l'estomac, quelquefois dans l'estomac et l'intestin et donnant lieu à des symptômes variés. Appétit augmenté, diminué ou perverti; soif variable; bouche généralement sèche, pâteuse; acidité de la salive; douleur, malaise, pesanteur, tension, chaleur épigastrique pendant ou après le repas, quelquefois se calmant par la pression.



2° *D. intestinale.* — Douleurs intestinales, coliques après les borborygmes, flatuosités fétides.

Formes. — Développement considérable de gaz avec ou sans dyspnée, avec ou sans pléthore, avec ou sans palpitations (*D. flatulente*).

Douleurs stomacales, comme dans la gastralgie, avec spasmes, avant, pendant ou après la digestion, quelquefois très-vives, ou simplement irritatives ou donnant lieu à une violente constriction épigastrique (*D. gastralgique*).

Haleine acide, aigre; flatuosités brûlantes, pyrosis (*D. acide*).

Lenteur, difficulté de la digestion, paresse, atonie de l'estomac, coïncidant le plus souvent avec la chloro-anémie; altération; bouche pâteuse, amère; propension pour les aliments et les boissons acides; quelquefois rapports et vomissements bilieux (*D. atonique neutre* ou *alcaline*).

Lenteur des digestions augmentant surtout par l'ingestion des boissons; clapotement stomacal caractéristique (*D. des liquides, par atonie*).

D'autres fois les liquides, le bouillon, le laitage sont bien digérés; les aliments solides ne le sont pas (*D. des solides*).

L'appétit est excessif, se renouvelle à des intervalles très-rapprochés; accroissement anormal des forces digestives auquel ne répond pas la force musculaire ou organique; embonpoint non augmenté; selles normales (*D. boulimique*).

Production dans l'estomac et rejet de liquides clairs, glaireux, aqueux, avant ou après la digestion, quelquefois le matin à jeun, ou après l'expuition (*D. pituiteuse*).

*Ne pas confondre avec* embarras gastrique (411), gastrite aiguë ou chronique (413, 414), gastralgie (418), cancer de l'estomac (418), ulcère (416), entérite (421), congestion cérébrale (124).

Traitement. — *Hygiénique.* — *C'est le meilleur.* — S'occuper surtout de la quantité, de la qualité des aliments, des boissons et de l'ordonnance des repas; amener le malade aux conditions diététiques où les souffrances sont le moindres, sans se laisser guider par son appétit; puis élever peu à peu les doses alimentaires en ayant parfois recours aux toniques, aux stimulants; subordonner le choix des aliments à la susceptibilité générale ou fonctionnelle du malade; viandes grillées, rôties, quelquefois peu cuites. Viandes légères, blanches dans la D. gastralgique; viandes rouges, noires dans les autres formes; consommés, gelées de viandes, œufs frais dans la D. ancienne; pas de charcuterie. Peu ou pas de condiments surtout dans les D. gastralgique et acide. Faire les repas à intervalle convena-

ble ; ne pas manger trop vite ; mastiquer et insaliver convenablement ; boire avec fréquence et très-peu à la fois ; exercice modéré à pied et distraction après les repas ; régime très-sévère et varié selon les formes : liqueur ou élixir de pepsine.

*D. flatulente* : Ni beurre, ni laitage, ni fromage ; pas de féculents ; viandes noires, poissons de rivière ; légumes herbacés, épinards, chicorée au jus ; pommes de terre frites, cuites sous la cendre et non à l'eau ; quelquefois purée ; pain rôti, bien cuit, peu ou pas de mie ; ni pâtisseries, ni roux, ni amandes, ni noix, ni noisettes, ni aliments sucrés. Vin vieux, peu acide, bordeaux coupé avec l'eau fraîche de rivière, de source ; quelquefois thé léger, bon café ; Frontignan, Lunel, Malaga, Porto, cognac, kirsch, rhum en petite quantité et de bonne qualité ; anisette, chartreuse, élixir de Garus, curaçao. Prendre au commencement du repas :

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | Magnésie | ãã 3 gr. |
| | Craie | |
| | Bicarbonate de soude | |
| | En 10 paquets. | |

Avant les repas, macération froide de quassia, de gentiane, de quinquina. Eaux minérales de Pougues, Niederbronn, Forbach, Nauheim, Soden, Kissingen, Hombourg, Plombières ; bains de mer, hydrothérapie.

*D. atonique* : Même régime que ci-dessus ; vin de quinquina, amers ; préférer le vin de Bourgogne ou de Bordeaux. Eaux de Vichy, Vals, Lamalou, Orezza, Forges, Spa, Sermaize, etc.

*D. gastralgique* : Beurre, laitage, œufs frais, fromage frais ; poissons de rivière : sole, merlan frit ; pain rôti, croûte (voir *Gastralgie*).

*D. acide* : Régime comme dans la forme ci-dessus ; pas de féculents ; légumes herbacés ; épinards, chicorée ; priver les féculents de leur enveloppe ; purées ; pommes de terre frites, sous la cendre ; ni mie de pain ni pâtisseries ; pas de sauces où entre la farine ; ni amandes, ni noix, ni mets sucrés ; thé léger, café ; Bordeaux. Eaux minérales alcalines de Vichy, Vals, Bussang, Renaison, Saint-Galmier, Condillac.

*Contre les glaires* : Toni-purgatifs, amers, aloès, rhubarbe, pilules *ante cibum*, grains de santé ; prendre en une fois et y revenir au besoin (Guipon) :

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | Crème de tartre | 12 gr. |
| | Magnésie décarbonatée | 5 à 8 gr. |
| | Jalap pulvérisé | 1 à 2 gr. |



Traiter la diathèse syphilitique, arthritique ou herpétique ; traiter la chlorose ; traiter les maladies utérines.

420. **Vomissements nerveux.** — Symptomes. — Vomissements apparaissant à des intervalles plus ou moins rapprochés et consistant en substances aqueuses, rarement alimentaires, bilieuses, sanguinolentes, avec ou sans douleur épigastrique ; quelquefois éructation sans odeur ni saveur ; habituellement conservation de la soif et de l'appétit ; antipathie contre certains aliments ; constipation sans coliques ; peau, intelligence, pouls normaux, excepté au déclin de la maladie ou quand les vomissements sont opiniâtres et de longue durée ; dans ces cas, état fébrile.

*Ne pas confondre avec* gastrite (413), gastralgie (418), coliques néphrétiques (457), hépatiques et calculs biliaires (441), grossesse, dyspepsie (419), cancer stomacal (417).

Traitement. — Opium à l'intérieur (0.02 à 0,05), extrait thébaïque (0,10 à 0,15), sirop de morphine, de codéine ; morphine (0,03 à 0,05) par la méthode hypodermique (voir *Névralgies*) ; lavements laudanisés (20 à 30 gouttes) ; frictions belladonées sur l'épigastre ; vésicatoire volant pansé avec la morphine.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | Extrait de belladone | 5 gr. |
| | Axonge | 30 — |
| | Pour pommade. | |

Amers ; quassia amara ; columbo (2 à 4 gr.) ; valériane ; valérianate de zinc ; perles d'éther ; asa fœtida ; boissons gazeuses ; eau frappée ; glace pilée ; potion de Rivière ; eau magnésienne ; charbon pulvérisé, fait avec du bois de peuplier ; sous-nitrate de bismuth avant le repas ; teinture d'iode (2 à 3 gouttes dans de l'eau) ; iodure de potassium (0,50 à 1 gr.) ; quelquefois sulfate de quinine ; fiel de bœuf (1 gr.) ; copahu (8 à 10 gr.). Liqueur ou élixir de pepsine ; lait clair ; bains prolongés, hydrothérapie, bains de mer. Quelquefois méthode perturbatrice, vomitifs ; alimentation tonique ; viande crue.

## SECTION II.

### MALADIES DES INTESTINS.

421. **Entérite aiguë.** — Symptomes. — 1° *Locaux* : Chaleur, douleur à la région ombilicale ; selles liquides, abondantes, bilieuses, quelquefois sanguinolentes avec ténesme, borborygmes.