frottement, par la pression, par les temps humides qui font gonfler les cors; quelquefois rougeur érythémateuse autour du cor; quelquefois sérosité plus considérable dans la bourse, d'où augmentation des douleurs.

Siége sur les articulations, dans les espaces interdigitaux.

TRAITEMENT. — Porter des chaussures plus larges : appareil en caoutchouc de Galante; tailler dans un tube de caoutchouc un anneau ayant la forme d'une bague et ménager à la partie la plus large une ouverture d'un diamètre au moins égal à la circonférence du cor.

Excision couche par couche. — Extirpation : après un bain de pieds, attaquer le cor par un de ses bords à l'aide d'un poinçon carré ; saisir le bord avec une pince et extirper à l'aide d'une aiguille aplatie à pointe mousse, en évitant de faire saigner et en ayant soin d'enlever le cor et sa racine.

Contre les douleurs et la rougeur érythémateuse: collodion élastique, diachylon, vigo.

LIVRE III

ACCOUCHEMENTS.

CHAPITRE PREMIER

PHYSIOLOGIE DE LA GROSSESSE.

Signes de la grossesse. — Modifications du col.

595. **Signes de la grossesse.** — 1° *Rationnels*. — Suppression des règles; picotements, gonflement, coloration brunâtre des seins : troubles digestifs, respiratoires, circulatoires, nerveux; colostrum dans les seins et kyestéine dans les urines : augmentation du volume de la matrice : modifications du col.

2° *Certains*. — Ballottement : mouvements actifs du fœtus; à partir du 4e mois, bruit du cœur fœtal non isochrone avec le pouls de la mère : deux bruits de souffle, en cas de grossesse double.

596. **Modifications du col** selon l'époque de la grossesse et l'état primipare ou multipare.



Fig. 357. — Col utérin chez la femme primipare (*).

Fig. 358. — Col utérin chez la femme multipare (**).

(*) *a*, forme du col utérin ; *o*, orifice externe du col.
(**) *b*, forme du col utérin ; *o'*, orifice externe du col.

Fin du quatrième mois. — Élévation du col porté en arrière



Fig. 359. — Col utérin à la fin du quatrième mois chez la primipare.



Fig. 360. — Col utérin à la fin du quatrième mois chez la multipare.

et à gauche; ramollissement; col fermé chez la primipare, élargi chez la multipare.

Fin du cinquième mois. — Chez la primipare, tiers inférieur du col ramolli et fermé; — chez la multipare, col ramolli et



Fig. 361. — Col utérin à la fin du cinquième mois chez la primipare.



Fig. 362. — Col utérin à la fin du cinquième mois chez la multipare.

assez ouvert pour permettre l'introduction de toute la phalangette de l'indicateur.

Fin du sixième mois. — Chez la primipare, col ramolli dans

Fig. 363. — Col utérin à la fin du sixième mois chez la primipare.



Fig. 364. — Col utérin à la fin du sixième mois chez la multipare.

la moitié inférieure et presque oujours fermé; — chez la multipare, ramollissement et ouverture.

Fin du septième mois. — Chez la primipare, col plus élevé, ramolli dans les deux tiers inférieurs, permettant l'introduction



Fig. 365. — Col utérin à la fin du septième mois chez la primipare.



Fig. 366. — Col utérin à la fin du septième mois chez la multipare.

de la phalangette; — chez la multipare, pouvant recevoir toute la phalangette.

Fin du huitième mois. — Chez la primipare, col ramolli et pouvant recevoir toute la phalangette jusqu'à l'orifice interne



Fig. 367. — Col utérin à la fin du huitième mois chez la primipare.



Fig. 368. — Col utérin à la fin du huitième mois chez la multipare.

qui est fermé; — chez la multipare, le doigt peut toucher l'orifice interne qui est entr'ouvert.

Fin du neuvième mois. — Col effacé de bas en haut, ramollissement considérable et partiel chez la primipare, — général chez la multipare.



Fig. 369. — Col utérin à la fin du neuvième mois chez la primipare.

Fig. 370. — Col utérin à la fin du neuvième mois chez la multipare.

CHAPITRE II

MALADIES DE LA GROSSESSE ET POSTPUERPÉRALES.

Troubles digestifs. — Troubles respiratoires.— Troubles circulatoires. — Troubles sécrétoires. — Troubles de l'innervation. — Éclampsie. — Troubles organiques. — Hémorrhagie interne pendant la grossesse, avortement. — Fièvre puerpérale.

597. **Troubles digestifs.** — *Contre l'anorexie* : s'il y a état saburral : purgatif léger, rhubarbe (2 à 4 gr.), magnésie (2 à 4 gr.); huile de ricin (15 gr.). Limonade purgative ou eau de Sedlitz (un ou deux verres). S'il n'y a pas d'état saburral, infusions froides amères, aromatiques, quassia, gentiane, petite centaurée, quelques gouttes de laudanum.

Contre le pica : amers, vins généreux.

Contre la gastralgie : magnésie (une à deux cuill.), charbon de Belloc; pastilles de Vichy (3 à 5); sous-nitrate de bismuth avant le repas (0gr,50); eau de Seltz, eau frappée; sirop de morphine pur ou mélangé au sirop d'écorces d'oranges amères; lavements laxatifs.

Contre les vomissements glaireux : Infusions aromatiques de thé, mélisse, quassia, gentiane, etc.

Contre les vomissements incoercibles : Limonades gazeuses, eau de Seltz, eau glacée, glace pilée avant les repas, potion de Rivière, perles d'éther; teinture d'iode alcoolisée (10 à 20 gouttes dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre par cuillerées) :

℞	Teinture d'iode	1 gr.
	Alcool rectifié	5 —

Mêlez.

sous-nitrate de bismuth (0,50 à 0,75); extrait thébaïque (0,025) un quart d'heure avant chaque repas; kirsch ou élixir de Garus après. Vésicatoire morphiné à l'épigastre, quarts de lavements laudanisés (30 à 40 gouttes); eau-de-vie, champagne frappé, quinine, liqueur ou élixir de pepsine. Purgatifs drastiques, grog chaud (Fonssagrives); suppositoires morphinés (0,01 à 0,05) introduits dans le vagin. Repas nombreux mais peu copieux, froids : lait clair.

℞	Extrait de quinquina	2 gr.
	Chlorhydrate de morphine	0gr,20

F. s. a. 20 pilules : une matin et soir.

Ne provoquer l'avortement ou l'accouchement prématuré que dans les conditions suivantes : 1° Vomissements incessants et de tout aliment ou boisson. — 2° Amaigrissement et faiblesse rendant tout mouvement impossible et donnant lieu à des syncopes fréquentes. — 3° Altération considérable des traits. — 4° Pouls au-dessus de 120. — 5° Chaleur de la bouche et acidité de l'haleine. — 6° Insuccès de toutes les médications. (P. Dubois.)

Contre la constipation : Lavements mucilagineux, huileux; avec une très-longue canule; huile de ricin (6 à 10 gr.); magnésie anglaise (2 à 4 gr.); rhubarbe (1 à 2 gr.). (Voir 430.)

Contre la diarrhée : Eau de riz gommée, quarts de lavement laudanisés, sous-nitrate de bismuth.

598. **Troubles respiratoires.** — *Contre la dyspnée* : Ferru-