

agudo, y *opsis*, vision, vista; vista mas perspicaz que lo que es comunmente.

OXYREGMIA, f. *Oxyregmia*; de *ocsys*, ágrío, ácido, y *ereyma*, eructacion; erupción ácido: es un sintoma muy comun en la gastritis, ó simplemente de una mala digestion.

OXYRHODINO, m. *Oxyrrhodinum*; de *ocsys*, ágrío, y *rodon*, rosa; vinagre rosado.

OXISÁCARO, m.; de *ocsys*, ágrío, ácido, y *sakjaron*, azúcar; mezcla de azúcar y vinagre. Los antiguos hacian disolver á veces el vidrio de antimonio ó la escilla, lo que constituia el *oxisácaro vomitivo* ó el *oxisácaro escitífico*.

OXISAL, f. Sal cuya base y ácido contienen oxígeno.

OXISÚLFURO, m. Combinación de un sulfuro con un óxido.

Oxisulfuro de antimonio: V. **KERMES MINERAL**.

OXITÁRTARO, m. *Oxytartarus*; sin. de *tierra foliada de tártaro* ó *acetato de potasa*.

OXITIMIA, f. Palabra usada por Hipócrates como sinónimo de cólera pronta y violenta.

OXIURO, m.; de *ocsys*, agudo, y *ura*, cola; nombre dado por Rudolphi á un ascáride que tiene por caracter una cola extremadamente delgada.

PABELLON, m. Extremidad embudada de una sonda, agalla, etc. — Extremidad libre embudada y franqueada de la trompa de Falopio. — *Pabellon de la oreja*: V. **OINO**.

PACCHIONI, (glándulas de). Granulaciones de las membranas del cerebro, descubiertas por el anatómico que les dió su nombre.

PACIENCIA, f. *Rumex patientia*, L., *paciencia officinal*. Crece en lugares húmedos, y tiene el aspecto de la acedera, su raíz es fusiforme, morena al exterior, amarilla al interior, tiene un olor particular, un sabor amargo y austero. Se usa en cocimiento de una á dos onzas por dos libras de agua,

OZENA, f. *Ozena*; de *ocsin*, oler mal; úlcera de la membrana pituitaria que produce un olor infecto, comparado impropriamente al de una chinche aplastada; y por esto se designa con el nombre de *chinchas* á los individuos que están afectados de *ozena*. No están bien determinados, al menos en muchos casos, el sitio y la naturaleza de esta afección: habiendo observado algunos prácticos que esta enfermedad es frecuente en los individuos que tienen la nariz naturalmente chata, la atribuyeron á la retención del moco nasal en las anfractuosidades donde es segregado. Algunas veces existe la *ozena* en individuos sanos á la apariencia sifilítica, pero comunmente es de naturaleza sifilítica, y depende de una sífilis papulosa desarrollada en las cavidades nasales: las pápulas ulceradas van seguidas algunas veces de una caries de los huesos de la nariz, de las conchas ó del vómer, que aumenta mas la fetidez. La marcha de la enfermedad es lenta, y los dolores son poco vivos: es necesario por una parte atacar la sífilis constitucional, y por otra curar las ulceraciones con hilas untadas en cerato opioado, cauterizar superficialmente con el nitrato de plata las pápulas, y hasta las ulceraciones que no estén muy irritadas.

OZOCERITA, f.; de *ocsi*, mal olor, y *keron*, cera; especie de resina ó de cera fósil que tiene mucha analogía con la *parafina*.

P

reciente y seca, como depurativa y antiescorbútica. También se hace de ella un extracto. En el comercio bajo el nombre de *paciencia* se encuentra, además de la raíz precedente, las de otras especies, y sobre todo las del *rumex crispus*, y *rotundifolius*, que tienen absolutamente las mismas propiedades, lo mismo que la de la *paciencia salvage*, *rumex acutus*. La raíz de la acedera roja, ó *paciencia sangre de dragon*, cuyas hojas tienen las nerviosidades de un hermoso rojo, dan un zumo laxante algo astringente. La del *rumex acuticus* se emplea como tónica astringente y antiescorbútica en Inglaterra y Suecia, pero no aquí. La raíz del *rumex alpinus* se ha em-

pleado como sucedánea del ruibarbo con el nombre de *ruibarbo de monges*.

PACHEABLEFAROSIS, f. Condensación del tejido de los párpados producida por las excrecencias ó por los tubérculos que se desarrollan en sus bordes, ó por una inflamación crónica.

PACIENTE, adj. El que padece algun dolor ó tormento; el enfermo.

PACONTICO, CA, adj. Epiteto dado á los medicamentos incrasantes.

PAIDONOSOLOGÍA, f. Tratado sobre las enfermedades de los niños.

PAJA, m. *Stramen*; tallo seco de las gramíneas, y sobre todo de los cereales, despues que se han separado las semillas de las espigas.

PAJITA, f. *Palea*; se da este nombre en botánica á las escamas que en muchas sinántreas están entremezcladas con las flores, á las brácteas que por su reunion constituyen el involucro de estas mismas plantas, y á las diferentes piezas que en las gramíneas forman la cubierta de los órganos sexuales.

PALADAR, m. *Palatum*; parte superior de la cavidad de la boca, especie de bóveda parabólica, formada por los dos huesos maxilares superiores y los palatinos, revestida de una membrana mucosa gruesa y densa, limitada por delante y por los lados por la arcada dentaria superior, y por detrás por el velo del paladar, ligeramente deprimido en el medio por una línea blanquecina que lo atraviesa de delante atrás. — En botánica se entiende por paladar la hinchazon externa de la garganta de las córolas personadas, que cierra la entrada y reúne los dos labios, y mas particularmente á la parte superior del fondo de las córolas monopétalas irregulares.

PALADARES, m. Especie de bulbos que les salen á los caballos en la boca.

PALADIO, m. *Palladium*; metal blanco duro, muy maleable, dúctil, difícil de fundir: inalterable al aire y casi inalterable al fuego, descubierto por Wollastou en el mineral de platino; su peso es de 41,3 á 41,8. Es inatacable por muchos ácidos; el ácido nítrico le disuelve tomando un matiz rojo moreno; una disolucion alco-

hólico de yodo le emegrece, lo que no hace el platino.

PALATINO, adj. *Palatinus*, que tiene relacion ó que pertenece al paladar. — *Arterias palatinas*, distinguidas en *superior* é *inferior*. La primera nace de la maxilar interna cuando llega al extremo de la fosa zigomática; la segunda sale de la maxilar externa muy cerca de su origen. — *Canales ó conductos palatinos anterior y posterior*; el anterior está situado detrás de la arcada alveolar, sobre el reborde articular de los maxilares superiores, que concurren á su formación, inferiormente no tiene sino un solo orificio; pero superiormente es bifurcado, y presenta dos aberturas que se abren cada una en una de las cavidades nasales. El posterior está situado en el punto de union del hueso palatino con la superficie que presenta el hueso maxilar superior detrás del seno. — *Fosa ó bóveda palatina*: V. **PALADAR**. — *Membrana palatina*; porción de la mucosa bucal que tapiza el paladar. — *Nervios palatinos*; en número de tres, mayor, mediano y menor. Todos tres nacen de la parte inferior del ganglio esfenopalatino. El primero pasa por el canal palatino posterior; á su salida del canal se dirige adelante por debajo de la bóveda palatina, donde se ramifica; el segundo va á distribuirse en la amígdala y en el velo del paladar; el menor se divide en dos filetes, uno para la campanilla y otro para la amígdala y los folículos de la membrana palatina. — *Huesos palatinos*; se llaman así dos pequeños huesos irregulares situados en la parte posterior de las fosas nasales y completando por detrás la bóveda del paladar. Una porción del hueso palatino es horizontal y la otra vertical. La porción horizontal ó inferior forma una parte de las fosas nasales por su cara superior y de la bóveda palatina por la inferior, encima de la que está situado el orificio del canal palatino posterior. La porción ascendente forma parte por su cara interna de la pared externa de las fosas nasales, y se articula por la cara externa con el hueso maxilar superior. El ángulo que forma el borde posterior de esta cara al reunirse con el mismo borde de la cara horizontal, presenta una eminencia piramidal llamada *tuberosidad palatina*. Su borde superior lleva anteriormente una apó-