

SEGUNDA GRAN FAMILIA DE LOS LABROIDEOS.

LABROIDEOS DE DIENTES REUNIDOS EN LÁMINAS HUESOSAS CON LAS MANDÍBULAS.

PERTENECEN á esta clase los escaros, cuyas formas y organizacion son tan semejantes á las del labroideo; ademas, como este, tienen la línea lateral interrumpida ó ramosa, y los dientes faringios confundidos y reunidos en largas placas como las de las mandíbulas; pudiera muy bien haberse formado una familia distinta con este género, fijándose en la especialidad de la denticion, pero se ha reconocido que los caliodonos y los Odax acercan todos los escaros á los labroideos comunes, los primeros por sus dientes separados y los segundos por su longitud.

GENERO ESCARO.

LLAMANSE escaros unos peces que abundan mucho en los mares de la zona tórrida, muy parecidos á los labros excepto en las mandíbulas que las tienen desnudas de escamas y convexas como las de los tetrodonos: el nombre de escaros se deriva de scarus, pez muy celebrado por los antiguos naturalistas, bien sea por la facultad que se le atribuía de rumiar, bien porque producía una especie de sonido, ó sea porque pretendian que llegaba su instinto hasta el punto de escapar de las redes en que se le prendia ayudado por otros de su género. Aristóteles habla sobre dicha propiedad rumiante, y dice que hay algunos peces cuyo estómago es distinto del de los demas; tal sucede con el escaro, único á quien se cree rumiante, á semejanza de ciertos animales terrestres, asegurando que como los rumiantes terrestres, solo se mantiene de vegetales.

Respecto á la propiedad que se les atribuye de protegerse mutuamente en la desgracia, aseguran los naturalistas, entre ellos Oppien, que tan luego como un escaro se halla cogido en la red, vienen sus compañeros y cortan los cordeles para abrirle paso, y si se halla enredado entre ellos, le cogen por la cola y tiran para salvarle ó bien á la inversa le ofrecen la suya para que agarrándose á ella puedan tirar y llevarsele. Plinio refiere que los gastrónomos romanos le apreciaban mucho y se hicieron grandes esfuerzos por aclimatarle en los mares de Italia, lo cual lograron arrojándolos vivos en aquellas aguas durante cinco años.

Su carne es muy fina, y el médico Difilo de Sifnio, dice que debe darse á los enfermos por lo tierna, dulce, ligera, de fácil digestion y nutritiva, pero advierte que cuando este pez ha comido liebre marina es pernicioso porque produce fácilmente el desarrollo del cólera morbo; finalmente, son tantos los relatos y descripciones que se han hecho de este pez y tan variados, que es difícil el reconocerle por el carácter distintivo de su especie, sin embargo estudiaremos ante todo el que actualmente se conoce en Grecia por escaro, cuyas propiedades coinciden con muchas de las ya descritas, y continuaremos con sus semejantes del mar Rojo y otros cuyas afinidades ietiológicas inducen á convencer que los escaros son verdaderos labroideos, tanto por su forma oblonga, como por la dorsal cónica, línea lateral interrumpida, grandes escamas que cubren la mejilla etc.

Este pez se halla abundantemente esparcido tambien en ambos Océanos, y pocos géneros hay que se

compongan de especies mas parecidas entre sí, como las de los escaros, pues si bien es verdad que varían mucho sus colores, no así sus formas, el número de sus radios, y hasta el de las escamas que son iguales en todos.

ESCARO CRETENSE.

Es de forma oblonga, su hocico obtuso, la caudal cuadrada, y su mayor altura frente á la pectoral es el tercio de su total longitud; tiene de grueso ú espesor la mitad de la altura; la cabeza tiene como un tercio del total del tronco; la convexidad de la espalda descendié ligeramente, por una parte hasta el hocico, y por la otra hasta el fin de la dorsal; la curva del vientre es menos convexa; la cola es casi rectilínea; el ojo se halla casi en el centro de la cabeza y su diámetro equivale á la quinta parte de la longitud de esta; la boca es horizontal y ocupa como la cuarta parte y tiene unos labios dobles y membranosos que recubren las mandíbulas, de las cuales la inferior es algo mas larga que la superior; los dientes son pequeños y tan cortos, que solo se marcan como unos puntos blancos. La frente, el hocico, y los labios, no tienen escamas; pero si los hay tan grandes como en el resto del cuerpo en la mejilla; el limbo del preopérculo casi no se distingue; la pectoral es medio oval y tiene doce radios, de los cuales el primero y el último son los mas largos; las ventrales nacen un poco mas atrás, son de forma obtusa y la dorsal empieza en la misma línea de la hendidura branquial; su longitud es como la de la mitad del pez y tiene diez y nueve radios, y la anal nueve muy blandos.

Las escamas de este escaro son grandes, ovaladas, y estan estriadas con treinta surcos arqueados que no forman abanico regular; tiene ocho hileras longitudinales. La línea lateral ocupa la tercera hilera, hasta el fin de la dorsal donde se interrumpe para pasar á la quinta, y se marca por medio de arbusculos que ocupan toda la parte visible de la escama. Su color es un hermoso púrpura, que tira á rosa hácia el vientre y de un moreno violeta en la espalda; el centro de cada escama parece violeta, la pectoral es de color de naranja, así como la ventral que ademas tiene líneas trasversales de violeta; la dorsal y la caudal son grises violeta con manchas claras.

El escaro griego, tan comun en el Archipiélago, no existe en nuestras costas, y este confinamiento de una especie en la parte oriental del Mediterráneo, no debe extrañarnos, puesto que tenemos otros ejemplos de semejante fenómeno.

ESCARO RUBIGINOSO.

Es el que mas se acerca al del Mediterráneo, y habita las costas de Canarias y de la Madera; tiene los dientes mas lisos, la caudal mas cuadrada, y los colores varían algo, pues tiene la espalda de un rojo ferruginoso, el vientre blanco y la caudal terminada por una faja amarilla; sus formas son iguales á las del escaro griego; en Canarias es el pez que mas abunda y le conocen bajo el nombre de viejas; los pescadores lo secan y así constituye uno de los principales alimentos de la gente pobre, y aun la transportan á

Habana; tambien se halla fresco en el mercado, pero es muy corto su consumo; donde con mas abundancia se pesca es en la Graciosa y Lanzarote.

ESCARO ROJO.

Su cabeza es mas larga que alta, la mandíbula superior es lisa y tiene en el borde diez recortes lo mismo que la inferior; sus dientes son muy pequeños y los ángulos de la caudal se prolongan en puntas muy finas; es una de las especies que tiene las escamas grandes; su parte visible, es casi lisa, los arbusculos de la línea lateral se dividen en la base en seis ó siete ramas que á su vez se subdividen en otras mas pequeñas, extendiéndose sobre toda la escama á que cada cual pertenece. Su color es gris violeta con un borde moreno oscuro en las escamas, y el vientre blanco amarillento; la membrana que rodea el opérculo es negra, las aletas amarillentas, y las mandíbulas blancas; su longitud quince pulgadas.

GRANDE ESCARO DE MANDÍBULAS AZULES.

Conócese tambien por escaro Guacamayo; tiene las mandíbulas muy abultadas y algo estriadas; por su base son de un color verde gris; las espinas de la dorsal son fuertes; las escamas tienen sobre el disco unos granos muy finos dispuestos en estrias, y los arbusculos de la línea lateral tienen un surco prominente que termina en ramas cortas é irregulares. Su longitud es de tres pies y su color verde en toda la parte posterior, y gris en la cabeza y parte anterior; la dorsal y la anal morenas y las mandíbulas azules.

ESCARO PEQUEÑO DE MANDÍBULAS AZULES.

Diferénciase del anterior en no tener mas que veinte pulgadas, y en ser de un color moreno; teniendo sobre cada escama una mancha verde; las aletas son muy oscuras y tiene tambien las mandíbulas azules.

ESCARO COTORRA.

Procede de las aguas de Puerto Rico, donde se le conoce por cotorra; su longitud es de tres pulgadas, tiene las mandíbulas azules y las puntas de su caudal tienen la cuarta parte del resto de la aleta; sus escamas son ligeramente estriadas y los arbusculos de la línea lateral terminan en tres ó cuatro ramas; su color general es verde oscuro, el vientre rosa, y las puntas de los radios de la dorsal y la anal son azules.

ESCARO DE TRES PUNTAS.

Su primitivo origen es desconocido, si bien se presume que procede del Brasil; sus formas son iguales á las del escaro de mandíbulas azules, pero este las tiene blancas ó amarillas y la inferior descubre por la parte interior tres hileras de cabezas ó puntas de dientes; es de color rojizo y tiene las aletas ribeteadas de negro; la superficie de la cabeza es lisa y en cada lado tiene tres fuertes espinas puntiagudas; su longitud es de veinte y ocho pulgadas.

ESCARO CATESBI.

Llamase así porque su descripción se debe al naturalista Catesbi, si bien algunos le han titulado pez

verde. Tiene unas profundas muescas en ambas mandíbulas; su altura equivale al tercio de su longitud; tiene la cola cortada en figura de media luna; el cuerpo y la caudal son verdes con una faja roja sobre dicha aleta; las pectorales de color violeta, y la cabeza gris oscuro matizada de púrpura en los bordes del opérculo y preopérculo. Este pez se encuentra en las costas de Santo Domingo y Cuba.

ESCARO DE ALETAS DORADAS.

Su elevación disminuye rápidamente por el lado de la cola; el perfil no tiene nada de abultado, pero desciende oblicuamente desde la frente; su mandíbula superior tiene en cada lado unas veinte muescas y en la superficie presenta unas puntas salientes que nunca exceden de ocho; la mandíbula inferior tiene mayores las muescas y por la parte interior presenta vestigios de dientes. Es de color verde azulado; las aletas son de un amarillo de oro con ribetes verdes ó azules; su longitud es de catorce pulgadas.

ESCARO AZUL Ó DE FRENTE ABULTADA.

Los mares de América producen escaros, cuya frente se halla muy abultada á consecuencia de tener una especie de bolsa grasienta ó gelatinosa que les da un aspecto particular; sus mandíbulas se hallan divididas por diminutas muescas que llegan á veinte en cada lado y en la parte interior no se distinguen dientes; tiene escamas lisas y algo membranosas en el borde y los arbusculos de la lateral tienen tres ramas. Su color es moreno verdoso, y las escamas y aletas se hallan matizadas de un verde mas oscuro que cambia en azul; tiene unas diez y ocho pulgadas de longitud; la bolsa de la frente es redonda y no aplastada como la cresta de los rasones y del nováculo.

ESCARO AUROFRENADO.

Esta especie procede de la isla de Santo Domingo; se le puede reconocer ademas de sus colores, por tener la cabeza bastante larga; las muescas y granos de las mandíbulas, dos espinas en la superior, y la caudal recortada en figura de media luna; los dientes casi no sobresalen nada y forman una superficie plana con el paladar; las escamas son algo estriadas; los arbusculos de la línea lateral tienen seis ramas; todo el cuerpo es de color carmesi y el vientre verdoso, y una cinta de color de naranja ó dorada parte del ángulo de la boca, y por debajo del ojo se prolonga hasta la nuca formando como un freno; la anal y la caudal son rojas; tiene seis pulgadas de longitud.

ESCARO DE RAYAS VERDES.

Las muescas de la mandíbula son casi imperceptibles; la superficie interior es casi lisa y los dientes aparecen como si fueran unos puntos blancos sobre fondo gris, y tiene dos puntas agudas en el ángulo de la superior. Los arbusculos de la línea lateral estan poco marcados en las escamas y se distingue este pez de las anteriores especies en tener cortada la caudal en forma cuadrada en vez de tener las puntas salientes como aquellos. Su espalda es de verde aceituna y una larga banda amarilla que nace en el lomo, desciende al costado hasta la mitad del tronco donde se



pie de; los labios son verdes y de ellos parten dos fajas de este color muy oscuras que corren por el hocico hasta el ojo y continúan por la nuca para reunirse con la amarilla del lomo; el resto del cuerpo ofrece también algunas otras rayas verdes muy oscuras; las pectorales y ventrales son amarillas; su longitud es de diez pulgadas.

#### ESCARO CON PUNTOS.

(Valenc.)

Procede de la Martinica y puede considerarse como una variedad del anterior, del que difiere en tener muchos puntos verdes en las aletas que son amarillas, y su longitud es de seis pulgadas.

#### ESCARO DE FAJAS.

(Des.)

Tiene unas diez pulgadas de longitud; se encuentra en las costas de Cuba y es igual en sus formas al de rayas verdes, distinguiéndose por ser de color moreno verdoso y tener unas fajas de amarillo gris, pero carece de rayas en la cabeza.

#### ESCARO DE CUATRO PUNTOS.

(Valenc.)

Es muy parecido al anterior, pero tiene en cada mandíbula cuatro puntas colocadas en línea recta; sus escamas son ligeramente estriadas y las ramas de los arborescúlos de su lateral casi están reunidas; es moreno verdoso más claro en los costados, y el vientre y sus aletas inferiores son amarillentas y tiene trece pulgadas de longitud.

#### ESCARO DIADEMA.

(Valenc.)

Sus formas son iguales a las del *escaro con fajas*; tiene la cabeza algo obtusa, la cola cuadrada y los arborescúlos de la línea lateral casi imperceptibles; tiene tres puntas en cada lado de la mandíbula superior. Es de color gris verdoso, y una faja amarilla corre de uno a otro ojo y se continúa detrás de éstos formando círculo sobre el cráneo y afecta la forma de una diadema, y otra más estrecha se halla colocada debajo de esta marchando paralelas; en la dorsal, el opérculo y la anal tiene otras rayas estrechas y puntos del mismo color; su longitud es de seis pulgadas.

#### ESCARO DE VENTRAL Y ANAL ENCARNADAS.

(Valenc.)

Esta especie tiene la cabeza bastante gruesa y corta; la frente es totalmente convexa delante de los ojos; sus escamas son grandes y muy unidas; cada arborescúlo de la línea lateral tiene cuatro ramas que se extienden en rayos irregulares; la caudal es cuadrada. Este pez es de color verde y se distingue especialmente por tener de un hermoso rojo sus ventrales y anal; tiene seis pulgadas.

#### ESCARO DE RAYAS ROJAS Y BLANCAS.

(Valenc.)

Es una hermosa especie procedente de la Martinica; tiene la cabeza bastante corta y alta; la cola cortada

en cuadro y se ven doce ó quince muescas pequeñas en cada mandíbula y los dientes aparecen solo como puntos blancos; las escamas estriadas y los arborescúlos de la lateral casi imperceptibles; es de color de plata y la cabeza sonrosada, y en toda la longitud del cuerpo se destacan tres fajas de color de rosa vivo que forman un hermoso contraste con el plateado; las aletas son amarillas; por lo común son de corta dimensión.

#### ESCARO RAYADO DE AMARILLO.

(Valenc.)

Es igual en un todo al anterior respecto á sus formas y su color varía, pues todo él aparece moreno leonado sin bandas, y si solo tiene una línea amarilla en el borde de la dorsal y otra á lo largo de su base.

#### ESCARO VERDE MAR.

(Valenc.)

Su mandíbula superior es lisa, sin granos ni puntas, los recortes de la inferior se ven algo mejor y la superficie interior está granulada por los vestigios de los dientes; la caudal es cuadrada. Su color es verde mar, y tiene las ventrales y la caudal rojas.

#### ESCARO RAMOSO.

(Valenc.)

Procede del Brasil y se parece mucho al anterior en particular por sus mandíbulas que no tienen espinas laterales, y se distingue en tener la caudal un tanto circular y los arborescúlos de la línea lateral tan divididos en ramas que cubren cada uno una escama; su perfil descendiendo poco y se ignora su color por hallarse muy mal conservado el que sirvió para estudiar la especie que tenía ocho pulgadas.

#### ESCARO DE MANDÍBULA RAYADA.

(Valenc.)

Las mandíbulas de esta especie se parecen á las del *escaro de aletas doradas* solo que los dientes agudos de la superior están dispuestos más regularmente y tiene cuatro en cada lado, y saliendo horizontalmente forman como unos radios; lo mismo que sucede con la inferior que parece empedrado por la salida de las cabezas de los dientes; su color es verde con líneas más oscuras que siguen las de las escamas.

#### ESCARO DE MANDÍBULAS ERIZADAS.

(Valenc.)

Este pez es uno de los más grandes que en su especie pueblan el archipiélago Indio y el mar Rojo, los cuales son notables por tener un pequeño tubérculo en las cabezas de los dientes que se ven en la parte interior de las mandíbulas y éstos se hallan tan juntos que unen gran parte de dicha superficie que se ve erizada de tubérculos formando cuadros ó grupos irregulares; su cabeza es algo más corta que la de los anteriores; la caudal la tiene cortada en cuadro; todo el cuerpo es verde y las mandíbulas blancas; su longitud es de un pie y cuatro pulgadas.

#### ESCARO ESTRIADO.

(Valenc.)

El perfil cóncavo delante de los ojos se halla abultado en forma de bolsa, debajo y en el borde de la

#### ESCARO LAGARTO.

(Valenc.)

Es el más pequeño de su especie, puesto que no excede de tres pulgadas; la línea lateral se halla indicada por unas rayas pequeñas sin ramas; su color le hace parecer al lagarto, cuyo matiz remeda con un fondo amarillento gris y manchas morenas.

#### ESCARO OREJUDO.

(K.)

Procede de Java; tiene la cola algo redonda, las mandíbulas festoneadas, sus espinas laterales y teñidas de azul; la línea del abdómen es más convexa que la de la espalda, llámase orejado porque el ángulo de su opérculo aun cuando es obtuso, sobresale más por la parte posterior que en los otros de su género; es de color verde oscuro; tiene una cinta blanca sobre el labio inferior; la dorsal y la anal son blancas con manchas morenas; su longitud ocho pulgadas.

#### ESCARO DE BLOCH.

(Valenc.)

Lleva el nombre del naturalista á quien debemos su conocimiento, y se distingue por tener un diente saliente en cada lado de la mandíbula superior; la caudal cuadrada, la línea lateral nada ramosa, y la dorsal, anal y caudal y los extremos superiores é inferiores verdes; el cuerpo es de color amarillo matizado de verde en la espalda; entre cada hilera de escamas se nota una línea estrecha verde; tiene once pulgadas de longitud.

#### ESCARO CON BANDAS.

(Valenc.)

Los arborescúlos que constituyen su lateral no tienen ramas; es de color amarillo con siete bandas longitudinales de un gris verdoso que siguen el centro de las hileras de escamas; cada escama tiene una raya en la parte superior y otra en la inferior también verde formando así como una red, y en la cabeza varias otras rayas; procede de las Molucas y tiene diez pulgadas.

#### ESCARO ONDULADO.

(Valenc.)

Las mandíbulas son como en los anteriores y tienen las dos puntas cónicas; la caudal es cuadrada, sus escamas extriadas y los arborescúlos laterales con ramas irregulares; es de color gris sonrosado y sobre el hocico tiene rayas irregularmente encorvadas formando distintas ondulaciones y de un color amarillo y otras de igual figura pero de color violeta en las aletas y el resto del cuerpo; su longitud nueve pulgadas.

#### ESCARO CON PUNTOS EN LA NUCA.

(Valenc.)

Parécese mucho al *escaro verde* sin embargo de que tiene las escamas mucho más gruesas, su color es morono oscuro, en el labio superior tiene una línea verde y sobre la nuca hay una multitud de puntos verdes entre los que se destacan cuatro más grandes y las mandíbulas también son verdes; su longitud once pulgadas.

mandíbula superior tiene dos caninos, uno en la inferior y ambas están denticuladas; la dorsal tiene los radios flexibles; la línea lateral como en los anteriores, es ramosa; sus escamas son largas y estriadas longitudinalmente.

#### ESCARO DE PUNTOS ENCARNADOS.

(Ehrenb.)

Tiene once pulgadas de longitud; procede del golfo de Arabat; es igual en sus formas al anterior y se distingue por ser moreno verdoso con puntos encarnados sobre las escamas; la cabeza es rojiza, las pectorales y las ventrales amarillas.

#### ESCARO VENOSO.

(Valenc.)

Es muy semejante al *escaro de América de fajas blancas y rojas*; la línea de su perfil descendiendo gradualmente; se descubre una pequeña espina puntiaguda en el ángulo de la mandíbula superior; á la simple vista es de color moreno oscuro; pero la parte que cubren las escamas es blanquecina con un matizado de rayas morenas en forma de venas; su longitud cinco pulgadas.

#### ESCARO NEGRUZZO.

(Ehrenb.)

Habita el mar Rojo; es igual en sus formas al anterior y de color moreno tan oscuro que raya en negro; tiene el abdómen blanquecino, la caudal de color violeta y los labios ribeteados de color de carne de este mismo matiz; las pectorales y la dorsal azulada; tiene unas siete pulgadas.

#### ESCARO VEGIONENSE.

(Valenc.)

Procede de la isla Vegion, y tiene tres y media pulgadas; su caudal es redonda; las mandíbulas están finamente repicoteadas; los arborescúlos de su lateral son sencillos y no tienen más que cuatro ramas; es de color amarillo gris con una mancha sonrosada en cada escama.

#### ESCARO HERTILO.

(Ehrenb.)

Parécese por su forma al anterior; su cabeza y espalda son de color leonado con tres bandas verticales más oscuras; los costados son más claros y el vientre es rojizo; en la boca tiene unas rayas de azul claro, distribuidas del modo siguiente; una rodea el labio superior, dos el inferior y otras en derredor del ojo; sobre cada escama tiene una mancha verde ó azul; tiene cinco pulgadas de longitud.

#### ESCARO GOBAN.

(Forsk.)

Muy semejante al anterior; tiene los labios matizados de amarillo, y varias rayas azuladas rodean los ojos; el cuerpo es blanco y cada escama tiene una raya azul con estrias longitudinales; todas las aletas están ribeteadas de verde.



ESCARO PÁPAGAYO.

(Forsk.)

La línea de su abdómen es mas convexa que la de la espalda, en lo demás es parecido al anterior y tiene tres puntas en la mandíbula superior; el cuerpo es verde con líneas amarillas y manchas azules en la cabeza; con rayas mas oscuras en los labios y aletas; los ojos son pequeños y saltones.

ESCARO FRENADO.

(Lacep.)

Su principal diferencia consiste en los ángulos de la caudal, que forman puntas agudas y tan largas como la misma aleta; se ignora cual sea su color.

ESCARO CAPITAN.

(Valenc.)

Procede de la Isla de Francia, donde se cria entre las rocas; tiene el cuerpo grueso y corto, sus escamas son grandes y lisas; los arborescúlos de la línea lateral, tienen bastante ramas cortas; sus mandíbulas son lisas pero abultadas y en el borde tienen unos resortes que corresponden en número de quince á otros tantos dientes; su color es verde, con manchas mas oscuras en las escamas y aletas; tiene unas diez y seis pulgadas y pesa tres libras.

ESCARO AZULADO.

(Ehrenb.)

En el mar Rojo se encuentra un escaro muy parecido al anterior pero que es todo él de un color azul verdoso con manchas morenas sobre la espalda, su labio superior es de color de rosa, y la dorsal y caudal son de color de púrpura; tiene nueve pulgadas de longitud.

ESCARO JOROBADO.

(Rupp.)

Sus proporciones son cortas y abultadas especialmente el lomo que ofrece una gran prominencia; los arborescúlos de su línea lateral son poco ramosos; el cuerpo es verde y cada escama tiene una raya roja; los labios, el cráneo y la garganta son azules; la dorsal y la anal son encarnadas, guarnecidas de azul y manchadas de verde; tiene ocho pulgadas y abundan poco.

ESCARO NEGRO.

(Forsk.)

Es de figura casi oval y se distingue por su color casi totalmente negro con labios ribeteados de encarnado y una cinta longitudinal de verde oscuro debajo la garganta; la caudal y las ventrales son estriadas de azul.

ESCARO BARBUDO.

(Ehrenb.)

Es bastante corto, pero la cabeza prolongada y los arborescúlos laterales muy pronunciados y ramosos; su color es verde y las escamas moreno claro con manchas rojas; la mandíbula inferior forma como una gruesa barba y todo el tronco tiene once pulgadas.

ESCARO DE RUSSELL.

(Valenc.)

Tiene las mandíbulas finamente recortadas en picos por el borde y tuberculosas en su cara interior; su hocico es verde, los bordes de los labios azules y las escamas verdes con manchas amarillas; las ventrales y la caudal son amarillas; tiene unas veinte pulgadas.

ESCARO GOTEADO.

(Lacep.)

Las formas son iguales á las del escaro capitán, pero las escamas menos lisas; los picos de sus mandíbulas son mas pequeñas y presentan interiormente vestigios de tres ó cuatro hileras de dientes; es de color leonado con manchas oscuras en la espalda y algunas nubes azuladas en el resto del cuerpo; algunos tienen dos pies de longitud.

ESCARO CON BOZAL.

(K.)

Es totalmente igual al goteado, solo que le rodea el labio superior una cinta amarilla á manera de bozal, y tiene quince pulgadas de longitud.

ESCARO BASTO.

(Valenc.)

Es muy parecido al capitán, pero sus escamas son mas gruesas y no tan finas; tiene el limbo estriado y granuloso; las mejillas las tiene lisas y presentan trece ó catorce recortes poco profundos; los arborescúlos de la línea lateral tienen cuatro ó cinco ramas bastante largas é irregulares y tortuosas; su longitud es de catorce pulgadas.

ESCARO FERRUGINOSO.

(Forsk.)

Llámase así por ser de color moreno parecido al orin ó herrumbre: las mandíbulas carecen de punta lateral sensible y las ventrales y anal son de color violeta; en lo demás parecense al escaro basto.

ESCARO DE CABEZA LARGA.

(Valenc.)

Se halla caracterizado por la estructura especial de su cabeza, que tiene de altura la mitad de su longitud; el perfil es muy recto y el ojo está colocado muy cerca de dicho perfil en el tercio superior de su longitud total y toda la cabeza equivale á la tercera parte del cuerpo; las mandíbulas son lisas y presentan por su parte interior tres hileras de dientes poco salientes y tiene las dosespinas salientes que otros muchos; la caudal es notable porque sus bordes superior é inferior forman una curva convexa; las escamas son lisas y los arborescúlos laterales muy ramosos; su color es gris verdoso y tiene veinte pulgadas de longitud.

ESCARO DE CABEZA REDONDA.

(Valenc.)

La línea de su perfil descende en arco de círculo y la de la garganta forma igual curvatura; su hocico es corto y obtuso, por manera que la cabeza es casi redonda; las escamas son muy finas, estriadas y algo

granulosas; la línea lateral se halla formada por arborescúlos muy pequeños; su color es amarillo en la parte superior; y de violeta la mitad inferior del cuerpo con algunas fajas y manchas amarillas y líneas tortuosas; tiene diez pulgadas de longitud.

ESCARO DE CABEZA OVAL.

(Valenc.)

Lo mismo que el anterior en sus formas excepto la cabeza que tiene la figura de un hueco; la mitad superior de la cabeza es de color violeta y la otra mitad inferior amarilla; la línea de separación parte de encima del hocico, pasa por el borde inferior del ojo y llega al ángulo del preoperculo desde donde el amarillo se extiende por el pecho y vientre, y la espalda y costados son de color moreno violeta; su longitud nueve pulgadas.

ESCARO LARGO.

(Ehrenb.)

Procede del mar Rojo y se distingue especialmente por la prolongación de las puntas de la caudal; su perfil descende oblicuamente y casi en línea recta; el cuerpo es de color rojo; en la cabeza mas claro; el borde de las escamas es moreno y las aletas son de un anaranjado mas ó menos vivo; tiene un pie de longitud.

ESCARO MASTAX.

(Rupp.)

Tiene el tronco algo comprimido y largo; su perfil descende en línea recta; el hocico tambien se prolonga por la parte anterior, y los arborescúlos laterales son muy grandes y ramosos; la parte superior del cuerpo es verde azulado, y la inferior, así como los lados de la cabeza, rojizos; las ventrales y caudal son de color de naranja con rayas blancas, y tiene un pie de longitud.

ESCARO HARID.

(Forsk.)

Procede del mar Rojo y aun habita las costas de la India; los árabes le conocen y distinguen por harid y sin embargo de ser muy abundante es tal la diversidad de descripciones que de él se han hecho que parece imposible el fijar de un modo cierto sus caracteres; el cuerpo es algo mas largo que en el anterior y se distingue especialmente por una prominencia ú escalón que forma por lo comun su cabeza detrás de los ojos; la línea lateral está formada por una continuación de pequeñas rayas en las escamas; parece ser de color amarillento con manchas y bridas azules; las aletas son de un anaranjado claro con matices azules ó lila; su longitud es de nueve pulgadas. La palabra harid en lengua árabe significa largo; los habitantes del litoral del mar Rojo suelen comer este pez pero con cierto temor pues se le considera venenoso cuando se ha nutrido ó alimentado con corales.

ESCARO DE DUSSUMIER.

(Valenc.)

Es una especie parecida á la anterior, diferenciándose en que casi no se conoce la línea lateral; su color es moreno amarillento muy claro en los costados y el vientre sonrosado; al rededor del ojo tiene varias manchas azules: este pez es muy apreciado y nunca

se le considera dañino puesto que se alimenta de otros peces; su longitud es de dos pies.

ESCARO DE MANCHAS MORENAS.

(Valenc.)

Tiene unas mandíbulas muy pequeñas, totalmente cubiertas por los labios; la cabeza es aplastada en su parte superior; el ojo lo tiene en lo alto de la megilla; el hocico es redondo; la línea lateral muy ramosa, la caudal cuadrada; su color es amarillo verdoso en la parte superior de la cabeza y del cuerpo y algo mas claro por el vientre; sobre cada escama se nota una mancha morena bastante larga.

ESCARO GRIS AZULADO.

(Valenc.)

Tiene la nuca muy elevada, lo cual hace que el perfil sea oblicuo, aunque algo cóncavo delante de los ojos y el hocico es muy estrecho; los dientes son blancos, no tiene caninos; la caudal es cuadrada y la línea lateral no tiene ramas; las escamas son muy finas y sin estrías; tiene la cabeza de color gris azulado; la dorsal, la caudal, la anal y ventrales, morenas matizadas de azul; los negros suelen comerle.

ESCARO DE DIENTES ROJOS.

(Valenc.)

En las costas de la Isla de Francia se encuentra un escaro que se distingue esencialmente de los anteriores por tener los dientes rojos, las mandíbulas dentelladas y las escamas granuladas; su color es negrozco, las mandíbulas rojas, y la cabeza verde; tiene ocho pulgadas de longitud.

ESCARO VARIADO.

(Valenc.)

El cuerpo es oblongo; las mandíbulas sin dentelladuras; la línea lateral poco ramosa; las escamas estriadas y su color azul con nubes amarillas, verde encima de la cabeza, violeta el hocico y las aletas anaranjadas con líneas azules; tiene diez pulgadas de longitud.

ESCARO TENIURO.

(Valenc.)

Sus mandíbulas son muy finas y dentelladas; tiene un diente pequeño hacia el ángulo de la boca; la línea lateral es sencilla y las escamas son lisas; es moreno verdoso por igual; no tiene mas que seis pulgadas de longitud.

ESCARO MALAQUITA.

(Valenc.)

Su cuerpo es casi oval, estrecho por ambos extremos, tiene las mandíbulas poco picadas; la línea lateral nada ramosa y la caudal en forma de media luna; su longitud es de once pulgadas.

ESCARO CALABAZA.

Parécense mucho al harid, solo que tiene el perfil mas seguido; la nuca no tan saliente y su caudal prolongada en figura convexa; la cabeza es amarilla, el labio superior azul y á más de la cinta que en forma de brida